

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- ACHTERBERG, H. & R. BRENNECKE (1986): Erstnacheis eines Thorshühnchens, *Phalaropus fulicarius* (L.), im Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 27: 82-83.
- ALTUM, B. (1870): Inventarium der zoologischen Sammlung II. Vögel. Neustadt/Eberswalde.
- ALTUM, B. (1880): Forstzoologie. II. Vögel. 2. Aufl. Berlin.
- ALTUM, B. (1887): Führer durch die Zoologischen Sammlungen der Königlichen Forstakademie Eberswalde. Eberswalde.
- AMAR, A., C.M. HEWSON, R.M. THEWLIS, K.W. SMITH, R.J. FULLER, J.A. LINDSELL, G. CONWAY, S. BUTLER & M.A. MACDONALD (2006): What's happening to our woodland birds? Long-term changes in the populations of woodland birds. RSPB Research Report no. 19. BTO Research Report no. 169. Sandy.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1883): 6. Jahresbericht (1881) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 31: 13-76.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1887): 10. Jahresbericht (1885) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 35: 337-615.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2004): Erster Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 12: 238-241.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2005): Zweiter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 12: 283-287.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2006): Dritter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalts (AK ST). Apus 13: 34-37.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2008): Vierter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 13: 427-437.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2011): Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 16: 64-80.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2012): Sechster Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 17: 86-98.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2014): Siebenter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 19: 75-94.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2015): Achter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 20: 65-75.
- BACH, W. (1962): Ein Rotkehlpieper bei Magdeburg. Falke 9: 212.
- BÄR, E. (1958): Ein Baßtölpel-Fund im Kreise Köthen. Falke 5: 33.
- BÄSECKE, K. (1938): Beobachtungen am Waldbaumläufer. Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel 14: 31-32.
- BAIRLEIN, F., J. DIERSCHKE, V. DIERSCHKE, V. SALEWSKI, O. GEITER, K. HÜPPOR, U. KÖPPEN & W. FIEDLER (2014): Atlas des Vogelzuges. Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. Wiebelsheim.
- BALDAMUS, A. (1852): Verzeichnis der Brutvögel der Umgegend von Diebzig. Naumannia 2(3): 55-58.
- BALDAMUS, E. (1855): Protokoll der neunten Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Naumannia 5: 226-246.
- BALSCHUN, D. (1988): Beobachtung eines Sichlers im Gebiet der Mansfelder Seen. Apus 7: 35-36.
- BANNASCH, F. (1968): Eisenten (*Clangula hyemalis* [L.]) bei Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 14: 175.
- BARFKNECHT, R., B. GIESSING & J.-D. LUDWIGS (2007): Aktionsraum und Habitatnutzung der Wachtel *Coturnix coturnix* in einer Agrarlandschaft im Nördlichen Harzvorland. Vogelwarte 45: 268.
- BARRAQUAND, F., T.T. HOYE, J.A. HENDEN, N.G. YOCCOZ, O. GILG, N.M. SCHMIDT, B. SITTLER & R.A. IMS (2014): Demographic responses of a site-faithful and territorial predator to its fluctuating prey: long-tailed skuas and arctic lemmings. J. Animal Ecol. 83: 375-387.
- BAUER, H.-G. & F. WOOG (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland – Teil I: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46: 157-194.
- BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Wiebelsheim.
- BAUER, H.-G., O. GEITER, S. HOMMA & F. WOOG (2016): Vogelneozoen in Deutschland – Revision der nationalen Statureinstufungen. Vogelwarte 54: 165-179.
- BAUER, K.M. & U.N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1987): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1. 2. Aufl., Wiesbaden.
- BAUER, K.M. & U.N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1992): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 3. 2. Aufl., Wiesbaden.
- BAUMGARTEN, E. & W. BACH (1957): Eiderenten und Zwergmöwen bei Magdeburg. Falke 4: 70.
- BEHN, E. (1993): Sichtung einer Schmarotzer-Raubmöwe, *Stercorarius parasiticus*, am Arendsee (Sachsen-Anhalt). Falke 40: 270.
- BEHRENDT, G. (1998): Der Nachtigallenbestand 1991 und 1995 im Südwesten des Kreises Köthen. Apus 10: 96-98.
- BEHRENDT, G. (1999a): Der Vogelbestand von Feldstraßen und Feldwegen 1995 im Kreis Köthen. Apus 10: 190-193.
- BEHRENDT, G. (1999b): Die Brutvögel einer Bergbauhalde im Kreis Köthen in den Jahren 1982 und 1993. Apus 10: 193-196.
- BEICHE, S. (1985): Die Schuß- und Fangliste des Försters Carl Andreas Naumann. Versuch einer faunistischen Interpretation. Monogr. Naumann-Mus. 2: 1-121.
- BEICHE, S. & J. LUGE (2006): Habitatauswahl und Reproduktion einer Neuntöter-Population im Nordteil des Köthener Gebietes. Apus 13: 102-123.

- BENECKE, H.-G. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Milde-Niederung/Altmark im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-72.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2009): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2008. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 78-98.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2010): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2009. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 28: 101-120.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2011): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2010. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 29: 55-69.
- VAN DEN BERG, A. B. & M. HAAS (2014): WP reports. Dutch Birding 36: 122-130.
- BERGMANN, H.-H., S. KLAUS, F. MÜLLER, W. SCHERZINGER, J. E. SWENSON & J. WIESNER (1996): Die Haselhühner. Neue Brehm-Bücherei 77. 4. Aufl., Magdeburg.
- BERGMANN, H.-H. & K. NIKLASCH (1995): Das Haselhuhnprojekt im Harz – Methoden, Ergebnisse und Probleme der Wiederansiedlung. Naturschutzreport 10: 282-295.
- BERNDT, R. (1937b): Trauerente, *Oidemia n. nigra* (L.), auf der Elbe bei Steckby. Beitr. Avifauna Mitteltd. 1: 10-11.
- BERNDT, R. (1939): Zur Nistweise des Hausrotschwanzes. Dt. Vogelwelt 64: 9-12.
- BERNDT, R. (1941): Merlin jagt auf Haustauben. Ornithol. Monatsber. 49: 174-175.
- BERNDT, R. (1942): Gartenbaumläufer als Pflegeeltern von Gartenrotschwänzen. Dt. Vogelwelt 67: 51-54.
- BERTHOLD, P. (1973): Über den starken Rückgang der Dorngrasmücke *Sylvia communis* und anderer Singvogelarten im westlichen Europa. J. Ornithol. 114: 348-360.
- BERTHOLD, P., U. QUERNER & R. SCHLENKER (1990): Die Mönchsgrasmücke. Neue Brehm-Bücherei 603. Wittenberg-Lutherstadt.
- BIERBACH, U. (1987): Schnee-Eule bei Siptenfelde (Harz). Apus 6: 237.
- BIRD, D. (2014): Haubenmeise *Parus cristatus* brütet in Halle auf dem Gertraudenfriedhof. Apus 19: 23-25.
- BIRTH, M. & B. NICOLAI (1970): Bestandsaufnahme der in einem Teilgebiet des Burger Holzes im Jahre 1969 brütenden Greifvögel. Apus 2: 19-24.
- BLASIUS, R. (1896): Die Vögel des Herzogthums Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Braunschweig.
- BLEY, D., U. MAMMEN & E. GÜNTHER (2015): Die Bedeutung von Pappeln (*Populus spec.*) im nördlichen Harzvorland für den Rotmilan *Milvus milvus*. Abh. Ber. Mus. Heineanum 10, Sonderh.: 63-84.
- BLOCK, B. & P. BLOCK (1986): Zum Brutvorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Flachland und zu ersten Brutnachweisen im Bezirk Potsdam. Mitt. Bezirksarb.gr. Artenschutz Potsdam 2: 30-35.
- BOCK, H. (2008): Wildvogel-Geflügelpest am Helmestausee. Apus 13: 424-426.
- BOCK, H. & S. HERRMANN (2006): Ergebnisse der Greifvogeluntersuchungen 2003 bis 2005 im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz und der Goldenen Aue. Apus 13: 45-61.
- BÖHM, W. (2003): Erstnachweis der Brandseeschwalbe in Sachsen-Anhalt für das 20. Jahrhundert. Apus 11: 330-331.
- BÖHM, W. & O. STROHKORB (1964): Eine natürliche Bastardierung zwischen Hausrotschwanz-Weibchen und Gartenrotschwanz-Männchen. Beitr. Vogelkd. 10: 235-236.
- BÖHME, F. (1968a): Einige bemerkenswerte Beobachtungen aus der Elbniederung bei Wittenberg. Beitr. Vogelkd. 14: 92.
- BÖHME, F. (1968b): Seidenreihler (*Egretta garzetta*) an den Altwassern bei Wittenberg. Beitr. Vogelkd. 14: 93.
- BOERNER, O. (1924a): *Oidemia fusca fusca* (L.) in Anhalt. Ornithol. Monatsber. 32: 15.
- BÖSCHE, H.-J. (2002): Erlebnisse mit Hausrotschwänzen. Ziergeflügel Exoten 47: 253-254.
- BOHN (1897): *Pelecanus crispus* bei Zwebendorf erlegt. Saalezeitung (Halle) v. 06.10.1897.
- BORCHERT, W. (1927): Die Vogelwelt des Harzes, seines nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. Magdeburg.
- BRACKHAHN, F. (2005a): Gebirgsstelzen (*Motacilla cinerea*) im Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 71-75.
- BRACKHAHN, F. (2005b): Zur Siedlungsdichte des Raubwürgers *Lanius excubitor* in der Heide. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 76-77.
- BRACKHAHN, F. (2008): Gebirgsstelzen *Motacilla cinerea* im Raum Magdeburg – Vorkommen und Nistplätze. Apus 13: 420-423.
- BRANDT, S. (1972): Einige interessante Beobachtungen aus dem südöstlichen Teil des Kreises Artern. Apus 2: 287-288.
- BRAUNEIS, J. (2014): Die Wachtel (*Coturnix coturnix*): Heimkehr eines einheimischen Wildvogels oder Scheinblüte einer Invasionsvogelart? – Betrachtungen am Beispiel des nordhessischen Berglandes. Acta ornithoecol. 8: 3-18.
- BREHM, C. L. (1820): Beiträge zur Vögelkunde. Bd. 1. Neustadt an der Orla.
- BREHM, C. L. (1837): Etwas über die Vögel bey Jena. Isis (Oken) 30: 673-685.
- BRENNECKE, R. (1975): Greifvogelbestandsaufnahmen bei Behnsdorf (Kreis Haldensleben) und ihre Auswertung. Mitt. IG Avifauna DDR 7: 3-17.
- BRENNECKE, R. (1987): Avifaunistischer Jahresbericht 1986 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 5: 2-25.
- BRENNECKE, R. (1998): Gottlob von Nathusius (1884-1948) als Ornithologe und Vogelsammler. Jschr. Mus. Ohrekr. 5: 55-82.
- BRENNECKE, R. (2005): Nachweise aus Born (Altmark) oder Borne (Börde): Mönchsgeier, Mehlschwalben? Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 78-79.
- BRENNECKE, R. (2007): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 25: 2-34.
- BRENNECKE, R. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2007 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 26: 2-33.
- BRENNECKE, R. (2009): Der Forstmann Friedrich Menzel (1867-1935) – Ornithologe, Vogelschützer, Eier- und Vogelsammler. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 102-130.
- BRENNECKE, R. (2012): Preußische Forstbeamte aus der Familie Meyerinck mit ornithologischen Kenntnissen. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 30: 43-74.
- BRICHETTI, P. & G. FRACASSO (2003): Ornitologia Italiana. Vol. 1. Gaviidae – Falconidae. Bologna.

- BRIESEMEISTER, E. (1968): Purpurreiher in der Nähe von Magdeburg. Apus 1: 250.
- BRIESEMEISTER, E. (1979): Nachtigallenzählung im Stadtkreis Magdeburg 1977. Apus 4: 113-120.
- BRIESEMEISTER, E. (1985): Über den Lebensweg zweier entfloher Kuhreiher. Falke 32: 275-277.
- BRIESEMEISTER, E. (1997): Die Brutvögel des Magdeburger Rotehornparkes. Apus 9: 245-258.
- BRIESEMEISTER, E. (2002): Mittlere Erstbeobachtungen einiger Vogelarten aus dem Raum Haldensleben und Magdeburg. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 20: 72-73.
- BRIESEMEISTER, E. & M. BIRTH (1992): Der Stausee Ladeburg, ein Wasservogelschongebiet im Bezirk Magdeburg. Apus 8: 78-85.
- BRIESEMEISTER, E., H. STEIN & K.-J. SEELIG (1987): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes (Teil 1) für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelelbe-Börde“. Magdeburg.
- BRIESEMEISTER, E., H. STEIN & K.-J. SEELIG (1988): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes (Teil 2) für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelelbe-Börde“. Magdeburg.
- BRINKMANN, M. (1919): Die abweichende Zusammensetzung der Vogelwelt im östlichen und westlichen Süden der Provinz Hannover. Ein Beitrag zur Avifauna von Hannover. 5. bis 10. Jber. der Niedersächs. Zool. Vereinigung 48-82.
- BRINKMANN, M. (1933): Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim.
- BRUECKMANN, F. E. (1749): Epistola itineraria XVII. sistens. Aves Sylvae Hercynicae (ad. Dn. Joh. Heinr. Zorn, d. 6. Nov. 1745, in Epp. itiner. Cent. II, 143-162). Wolfenbüttel.
- BRUNS, H. & H. NOCKE (1959): Die Erstankunft der Nachtigall in Deutschland 1948-1957. Ornithol. Mitt. 11: 81-86.
- BÜRGER, M. (1963): Baßtölpel, *Morus bassanus*, im Bezirk Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 8: 313-314.
- BÜRGER, M. (1964): Rosaflamingo, *Phoenicopterus antiquorum*, bei Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 9: 374-375.
- BUNDESDEUTSCHER SELTENHEITENAUSCHUß (1991): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland von 1977 bis 1986. Limicola 3: 157-196.
- BURFIELD, I. & F. VAN BOMMEL (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge.
- BUSCHENDORF, J. (2011): Hassen und Kleptoparasitismus. Apus 16: 102.
- BUSCHING, W. (2003): Die Vogelsammlung Johann Friedrich Naumanns im Naumann-Museum Köthen (Vogelbestände im Saal 3). Bl. Naumann-Mus. 22: 1-44.
- CABANIS, J. (1850): Museum Heineanum. Verzeichnis der ornithologischen Sammlung. I. Theil, Singvögel. Halberstadt.
- CADE, T., P. KOSKIMIES & O. K. NIELSEN (1998): *Falco rusticolus* Gyrfalcon. BWP Update. The Journal of Birds of the Western Palearctic 2: 1-25.
- CIMIOTTI, D. V., R. SCHULZ, B. KLINNER-HÖTKER & H. HÖTKER (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland: Seeregenpfeifer. Falke 62: 24-29.
- CLAUSING, P. & W. GLEICHNER (1978): Überwinternde Rotmilane, *Milvus milvus*, bei Bernburg, Mühlhausen und im Nordharz-Vorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 3: 23-30.
- CLEVEN, B. & W. TÖPFER (1966): Die Brutdichte im Peißnitz-Auwald (Halle). Apus 1: 48-52.
- CRAMP, S. & K. E. L. SIMMONS (1983): The Birds of the Western Palearctic. Vol. III. Oxford.
- DATHE, H. (1940): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Drömlings (Altmark). (Fortsetzung, Schluß). Beitr. Avifauna Mitteldt. 4: 3-21, 49-54.
- DAVENPORT, D. L. (1979): Spring passage of skuas at Balranald, North Uist. Scott. Birds 10: 216-221.
- DAVENPORT, D. L. (1981): The spring passage of Pomarine and Longtailed Skuas off the south and west coasts of Britain and Ireland. Irish Birds 2: 73-79.
- DELANY, S., D. SCOTT, T. DODMAN & D. STROUT (2009): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wageningen.
- DETMERS, E. (1912): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung einiger jagdlich wichtiger Brutvögel in Deutschland. Jahrb. Inst. f. Jagdkd. 1: 65-164.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2012): Seltene Vogelarten in Deutschland 2010. Seltene Vögel Dt. 2010: 10-49.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2013): Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. Seltene Vögel Dt. 2011-2012: 2-47.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. Seltene Vögel Dt. 2013: 2-39.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland 2014. Seltene Vögel Dt. 2014: 2-36.
- DEUTSCHE ORNITHOLOGEN-GESELLSCHAFT (DO-G) (1868): Bericht über die XVI. Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft in Kiel am 2ten, 3ten und 4ten Juni 1868. Münster.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. Limicola 8: 153-216.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1995): Seltene Vogelarten in Deutschland 1993. Limicola 9: 77-109.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. Limicola 10: 209-257.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1997): Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. Limicola 11: 153-208.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. Limicola 12: 161-227.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2000): Seltene Vogelarten in Deutschland 1997. Limicola 14: 273-339.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. Limicola 16: 113-184.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2005): Seltene Vogelarten in Deutschland 1999. Limicola 19: 1-63.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2006): Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. Limicola 20: 281-353.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. Limicola 22: 249-339.

- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. *Limicola* 23: 257-334.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). *Limicola* 24: 233-286.
- DIELITZSCH, E. (1944): Löffler, *Platalea l. leucorodia* L., bei Klieken in Anhalt. *Ornithol. Monatsber.* 52: 52.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, F. JACHMANN & F. STÜHMER (2006): Ornithologischer Jahresbericht 2005 für Helgoland. *Ornithol. Jber. Helgoland* 16: 1-60.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, K. HÜPPOB, O. HÜPPOB, K. F. JACHMANN (2011): Die Vogelwelt der Insel Helgoland. Helgoland.
- DIERSCHKE, V. (1997): Das Vorkommen des Sumpfläufers *Limicola falcinellus* in Deutschland. *Limicola* 11: 217-230.
- DIESSNER, F. (1966): Schnee-Eule im Kreis Köthen. *Falke* 13: 426.
- DOBBRICK, W. (1933): Die Zaunammer in Weißenfels (Prov. Sachsen). *Ornithol. Monatsber.* 41: 55-56.
- VAN DONGEN, R. M., R. HOFLAND & P. W. W. DE ROUW (2007): Recente meldungen September – Oktober 2007, Nederland. *Dutch Birding* 29: 400-411.
- DORNBUSCH, G. (2007): Der Langzeit-Vogelschutzversuch Steckby. *Natursch. Land Sachsen-Anhalt* 44, Sonderh.: 65-76.
- DORNBUSCH, G., S. FISCHER, K. GEORGE, B. NICOLAI & A. PSCHORN (2007): Bestände der Brutvögel Sachsen-Anhalts - Stand 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 121-125.
- DORNBUSCH, G., K. GEDEON, K. GEORGE, R. GNIELKA & B. NICOLAI (2004): Rote Liste der Vögel (Aves) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand: Februar 2004). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 39: 138-143.
- DORNBUSCH, M. (1971): Mischbruten und nichtarteigene Fütterungsbeteiligung bei Baumläufern. *Falke* 18: 208.
- DORNBUSCH, M. (1972): Die Siedlungsdichte des Brutvogelbestandes und die Vogeldichte außerhalb der Brutzeit in Kiefernjungerbestockungen sowie ihre Beeinflussung durch Vogelschutzmaßnahmen. *Beitr. Vogelkd.* 18: 265-294.
- DORNBUSCH, M. (1977): Rauhfußkauz bei Steckby. *Apus* 4: 43-44
- DORNBUSCH, M. (1980): *Certhia*-Erkenntnisse. *Falke* 27: 46-51.
- DORNBUSCH, M. (1982): Zur Mauser des Gartenbaumläufers, *Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820. *Ann. Ornithol.* 6: 87-90.
- DORNBUSCH, M. (1990): Ein interessanter Ringfund. *Habichtskauz-Nachweis. Falke* 37: 300-301.
- DORNBUSCH, M. (1992): Rote Liste der Vögel des Landes Sachsen-Anhalt (1. Fassung, Stand, April 1991). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 1: 13 -15.
- DORNBUSCH, M. (2012): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. Stand: 31.12.2010. *Apus* 17, Sonderh. 2: 1-63.
- DORNBUSCH, M. (2013): In Sachsen-Anhalt beobachtete nicht heimische Vogelarten und Anmerkungen zur Artenliste 2012. *Apus* 18: 9-15.
- DORNBUSCH, M. (2017): Bemerkenswerte Ringfunde von Waldbaumläufers *Certhia familiaris* und Gartenbaumläufers *C. brachydactyla*. *Apus* 22: 81-95.
- DORNBUSCH, M. & C. DORNBUSCH (2010): Ein Adlerbussard *Buteo rufinus* bei Steckby. *Apus* 15: 69-70.
- DRIECHCIARZ, R. & E. DRIECHCIARZ (2009): Vergleichende Untersuchung zur Jagdstrategie ausgewählter Greifvogelarten und damit verbundene Nutzungshäufigkeit verschiedener Landschaftselemente. *Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten*, Bd. 6: 181-186.
- DRÖSSLER, H.-P. (1974): Beobachtung einer Zwergtrappe, *Tetrax tetrax* L., im Fiener Bruch (Kreis Genthin). *Beitr. Vogelkd.* 20: 320.
- DUDÁS, M., G. KOVÁCS & I. SÁNDOR (1993): Der Adlerbussard *Buteo rufinus* als mitteleuropäischer Brutvogel in der ungarischen Hortobágy-Puŕta. *Limicola* 7: 141-146.
- EBELING (1871): Schneeeule bei Domersleben. *Bl. Handel, Gewerbe und soziales Leben. Beibl. Magdeburg. Ztg.*: 110.
- EBELING (1874): Die Magdeburgische Vogelwelt. *Bl. Handel, Gewerbe soziales Leben. Beibl. Magdeburg. Ztg.*: 182.
- EICHLER, R. & K. HAARSTICK (1995): Die Wiederansiedlung des Auerhuhns im Harz. *Naturschutzreport* 10: 125-134.
- ELLERMAA, M. & A. LINDÉN (2015): Sügisränne põõsaspeal 2014. *aastal. Hirundo* 1: 20-49.
- ERTAN, K. T. (2000): Evolutionary Biology of the genus *Phoenicurus* – Phylogeography, natural hybridisation and population dynamics. Marburg.
- ESTAF'EV, A. A. (1995): Otrjad Charadriiformes ržankooobraznye. In: *Fauna Evropejskogo Severo-Vostoka Rossii. Pticy. Tom I, Čast' I. Nevorob'inye. Sankt-Peterburg.*
- EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) (2012): EEA Technical Report: The impacts of invasive alien species in Europe. No. 16.
- FABER, G. (1932): Trauerente schon im August in Mitteldeutschland. *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 6: 21.
- FEILER, A. (1969): Die Verbreitung und Entwicklung der Auerwildbestände in den Kiefernwäldern zwischen Mulde und Neiße. *Beitr. Vogelkd.* 14: 290-309.
- FEUERSTEIN, W. (1953): Neues vom Rauhfußkauz, *Aegolius f. funereus* (L.). *Mitt. Thür. Ornithol.* 4: 28-29.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2007): Meldungen aus den Beringungszentralen. *Vogelwarte* 45: 227-229.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2008): Meldungen aus den Beringungszentralen. *Vogelwarte* 46: 59-60.
- FISCHER, S. (2009): Sechs Jahre Beringungsarbeit an einem IMS-Fangplatz in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 59-66.
- FISCHER, S. (2012): Zehn Jahre Punkt-Stopp-Zählungen im EU SPA Zerbster Land. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 85-94.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2004): Bestandssituation seltener Vogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2001 bis 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 5-31.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2005): Bestandssituation seltener Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 3-23.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2006): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-27.

- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2007): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-30.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2009): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010b): Abschluss der Ersterfassungen wertgebender Brutvogelarten in den Europäischen Schutzgebieten Sachsen-Anhalts. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2011): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2012): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 5-35.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2014a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2012. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 5-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2014b): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2013. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 5-39.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2015a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2014. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 5-41.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2015b): Bestand und Bestandsentwicklung der Brutvögel Sachsen-Anhalts – Stand 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 71-80.
- FISCHER, S. & A. PSCHORN (2012): Brutvögel im Norden Sachsen-Anhalts – Kartierung auf TK25-Quadranten von 1998 bis 2008. Apus 17, Sonderh. 1: 9-236.
- FLOERICKE, C. (1927): Zum Vorkommen des Uhu. Mitt. Vogelwelt 26: 40.
- FORRESTER, R. & I. ANDREWS (2007): The Birds of Scotland. Vol. 2. Aberlady.
- FOX, A. & S. ASPINALL (1987): Pomarine Skuas in Britain and Ireland in autumn 1985. British Birds 80: 404-421.
- FRANSSON, T. & S. HALL-KARLSSON (2008): Svensk ringmärkningsatlas Vol. 3. Stockholm.
- FRANZ, E. (1963): Die Sperbergrasmücke im Raum Magdeburg. Falke 10: 114-115.
- FREIDANK, K. (1973): Partieller Albinismus bei Wacholder- (*Turdus pilaris* L.) und Rotdrossel (*Turdus iliacus* L.). Beitr. Vogelkd. 19: 468-470.
- FREIDANK, K. & H.-P. DRÖSSLER (1983): Die Vögel des Fiener Bruches und seiner Randgebiete. Teil I: Nonpasseres. Beitr. Tierwelt Mark 10: 41-69.
- FREIDANK, K. & L. PLATH (1982): Zur Vogelwelt der Elbe-Havel-Winkels. Genthin.
- FRICK (1904): Zwergtrappe (*Otis tetrax*) hier seit mehreren Jahren Brutvogel. Ornithol. Monatsschr. 29: 313.
- FRIEDRICHS, T. (1993): Löffler im Landkreis Stendal. Apus 8: 186-187.
- FRIEDRICHS, T. (2016): Zur Überwinterung der Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* in der Altmark. Apus 21: 60-65.
- FRITSCH, G. (1992): Kolkraben- und Rotmilanbrut auf Hochspannungsmasten im Kreis Weißenfels. Apus 8: 91-92.
- FRITSCH, G. (1995): Wiederansiedlung der Gebirgsstelze im Kreis Weißenfels. Apus 9: 135.
- FRÜHAUF, W. & M. DORNBUSCH (1978): Höchstalter des Kernbeißers. Falke 25: 212-213.
- FUCHS, E. (1963): Der Rauhfußkauz, *Aegolius funereus*, Brutvogel im Harz. Beitr. Vogelkd. 8: 469-470.
- FURNESS, R. W. (2010): The skuas. London.
- FUX, O. (1959): „Ein Odinshühnchen im Vogtland ...“. Falke 6: 177.
- GÄTKE, H. (1891). Die Vogelwarte Helgoland. Braunschweig
- GARTHE, S., N. SONNTAG, P. SCHWEMMER & V. DIERSCHKE (2007): Estimation of seabird numbers in the German North Sea throughout the annual cycle and their biogeographic importance. Vogelwelt 128: 163-178..
- GEDEON, K., C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE, C. SUDFELDT, W. EIKHORST, S. FISCHER, M. FLADE, S. FRICK, I. GEIERSBERGER, B. KOOP, M. KRAMER, T. KRÜGER, N. ROTH, T. RYSLAVY, S. STÜBING, S. R. SUDMANN, R. STEFFENS, F. VÖKLER & K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Münster.
- GEHLHAAR, H. & R. WEIßGERBER (2009): Brutgrößen von Greifvögeln und Eulen im Zeitzer Land. Apus 14: 35-43.
- GENTZ, K. (1955): Zur Verbreitung des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers. Falke 2: 113-114.
- GEORGE, B. (2009): Die Gebäudebrüter in Dessau-Zoberberg und Dessau-Schaftrift (Stadt Dessau-Roßlau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 21: 5-17.
- GEORGE, K. (1983): Zum Vorkommen der Wachtel *Coturnix coturnix* (Linné, 1758) in der Deutschen Demokratischen Republik. Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sektion Pflanzenproduktion.
- GEORGE, K. (1988): Beobachtung eines Kuhreihers im nördlichen Harzvorland. Apus 7: 34-36.
- GEORGE, K. (1989): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland. Acta Ornithocol. 2: 65-77.
- GEORGE, K. (1993): Ziehende Kraniche (*Grus grus*) hassen auf Raubmöwe (*Stercorarius spec.*). Vogelwarte 37: 145.
- GEORGE, K. (1994): Zur Überwinterung von Rotmilanen *Milvus milvus* im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). Vogelwelt 115: 127-132.
- GEORGE, K. (1995a): Überwinterung von Rotmilanen (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland/Sachsen-Anhalt. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 59-66.
- GEORGE, K. (1995b): Herkunft und Alter überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* nördlich der traditionellen Winterquartiere. Vogelwelt 116: 311-315.
- GEORGE, K. (1996): Entwicklung der Anzahl überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* L. zwischen Harz und Havel bis 1994. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 3: 199-205.
- GEORGE, K. (1999): Sommerlebensräume der Wachtel *Coturnix coturnix* in der mitteleuropäischen Agrarlandschaft. NNA-Berichte 12 (3): 88-92.

- GEORGE, K. (2001): Langjährige Bestandsaufnahmen der Wachtel: Gute Aussichten in Ostdeutschland. *Falke* 48: 309-311.
- GEORGE, K. (2004): Veränderungen der ostdeutschen Agrarlandschaft und ihrer Vogelwelt insbesondere nach der Wiedervereinigung Deutschlands. *Apus* 12: 1-138.
- GEORGE, K. (2007): Waldbaumläufer *Certhia familiaris* und Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* auf einer Untersuchungsfläche im Harz. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 25: 107-112.
- GEORGE, K. (2008a): Vergleichende Betrachtung der Brutbestandsentwicklung von Meisen der Gattung *Parus* und ausgewählter weiterer Arten im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) seit 1993. *Vogelkd. Ber. Niedersachs.* 40: 201-211.
- GEORGE, K. (2008b): Wie kurz- oder langlebig sind Meisen der Gattung *Parus*? *Vogelwarte* 46: 217-221.
- GEORGE, K. (2010): Veränderungen der ostdeutschen Agrarlandschaft und ihrer Vogelwelt. *Naturschutzarb. Sachsen* 52: 66-73.
- GEORGE, K. & B. NICOLAI (1996): Lebenserwartung freilebender Milane (*Milvus milvus*, *Milvus migrans*). *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 14: 49-51.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1997): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 9: 259-290.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 10: 37-71.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 10: 125-160.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2000): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1999 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 10: 221-259.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2001): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2000 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 11: 1-36.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2002): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2001 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 11: 127-177.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2003): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2002 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 11: 283-326.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2004): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2003 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 12: 205-237.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2005): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2004 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 12: 257-287.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2006): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2005 in Sachsen-Anhalt. *Apus* 13: 3-33.
- GIERTH, D. (1967): Rallenreihher bei Halle. *Falke* 14: 138.
- GILG, O., I. HANSKI & B. SITTLER (2003): Cyclic dynamics in a simple vertebrate predator-prey community. *Science* 302: 866-868.
- GILG, O., B. SITTLER, B. SABARD, A. HURSTEL, R. SANE, P. DELATTRE & I. HANSKI (2006): Functional and numerical responses of four lemming predators in high arctic Greenland. *Oikos* 113: 193-216.
- GLATZEL, K. & J. ZAUMSEIL (1997): Der Rosenstar (*Sturnus roseus* L.). Erstnachweis für das Gebiet des Burgenlandkreises. *Saale-Unstrut-Jahrb.* 2: 79-80.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2013): Bruten von Greifvögeln auf Gittermasten. *Apus* 18:161-163.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2015): 50 Jahre Greifvogelkartierung im Plötzkauer Auwald 1964-2013. *Apus* 20: 16-37.
- GLEICHNER, W., F. GLEICHNER & A. BOBBE (2008): Gemeinsames Nisten von Rot- und Schwarzmilan auf einem Baum. *Apus* 13: 355-356.
- GLEICHNER, W., F. GLEICHNER, A. BOBBE, U. HENKEL & S. KAMP-RATH (2013): Die Schlafplätze des Rotmilans *Milvus milvus* im Altkreis Bernburg von 1985 bis 2013. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 31: 37-49.
- GLEICHNER, W. & K. ZAPPE (1980): Die Graureiherkolonie bei Plötzkau (Kr. Bernburg). *Apus* 4: 167-171.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1985): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 10., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1988): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 11., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1991): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 12., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1993): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 13., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1994): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 9. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1997): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 14., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1999): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 8. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1986): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 7. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1989): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 4. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1994): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 5. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., K. M. BAUER & E. BEZZEL (1999): *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Bd. 6. 3. Aufl., Wiesbaden.
- GNIELKA, R. (1965): Die Vögel der Rabeninsel bei Halle (Saale). Ergebnisse ganzjähriger quantitativer Bestandsaufnahmen in einem Stieleichen-Eschen-Ulmen-Auwald. *Hercynia N.F.* 2: 221-254.
- GNIELKA, R. (1966): Die Vögel des Tagebaurestlochs Halle-Bruckdorf. *Apus* 1: 65-74.
- GNIELKA, R. (1967): Bestandsaufnahmen der Nachtigallen im Stadtkreis Halle. *Apus* 1: 113-117.
- GNIELKA, R. (1974): Die Vögel des Kreises Eisleben. *Apus* 3: 145-248.
- GNIELKA, R. (1977a): Avifaunistischer Jahresbericht 1974 für den Bezirk Halle. *Apus* 4: 25-39.
- GNIELKA, R. (1977b): Zwergohreule in Halle. *Apus* 4: 43.
- GNIELKA, R. (1978): Der Einfluß des Ulmensterbens auf den Brutvogelbestand eines Auwaldes. *Apus* 4: 49-66.
- GNIELKA, R. (1979): Avifaunistischer Jahresbericht 1975 für den Bezirk Halle. *Apus* 4: 97-112.
- GNIELKA, R. (1981): Die Vögel des Südfriedhofes Halle. Ergebnisse ganzjähriger Bestandsaufnahmen 1964-1978. *Hercynia N.F.* 18: 134-184.

- GNIELKA, R. (1982): Avifaunistische Daten aus dem Fotonotizbuch von Fritz Stenzel. Apus 5: 38-40.
- GNIELKA, R. (1983a): Avifauna von Halle und Umgebung. Teil 1: Halle.
- GNIELKA, R. (1983b): Vogelwelt des Kreises Querfurt. Erläutertes Verzeichnis der im Kreis Querfurt nachgewiesenen Vogelarten. Querfurt.
- GNIELKA, R. (1983c): Avifaunistischer Jahresbericht 1979 für den Bezirk Halle. Apus 5: 101-112.
- GNIELKA, R. (1983d): Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle. Apus 5: 112-122.
- GNIELKA, R. (1984): Avifauna von Halle und Umgebung. Teil 2. Halle.
- GNIELKA, R. (1987a): Die Brutvögel der Autobahngehölze in der Ackerlandschaft bei Halle. Apus 6: 244-248.
- GNIELKA, R. (1987b): Daten zur Brutbiologie der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) aus dem Bezirk Halle. Beitr. Vogelkd. 33: 103-113.
- GNIELKA, R. (1989a): Avifaunistischer Jahresbericht 1983 für den Bezirk Halle. Apus 7: 97-112.
- GNIELKA, R. (1989b): Avifaunistischer Jahresbericht 1984 für den Bezirk Halle. Apus 7: 112-124.
- GNIELKA, R. (1993): Die Brutvögel eines Villengebietes 1966-1992. Apus 8: 172-181.
- GNIELKA, R. (1995): Die frühere Verbreitung des Rotkopfwürgers in Sachsen-Anhalt. Apus 9: 9-19.
- GNIELKA, R. (2001): Wie verfälscht der „persönliche Faktor“ die Ergebnisse von Vogelerfassungen? Ornithol. Mitt. 53: 156-161.
- GNIELKA, R. (2005): Brutvogelatlas des Altmarkkreises Salzwedel. Apus 12, Sonderh.: 1-167.
- GNIELKA, R. (2010): Brutvogelatlas des Altkreises Haldensleben. Apus 15, Sonderh.: 1-185.
- GNIELKA, R. (2014): Die Vögel des Südfriedhofs Halle 1964-2005. Apus 19, Sonderh.: 1-252.
- GNIELKA, R. & T. SPRETKE (1982): Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für den Bezirk Halle. Apus 4: 241-253.
- GNIELKA, R. & J. ZAUMSEIL (1997): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des Südtails 1990 bis 1995. Halle.
- GÖRNER, M., W. SCHULZE, W. SCHRÖDTER & K. KARLSTEDT (1983): Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung „Stausee Kelbra“ und seine Vogelwelt. Landschaftspfl. Natursch. Thür. 20: 30-54.
- GOEZE, J. A. E. & J. A. DONNDORF (1795): Europäische Fauna oder Naturgeschichte der europäischen Thiere. Bd. 5. Leipzig.
- GOTTSCHALK, T., S. FRANKE, U. MÄRKEL & S. TRAUTMANN (2014): Einfluss von Klima und Landnutzung auf die Verbreitung ausgewählter Brutvogelarten des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 7: 1-196.
- GOTTSCHLING, H.-J. (1973): Bergente bei Zeitz. Apus 3: 45.
- GRAF ZU WALDECK UND PYRMONT, H. (1934): Brut des Merlins im Regierungsbezirk Merseburg. Ornithol. Monatsschr. 59: 191-192.
- GRAFF, H. (1970): Bemerkenswerte Vogelarten im Mennewitzer Teichgebiet. Falke 17: 20-23.
- GREMPE, G. (1968): Rotkopfwürger bei Wittenberg. Apus 1: 254.
- GRIMM, H. & J. HAENSEL (1991): Zur Sommernahrung des Raubwürgers, *Lanius excubitor* L., im Süd- und Nordharzvorland. Beitr. Vogelkd. 37: 129-147.
- GROSSE, W. (1925): Der Harz und die Jagd. Harz 28: 527-528.
- GROTE, H. (1905): Beiträge zur heimischen Avifauna (Aus der Vogelsammlung der Kgl. Forst-Akademie Eberswalde). Ornithol. Monatsber. 13: 1-7.
- GRUHL, G. (1964): Seidenreier bei Magdeburg. Falke 11: 23.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2001): Zum avifaunistischen Wert der Laubwälder des Selketals im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 65-94.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2012): Die Vögel auf dem Ausberg im Naturschutzgebiet „Selketal“ im Harz 1991, 2005, 2012. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 81-90.
- GÜNTHER, E. & B. OHLENDORF (1990): Steinrötel *Monticola saxatilis* und Alpenbraunelle *Prunella collaris* auf dem Brocken. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 22: 68-69.
- GÜNTHER, E. & M. WADEWITZ (1990): Der Bestand der Greifvögel im Huy (Nördliches Harzvorland) im Jahre 1981. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1: 1-3.
- GÜNTHER, F. (1888): Der Harz in Geschichts-, Kultur- und Landschaftsbildern. Hannover.
- GUYOMARC'H, J. C. (2003): Elements for a Common Quail (*Coturnix c. coturnix*) management plan. Game and Wildlife Science 20: 1-92.
- HADARICS, T. & T. ZALAI (2008): Nomenclator Avium Hungariae. MME Budapest.
- HAENSCHKE, W. (1998): Die Brutvögel der Mosigkauer Heide. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 10: 113-124.
- HAENSCHKE, W., H. HAMPE, P. SCHUBERT, E. SCHWARZE (1983): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 1. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 3-96.
- HAENSCHKE, W., H. HAMPE, P. SCHUBERT, L. REICHHOFF & E. SCHWARZE (1985): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 2. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 97-200.
- HAENSEL, J. (1963): Vom Schwarzstirnwürger (*Lanius minor* Gmelin) im nordöstlichen Harzvorland, seine Bestandsschwankungen und ihre vermutlichen Ursachen. Beitr. Vogelkd. 8: 353-360.
- HAENSEL, J. (1964): Zur Ernährungsbiologie des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor* Gm.) nach Gewölluntersuchungen im nördlichen Harzvorland. Beitr. Vogelkd. 10: 199-210.
- HAENSEL, J. (1968a): Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus* (L.)) an der Seeburg bei Gröningen. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 105-106.
- HAENSEL, J. (1968b): Rotkehlpieper (*Anthus cervinus* (Pall.)) an der Seeburg bei Gröningen. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 109-110.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1974): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 2: 1-96.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1978): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 3: 97-198.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1981): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 4: 199-261.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1984): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 5: 263-358.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1987): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 6: 359-462.

- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1990): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 7: 463-538.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1991): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 1: 539-630.
- HAGEMEIJER, W.J.M. & M.J. BLAIR (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds – their Distribution and Abundance. London.
- HAMPE, A., T. HEINICKE & A. HELBIG (1996): Erste Brut der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Deutschland. Limicola 10: 311-316.
- HAMPE, H. (1966): Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) bei Dessau. Beitr. Vogelk. 12: 118.
- HAMPE, H. (1968): Schmarotzerraubmöwe auf der Elbe bei Aken. Apus 1: 197.
- HAMPE, H. (1970): Das Vorkommen der Sperbergrasmücke – *Sylvia nisoria* (Bechst.) – im Dessauer Raum. Apus 2: 75-82.
- HAMPE, H. (1975a): Der Raubwürger im Dessauer Raum. Apus 3: 267-271.
- HAMPE, H. (1975b): Winterbeobachtung der Mönchsgrasmücke. Apus 3: 289-290.
- HAMPE, H. (1977): Novemberbeobachtung eines Rotrückenvürgers. Apus 4: 45.
- HAMPE, H. (1986): Albinismus bei einem Hausrotschwanz. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 34.
- HAMPE, H. (1988): Überwinterung einer Mönchsgrasmücke. Apus 7: 40-41.
- HAMPE, H. & G. PUHLMANN (1996): Bestandserfassung der Nachtigall 1995 im Stadtkreis Dessau und Teilen des Landkreises Anhalt-Zerbst. Apus 9: 176-179.
- HANDTKE, K. & G. MAUERSBERGER (1977): Die Ausbreitung des Kuhreiher, *Bubulcus ibis* (L.). Ann. Ornithol 1: 3-78.
- HAUCHECORNE, F. (1928): Wiedereinbürgerung des Auerwildes in Anhalt. Dt. Jägerz. 90: 8.
- HEFT, H. (1958): Zur gegenwärtigen Verbreitung des Auerhuhns, *Tetrao urogallus major* Brehm, in der Deutschen Demokratischen Republik. Beitr. Vogelkd. 6: 172-186.
- HEIDECHE, D. (1966): Laridenvorkommen im Gerlebogker Teichgebiet. Apus 1: 33-38.
- HEIDECHE, D. (1967): Zwei Purpurreiher-Beobachtungen im Gerlebogker Teichgebiet. Apus 1: 137-138.
- HEIDECHE, D. (1972): Die Siedlungsdichte der Brutvögel einer Pappelpflanzung im Gerlebogker Teichgebiet. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 25-40.
- HEYDER, R. (1952): Die Vögel des Landes Sachsen. Leipzig.
- HEINE, F. (1877): *Monticola saxatilis* im Harze ausgebrütet. (Correspondenzblatt VII. VIII. des Naturwissenschaftlichen Vereines für die Provinz Sachsen und Thüringen in Halle). Z. ges. Naturwiss. 3. Folge, 1 (= 49): 100-103.
- HEINE, F. & A. REICHENOW (1890): Nomenclator Musei Heinei Ornithologici. Berlin.
- HEINEMANN, H. (1902): Die Pieper oder Spitzlerchen (*Anthus*). Gefied. Welt 31: 209-210, 217-218, 226.
- HEINICKE, T. & U. KÖPPEN (2007): Vogelzug in Ostdeutschland. I - Wasservögel. Teil 1. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18, Sonderh.: 1-406.
- HEINICKE, T. & U. KÖPPEN (2013): Vogelzug in Ostdeutschland. I - Wasservögel. Teil 2. Ber. Vogelwarte Hiddensee 22, Sonderh.: 1-562.
- HEINROTH, O. (1921): Bericht über die Septembersitzung 1921. J. Ornithol. 69: 573-575.
- HELBIG, A.J. & D. FRANZ (1990): Einflug der Eiderente *Somateria mollissima* nach Mittel- und Südeuropa im Herbst 1988. Limicola 4: 229-249.
- HELLMANN, M. (1990): Der herbstliche Greifvogelzug am nördlichen Harzvorland. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1(2): 1-11.
- HELLMANN, M. (1996): Untersuchungen an Schlafplätzen von Rotmilan und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 111-132.
- HELLMANN, M. (1999): Die Entwicklung des Rotmilans *Milvus milvus* vom Nahrungsgast zum Brutvogel in der Stadt Halberstadt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 17: 93-107.
- HELLMANN, M. (2002): Der Winterbestand des Rotmilans *Milvus milvus* 2000/01 und 2001/02 im Land Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 20: 57-80.
- HELLMANN, M. (2008): Schneesperling *Montifringilla nivalis* auf dem Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 26: 1-10.
- HELLMANN, M. (2011): Der Bestand des Rotmilans *Milvus milvus* im Spätherbst und Winter in einem Schlafgebiet im nördlichen Harzvorland von 1995 bis 2011. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 29: 27-47.
- HELLMANN, M. (2015): Die Vogelwelt auf dem Brocken im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 33: 1-96.
- HELLMANN, M., E. GÜNTHER & B. NICOLAI (1998): Die Vögel des Brockenurwaldes: Vorkommen, Siedlungsdichte, Avizönose. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 16: 103-136.
- HELLMANN, M. & M. WADEWITZ (2000): Die Vögel der Brockenkuppe. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 1-49.
- HELLWIG, T. (2004): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 33-39.
- HELLWIG, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 78-82.
- HELLWIG, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Fiener Bruch im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 83-85.
- HEMPEL, C. & W. REETZ (1957): Der Zug von Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) und Gartenrotschwanz (*Ph. phoenicurus*) nach Beringungsergebnissen. Vogelwarte 19: 97-119.
- HENNECKE (1956): Das letzte Auerwild des Oberharzes. Wild Hund 4: 66.
- HENNING, O., J. BRAUN & T. FRIEDRICHS (2017): Erst- und Zweitnachweis des Buschrohrsängers *Acrocephalus dumetorum* in Sachsen-Anhalt 2014. Apus 22: 96-101.
- HERDAM, H. (1967): Siedlungsdichte der Vögel auf Kontrollflächen am Westrand der Magdeburger Börde. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 2: 49-66.



- HERMS, K. (1981): Eiderenten auf der Elbe. Falke 28: 66.
- HERRMANN, C. & M. JUNGE (2013): Die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012. Seevögel 34: 86-148.
- HERZ, E. (1983): Brauner Sichler bei Merseburg. Apus 5: 142.
- HEUER, J. (1998): Merlin erbeutet Bekassine. Apus 10: 93-94.
- HEYDER, R. (1952): Die Vögel des Landes Sachsen. Leipzig.
- HILDEBRANDT, G. (2001): Die Veröffentlichungen der Ornithologenfamilie Naumann in Zeitschriften. Köthen.
- HILDEBRANDT, G. (2007): Johann Andreas Naumanns „Naturgeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder“ (1795-1817). Apus 13: 3-164.
- HILDEBRANDT, H. (1919): Beitrag zur Ornithologie Ostthüringens. Mitt. aus dem Osterlande N. F. 16: 289-371.
- HILDEBRANDT, H. (1927): Adolf Gueinzus als Vogelkundler. J. Ornithol. 75: 425-433.
- HILPRECHT, A. (1934): Nachtigall noch Anfang November auf dem Südfriedhof. Vogelfreund 3: 61.
- HILPRECHT, A. (1954): Nachtigall und Sprosser. Neue Brehm-Bücherei 143. Wittenberg-Lutherstadt.
- HINSCHKE, A. (1933): Total-Albinismus bei *Lanius c. collurio* L. Ornithol. Monatsber. 41: 186-187.
- HINSCHKE, A. (1935): Zweimalige Beobachtung des Wasserpiepers (*Anthus s. spinoletta* [L.]) bei Wörlitz. Beitr. Avifauna Anhalts 4: 22-23.
- HINSCHKE, A. (1937): Wasserpieper, *Anthus s. spinoletta* (L.), bei Vockerode. Beitr. Avifauna Mitteltdt. 1: 13-14.
- HINSCHKE, A. (1966): Rotkehlpieper bei Bösewig. Apus 1: 96-97
- HINSCHKE, A. (1967a): Purpurreiher bei Wittenberg. Apus 1: 138-139.
- HINSCHKE, A. (1967b): Ein Trupp Eiderenten bei Elsnigk, Kr. Köthen. Apus 1: 142-143.
- HINSCHKE, A. (1968): Herbstbeobachtung des Rotkehlpiepers bei Wittenberg. Apus 1: 201.
- HINSCHKE, A. (1971): Der Greifvogelbestand der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau (Landschaftsschutzgebiet Mittlere Elbe). Apus 2: 171-177.
- HIRSCHFELD, K. (1969): Zum Vorkommen des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers im Kyffhäuser-Unstrut-Gebiet. Apus 1: 270-276.
- HOEBEL, W. (1982): Steppenkiebitz im Saalkreis. Apus 4: 281-282.
- HOEBEL, W. (1987a): Grasläufer am Helme-Stausee Berga-Kelbra. Apus 6: 230-231.
- HOEBEL, W. (1987b): Die Brutvögel ausgewählter Landschaftselemente im nordwestlichen Saalkreis. Apus 6: 249-255.
- HÖHNE, R. (1993): Bruten der Gebirgsstelze bei Halle. Apus 8: 189-190.
- HÖHNE, R. (1996): Ein Merlin im August. Apus 9: 185-186.
- HOCKEY, P. (1995): Waders of Southern Africa. Cape Town.
- HOERNECKE, E. (2002): Großinsekten als Nahrung des Rotmilans. Apus 11: 209-210.
- HOFMANN, E. & G. RIEGER (1979): Ein Rauhfußkauz im Kreis Merseburg. Apus 4: 142-143.
- HOLZÄPFEL, R. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Landgraben-Dumme-Niederung in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 61-66.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1992): Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1994): Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1996): Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1997): Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2006): Handbook of the Birds of the World. Vol. 11. Barcelona.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR (2014): HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 1. Barcelona.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR (2016): HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 2. Barcelona.
- HOLTZBERG (1925): Eine Zwergohreule in Braunschweig. Ornithol. Monatsber. 33: 93.
- HOMANN, K. (1960): Flamingo bei Magdeburg. Mittbl. BFA Ornithol. Vogelsch. Magdeburg 1: 31.
- HORVÁTH, M., L. HARASZTHY, J. BAGYURA & A. KOVÁCS (2000/2001): Eastern Imperial Eagle (*Aquila heliaca*) populations in Europe. Aquila 107/108: 193-204.
- HRNCIRIK, H. (1968): Löffler (*Platalea leucorodia* L.) im Unterharz. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 100.
- HUBATSCH, K. (2008): Zweiter deutscher Nachweis eines Habichtsadlers *Aquila fasciata* in Nordrhein-Westfalen. Limicola 22: 177-180.
- HÜBNER, M. (1920): Fremde Gäste. Ornithol. Monatsschr. 45: 140-141.
- HÜPPOP, O., H.-G. BAUER, H. HAUPT, T. RYSLAVY, P. SÜDBECK & J. WAHL (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Ber. Vogelsch. 49/50: 23-83.
- HULLEN, M. & A. KIRZINGER (2005): Artenbericht 2005. Nationalpark Harz.
- HUTH, J. & H.-M. OELERICH (2013): Zweiter Brutnachweis der Rotdrossel *Turdus iliacus* in Sachsen-Anhalt. Apus 18: 55-57.
- IfAÖ (2011): Spezielle Untersuchungen zur Ursachenermittlung von Bestandsveränderungen von Vogelarten in Sachsen-Anhalt: Analyse von populationsökologischen Parametern, Wanderbewegungen und Todesursachen von Vogelarten in Sachsen-Anhalt anhand von Beringungs- und Wiederfunddaten der Beringungszentrale Hiddensee. Unveröff. Ber. i. Auftr. des LAU.
- VON ILTEN, F. (1938): Wald und Jagd in der Letzlinger Heide. Beitr. Altmark. Heimatkd. 2: 141-171
- ISSA, N. & Y. MULLER (2015): Atlas des oiseaux de France métropolitaine – Nidification et présence hivernale. Paris.
- JAWOROWSKI, L. (1966): Seidenreiher bei Halle (Saale). Apus 1: 92.
- JENTZSCH, M. (1989): Zum Brutvorkommen von Wacholderdrossel und Raubwürger im Kreis Sangerhausen. Apus 7: 131-135.
- JENTZSCH, M. & F. OTTO (1988): Untersuchungen an Wintergewöllen des Raubwürgers (*Lanius excubitor* L.). Beitr. Vogelkd. 34: 93-100.
- DE JUANA, E. & E. GARCIA (2015): The Birds of the Iberian Peninsula. London.

- JURGEIT, S. (1996): Nordische Schafstelzen an der Kiesgrube Sollnitz. Apus 9: 191-192.
- JUST, A. (1832): Meine Beobachtungen über die am Eisleber Salzsee vorkommenden Vögel. Leipzig.
- KACZMAREK, U. (2009): Die Gebäudebrüter in Roßlau, Streetz und Natho. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 21: 19-31.
- KALLENBACH, G., U. PATZAK & F. JURGEIT (2006): Gebäudebrüterschutz in Sachsen-Anhalt am Beispiel der Stadt Dessau. Natursch. Land Sachs.-Anhalt 43: 21-29.
- KAMP, J. (2008): Der Steppenkiebitz – Forschung an einer weltweit bedrohten Art. Falke 55: 130-135.
- KAMP, J. (2010): Neues vom Steppenkiebitz. Falke 57: 113-115.
- KAMP, J. (2011): Zug des Steppenkiebitzes – live im Internet. Falke 58: 101-103.
- KANT, H. (1968): Thorshühnchen am Süßen See und am Stausee Berga-Kelbra. Apus 1: 251-252.
- KANT, H. & K. LIEDEL (1987): Meerstrandläufer bei Halle. Apus 6: 227-230.
- KARLSTEDT, K. (1979): Die Bedeutung des Helmestausees für Wasservögel. Beitr. Vogelkd. 25: 75-80.
- KATHÖVER, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Altengraber Heide in den Jahren 2003/04. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 87-93.
- KATHÖVER, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Nordöstlicher Unterharz im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 100-105.
- KEES, W. (1964): Thorswassertreter (*Phalaropus fulicarius*) bei Halle/Saale. Ornithol. Mitt. 16: 107.
- KEIL, D. (1984): Die Vögel des Kreises Hettstedt. Apus 5: 149-208.
- KEIL, D. (1993/94a): Beobachtung des Braunen Sichlers, *Plegadis falcinellus* (L., 1766), an der Helme und an den Fischteichen Auleben im Landkreis Nordhausen. Thür. Ornithol. Mitt. 43/44: 69-70.
- KEIL, D. (1993/94b): Löffler, *Platalea leucorodia* L., 1758, an den Fischteichen Auleben und am Helmestausee Berga-Kelbra. Thür. Ornithol. Mitt. 43/44: 71-72.
- KEIL, D. (1996a): Steppenkiebitz, *Chettusia gregaria* (PALLAS 1771), an den Fischteichen Auleben und am Helmestausee. Thür. Ornithol. Mitt. 46: 55-57.
- KEIL, D. (1996b): Thorshühnchen am Helmestausee Berga-Kelbra. Apus 9: 187-188.
- KIPP, F. A. (1956): Die Gattung *Coturnix* – eine Invasionsvogelgruppe. Vogelwarte 18: 160-164.
- KIRMSE, M. (1955): Avifaunistische Beobachtungen am Süßen See bei Eisleben 1954/1955 unter Berücksichtigung der über dieses Gebiet vorliegenden früheren Befunde. Staatsexamensarb. Halle/S.
- KISS, J. B. & L. SZABÓ (2000): Der Weißschwanzkiebitz *Vanellus leucurus* als europäischer Brutvogel im Donaudelta. Limicola 14: 113-123.
- KLAMMER, G. (1991): Untersuchungen im östlichen Saalkreis zum Bestand und zur Reproduktion von Greifvögeln und Eulen, die auf Elektrogittermasten horsten. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 79-83.
- KLEBB, W. (1984): Die Vögel des Saale-Unstrut-Gebietes um Weißenfels und Naumburg. Apus 5: 209-304.
- KLEINSCHMIDT, O. (1907/08): *Erithacus Domesticus*. Berajah: 1-14.
- KLEINSCHMIDT, O. (1912): Stichproben über den Vogelbestand des Kulturlandes. Falco 8: 2-15, 17-23, 25-40, 59-81.
- KLEINSCHMIDT, O. (1930): *Certhia Macronyx* (Kl.). Berajah, Zoographia infinita. Halle a. S.
- KLEINSCHMIDT, O. (1942): Fragen. Falco 38: 2.
- KNOLLE, F. & H. HECKENROTH (1985): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.4.
- KNOLLE, F., P. MANNES & H. ZANG (1973): Bestandsabnahme des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Westharz. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 5: 1-7.
- KNOPF, O. (1940): Zwei Brutten von Schwarzkehlchen bei Aken an der Elbe. Beitr. Avifauna Mitteltd. 4: 54-58.
- VON KNORRE, D., G. GRÜN, R. GÜNTHER & K. SCHMIDT (1986): Die Vogelwelt Thüringens. Jena.
- KOCH, E. & B. ROHN (1987): Die Brutvögel Halle-Neustadts. Halle
- KÖCK, U. (1977): Das Vorkommen der Entenvögel (Anatidae) im Kreis Bitterfeld unter besonderer Berücksichtigung der ausgekohlten Braunkohlengruben. Hercynia N. F. 14: 447-463.
- KÖNIG, C., S. STÜBING & J. WAHL (2014): Vögel in Deutschland aktuell: Frühjahr 2014: Frühe Brutten, eilige Klappergrasmücken und viele Weißflügel-Seeschwalben. Falke 61: 24-29.
- KÖNIG, H. (1968): Die Vogelbestände einiger Bestandstypen des Kiefernforstes und der *Calluna*- und Grasheide in den Thekenbergen (Kreis Halberstadt) in den Jahren 1961-1963. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 67-98.
- KÖNIG, H. (1971): Rotrückengewürger (*Lanius collurio*) füttert adulten Rotkopfwürger (*Lanius senator*). Beitr. Vogelkd. 17: 184.
- KÖNIGSTEDT, D. & B. NICOLAI (1972): Zur Kenntnis der Avifauna des Kreises Burg – I. Teil. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 7: 43-80.
- KÖNIGSTEDT, D. & D. ROBEL (1978): Zur Problematik ornithologischer Sichtnachweise. Cottbus.
- KOLBE, E. (1932): *Surnia ulula ulula* (L.) bei Klieken. Beitr. Avifauna Anhalts 3(2): 1.
- KOLBE, E. (1937): Die Gebirgsstelze, *Motacilla c. cinerea* Tunst., als Brutvogel bei D.-Roßlau. Beitr. Avifauna Mitteltd. 1: 18-20.
- KOLBE, H. (1963): Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) auf der südlichen Flämingabflachung. Vogelwelt 84: 84-90.
- KOLBE, H. (1966): Phänologische und brutbiologische Daten der Gebirgsstelzen-Population der südlichen Flämingabdachung. Apus 1: 80-82.
- KOLBE, H. (1972): Purpurreiher am Deetzer Teich. Apus 2: 275.
- KOLBE, H. (1999): Die Entenvögel der Welt. 5. Aufl. Stuttgart.
- KOLBE, H. (2001): Erstimporte, markante Punkte früherer Haltungen sowie Erstzuchten der Entenvögel in Deutschland bis zum Jahresende 2000. Zool. Garten N.F. 71: 243-265, 335-353.
- KOLBE, H. (2009): Rauhfußkauz *Aegolius funereus* und Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* als neue Brutvogelarten im Hohen Fläming. Apus 14: 3-13.
- KOLBE, H., R. SCHMIDT, E. SCHWARZE & T. HOFMANN (2012): Zur Geschichte der Vogelkunde in Dessau. Dessau.
- KOLBE, H., E. SCHWARZE & U. PATZAK (2018): Kommentierte Artenliste der Vögel im östlichen Anhalt für den Zeitraum 2006 bis 2016. Apus 23, Sonderh.: 3-179.
- KOLBE, M. (1965): Ringelgans und Rotkehlpieper auf dem Frühjahrsdurchzug im Mittelgebirge. Falke 12: 211.

- KOLBE, U. & J. NEUMANN (1991): Ein typischer Irrgast? Der Löffler in Ostdeutschland. Falke 38: 212-223.
- KOMISJA FAUNISTYCZNA (2015): Rare birds in Poland 2014. Ornithologica 56: 99-136.
- KOOP, B. & R. K. BERNDT (2014): Zweiter Brutvogelatlas. Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Bd. 7. Kiel.
- KOOP, D. (1967): Mittlere Raubmöwe bei Bernburg? Falke 14: 136.
- KOOP, D. (1971): Ergebnisse mehrjähriger Greifvogel-Kartierung in einem Auwald der unteren Saale. Apus 2: 177-183.
- KOZLOVA, E. V. (1962): Ržankooobraznye. Podotradj Kuliki. In: Fauna SSSR. Pticy. Tom II. Vyp. 1, čast' 3. Moskau, Leningrad.
- KRAUSE, S. (1987): Die Brutvögel eines Haldengehölzes bei Halle. Apus 6: 256.
- KRATZSCH, L. & U. PATZAK (2010): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Drömling im Jahr 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 39-53.
- KRATZSCH, L. & M. STUBBE (2003): Untersuchungen zum Höhlenbrüterbestand des Hakels im nördlichen Harzvorland. Tiere im Konflikt 8: 3-160.
- KRIEGS, J. O., F. BINDRICH & H. H. DÖRRIE (2012): Das Auftreten der Rötelschwalbe *Cecropis daurica* in Deutschland. Seltene Vögel Dt. 2010: 58-63.
- KRIETSCH, C. (1926): Hochbrut eines Grauummers. Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel 2: 35-37.
- KRIETSCH, C. (1932): *Clamater glandarius*, Häherkuckuck bei Dessau! Mitt. Vogelwelt 31: 114.
- KRÜGER, A. (1925): Verzeichnis der Vogelsammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatkund. Magdeburg 4: 203-229.
- KRÜGER, A. (2006): Ein Grasläufer in der Kiesgrube Burgliebenau. Apus 13: 139.
- KRÜGER, T. (2013): Das Vorkommen der Sperbereule *Surnia ulula* in Deutschland. Vogelwelt 134: 203-232.
- KRÜGER, T. & J.-A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. Limicola 21: 185-217.
- KRÜGER, T., J. LUDWIG, S. PFÜTZKE & H. ZANG (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008. Natursch. Landschaftspf. Niedersachs. 48: 1-552.
- KÜHLHORN, F. (1935): Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. Mein Mansfelder Land, Beil. Eisleber Ztg. 10: 190-200, 233-236, 364-368.
- KÜHLHORN, F. (1937): Nestbautypen bei der Nachtigall (*Luscinia m. megarhynchos* Brehm). Ornithol. Monatsschr. 62: 152-157.
- KÜHLHORN, F. (1938): Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. 2. Nachtrag. Mein Mansfelder Land. Beil. Eisleber Ztg. 13: 105-124.
- KUHLIG, A. & K. HEINL (1983): Die Vogelwelt des Kreises Bitterfeld. Teil 1 u. Teil 2. Bitterfelder Heimatbl., Sonderh.: 1-48, 49-96.
- KUHLIG, A. & H. MAHLER (1993): Raubwürger brütet auf Gittermast. Apus 8: 238-239.
- KUHLIG, A. & M. RICHTER (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. Bitterfelder Heimatbl., Sonderh.: 1-204.
- KUHNERT, M. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Kletzer Heide im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 73-77.
- KUMMER, J. (1962): Ein Baßtölpel, *Sula bassana*, in der Altmark. Beitr. Vogelkd. 7: 450-451.
- KUMMER, J. (1977): Wieder ein Baßtölpel, *Sula bassana*, in der Altmark. Beitr. Vogelkd. 23: 190-191.
- KUMMER, J. (1983): Beitrag zur Avifauna von Halle. Apus 5: 53-66.
- KUMMER, J. (1987): Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*) bei Stendal gefunden. Beitr. Vogelkd. 33: 230-231.
- KUMMER, J., M. MÜLLER & H. STEIN (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 8: 31-77.
- KUPPE, K. (1968): Zu Vorkommen des Rotkopfwürgers – *Lanius senator* L. – im Gebiet des Süßen Sees bei Eisleben. Apus 1: 171-172.
- KURTHS, J. (1986): Die Vogelbestände des Westfriedhofes in Magdeburg. Apus 6: 172-176.
- LANDMANN, A. (1996): Der Hausrotschwanz. Vom Fels zum Wolkenkratzer – Evolutionsbiologie eines Gebirgsvogels. Wiesbaden.
- LANGE, U. (1978): Chile-Flamingo an der Elbe und im NSG „Gerlebogker Teiche“. Apus 4: 93-94.
- LAPPO, E. G., P. S. TOMKOVIČ & E. E. SYROEČKOVSKIJ (2012): Atlas of breeding waders in the Russian Arctic. Moskau.
- LEHMANN, B., C. ENGELMANN, R. ZSCHÄPE, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2009): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Salziger See und Salzatal im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 45-52.
- LIEBE, T. (1907): Nachtrag zu meinem vorjährigen Aufsatz über den Steinsperling (*Petronia petronia*). Ornithol. Monatsschr. 32: 398-410.
- LIEDEL, K. (1970a): Das Vorkommen der Wassertreter in den Bezirken Halle und Magdeburg. Apus 2: 54-67.
- LIEDEL, K. (1970b): Das Vorkommen des Sumpfläufers in den Bezirken Halle und Magdeburg. Apus 2: 140-147.
- LINDNER, C. (1898): Kleinere ornithologische Mitteilungen. Ornithol. Monatsschr. 23: 226-227.
- LINDNER, C. (1907): Nachtrag zu meinem vorjährigen Aufsatz über den deutschen Steinsperling (*Petronia petronia*). Ornithol. Monatsschr. 32: 398-410.
- LINDNER, C. (1919): Die Brutvögel von Naumburg, Weißenfels, Zeitz und Umgegend. Meist nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt und allen Freunden der Natur als ein Beitrag zur Heimatkunde und zur Förderung der Heimatliebe und des Heimatschutzes gewidmet. 2. Aufl. Naumburg a. S.
- LINDNER, C. (1920): Einige Seltenheiten aus der Nähe von Naumburg a. S. in den letzten zwanzig Jahren. Ornithol. Monatsschr. 45: 188-189.
- LINDNER, F. (1886): Einzelnotizen aus meinem ornithologischen Taschenbuch I-III. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 11: 16-20, 39-41, 153-158.
- LINDNER, F. (1888): Ein Taucher erlegt bei Zeitz. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 13: 120.
- LINDNER, F. (1901): Grundstein zur Ornithologie des Fallsteingebietes. Ornithol. Monatsschr. 26: 33-56, 81-96, 117-132, 153-167.

- LINDNER, F. (1904): Zweiter Nachtrag zur Ornithologie des Fallsteingebietes, umfassend die Zeit vom 1. Juni 1901 bis zum 18. August 1904. Ornithol. Monatsschr. 29: 376-395, 422-439.
- LINDNER, F. (1912): Systematisches Verzeichnis aller bis Juli 1910 nachgewiesenen Vogelarten des Fallsteingebietes mit kurzer Charakteristik ihres Vorkommens. Osterwieck.
- LINDNER, F. (1919): Ornithologische Seltenheit. Quedlinburger Ztg. Nr. 255 v. 08. November 1919.
- LINDNER, M. & H. KOLBE (2013): 528 Euro für das Fällen eines Höhlenbaumes mit Rauhußkauzbrut. Eulen-Rundblick 63: 72.
- LIPPERT, W. (1964): Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) bei Tangermünde. Beitr. Vogelkd. 9: 377.
- LIPPERT, W. (1974): Rallenreier, *Ardeola ralloides*, südlich Tangermünde/Elbe beobachtet. Beitr. Vogelkd. 20: 247.
- LIPPERT, W. (2007): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Mahlpfuhler Fenn im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 83-88.
- LIPPERT, W. & R. AUDORF (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Aland-Elbe-Niederung im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 54-60.
- LOOSE, J. (1968): Purpurreier am Schellendorfer See. Apus 1: 250-251.
- LUDWIGS, J.-D. (2009): Raumnutzung der Wachtel *Coturnix coturnix* in der Agrarlandschaft. Vortrag zur 19. Jahrestagung des Vereins Thüringer Ornithologen in Mühlberg.
- LUGE, J. (1998): Kuhreier im Kreis Köthen. Apus 10: 87-88.
- LUGE, J. (2002): Neuntöter und Sperbergrasmücke als unmittelbare Brutnachbarn. Apus 11: 278-279.
- LUGE, J. (2004): Beobachtungen an einem Neuntöttervorkommen im Kreis Köthen. Apus 12: 176-189.
- LUTHER, D. (1955): Der Schmalschnäblige Wasserreiter – Herbstdurchzügler in Anhalt. Falke 2: 105.
- LUTHER, D. (1972): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg. (Harz) I. Apus 2: 218-226.
- LUTHER, D. (1978): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg/Harz (II). Apus 4: 67-70.
- LUTHER, D. & D. LUTHER (1986): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg (III). Apus 6: 110-118.
- MÄDLow, W. & C. MAYR (1996): Die Bestandsentwicklung ausgewählter gefährdeter Vogelarten in Deutschland 1990-1994. Vogelwelt 117: 249-260.
- MÄDLow, W. & N. MODEL (2000): Vorkommen und Bestand seltener Brutvogelarten in Deutschland 1995/96. Vogelwelt 121: 189-205.
- MAKATSCH, W. (1955): Der Brutparasitismus in der Vogelwelt. Radebeul.
- MAMMEN, K., U. MAMMEN, G. DORNBUSCH & S. FISCHER (2013): Die Europäischen Vogelschutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 10: 1-271.
- MAMMEN, U. (1995): Die Situation der Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes) in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1994. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 13: 101-114.
- MAMMEN, U., B. NICOLAI, J. BÖHNER, K. MAMMEN, J. WEHRMANN, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2014): Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 1-160.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESEARITZ (2007a): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Fallsteingebiet nördlich Osterwieck im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 89-93.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESEARITZ (2007b): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Huy nördlich von Halberstadt im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 95-100.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1995): Alterseinschätzung und Brutbeginn des Rotmilans (*Milvus milvus*). Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 91-98.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1996): Der Greifvogelhorst in seiner populationsökologischen Bedeutung. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 3: 87-111.
- MARSHALL, W. (1899): Die Tierwelt des Harzes. In: HOFFMANN, H.: Der Harz, S. 39-60, Leipzig.
- MAUMARY, L., L. VALLOTON & P. KNAUS (2008): Die Vögel der Schweiz. Montmollin.
- MEBS, T. (2001): Aktuelle Verbreitung und Arealerweiterung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. Kauzbrief 14: 4-12.
- MEBS, T. (2008): Zur aktuellen Situation des Habichtskauzes *Strix uralensis* in Europa. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 40: 241-246.
- MEBS, T. & G. NICKLAUS (2014): Die Brutvorkommen der Zwergohreule *Otus scops* in Deutschland. Ornithol. Anz. 53: 94-104.
- MEIER, H. (1969): Neuntöter erbeutet Braunkehlchen. Falke 16: 390
- MEISSNER, S. (1962): Zweite Flamingobeobachtung bei Merseburg. Merseburger Land 1962: 245.
- MENZEL, F. (1909): Die Vogelwelt von Helmstedt (Herzogtum Braunschweig) und Umgebung. Ornithol. Jb. 20: 85-117.
- MENZEL, F. (1917): Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirkes Harzburg. Ornithol. Jb. 28: 61-80.
- MENZEL, F. (1927): Die Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirks Calvörde. Ornithol. Monatsschr. 52: 138-147, 153-164.
- MENZEL, F. (1933): Bemerkungen zur Vogelwelt des Freistaates Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Ornithol. Monatsschr. 58: 153-178, 186-189.
- MERTENS, A. (1909a): Der braune Sichler *Plegadis autumnalis* Hasselqu. bei Magdeburg. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatkd. Magdeburg 2: 100.
- MERTENS, A. (1909b): Ein Rosenstar *Pastor roseus* L. in der Altmark. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatkd. Magdeburg 2: 100.
- MEYER, A. B. (1889): Die Wanderungen des Rosenstaars (*Pastor roseus* L.) nach Europa, speciell die Wanderung im Jahre 1889. In: MEYER & HELM: IV. Jber. (1888). Orn. Beobachtungsstationen Sachsen, Dresden, Anhang 1: 136-147.
- MIKKOLA, H. (2013): Owls of the World: A Photographic Guide. 2. Aufl. London.
- MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES BRANDENBURG (MLUV) (2009): Die Hainbuche im nordostdeutschen Tiefland – Wuchsverhalten und Bewirtschaftungshinweise. Eberswalder Forstl. Schr.R. Bd. 41: 1-129.

- MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (MLUR) (2002): Artenschutzprogramm Auerhuhn. Potsdam.
- MISSBACH, D. (1975b): Fische als Beute des Raubwürgers. Falke 22: 314-315.
- MÖCKEL, R. (1996): Arealveränderungen des Raufußkauzes *Aegolius funereus* im Osten Deutschlands. Vogelwelt: 117: 57-66.
- MRLIK, V. & B. LANDSFELD (2002): The occurrence of Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*) in parts of Central Europe during 1980-1998 and possible factors for its recent expansion. Egretta 45: 104-114.
- MÜHLMANN, K.-H. (1927a): *Stercorarius pomarinus* (Tem.) bei Großrodensleben erlegt. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 6.
- MÜHLMANN, K.-H. (1927b): Zum Vorkommen des Mornellregenpfeifers bei Magdeburg zur Zugzeit. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 26.
- MÜHLMANN, K.-H. (1927c): *Stercorarius pomarinus* in der Provinz Sachsen. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 27.
- MÜLLER, A. (1880): Meine während der Brutzeit gemachten ornithologischen Beobachtungen am Salzigen See bei Eisleben. Zool. Garten 21: 20-24, 48-53, 82-86.
- MÜLLER, A. (1928): Brutvögel des Oberharzes und ihre vertikale Verbreitung. Verh. Ornithol. Ges. Bayern 18: 160-164.
- MÜLLER, H. (1969): Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus* [L.]) bei Hoym im Nordharzvorland. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 4: 80-81.
- MÜLLER, H. (1987): Graubruststrandläufer 1982 bei Tangermünde. Apus 6: 236-237.
- MÜLLER, H.-H. (1977): Subfossile Pelikanfunde aus dem Gebiet der DDR. Hercynia N. F. 14: 352-354.
- MÜLLER, H.J. (1953): Schwarzstirn- und Rotkopfwürger im nordöstlichen Harzvorland. Beitr. Vogelkd. 3: 138-145.
- MÜLLER, J. (1966a): Beobachtungen an Schwarzstirnwürgern (*Lanius minor* Gm.) und Rotkopfwürgern (*Lanius s. senator* L.) aus dem Bördegebiet. Beitr. Vogelkd. 11: 331-333.
- MÜLLER, J. (1966b): Aus der Vogelsammlung des Kreisheimatmuseums Staßfurt. Beitr. Vogelkd. 12: 125-126.
- MÜLLER, J. (1968): Purpurreier bei Unseburg und Löderburg. Apus 1: 250.
- MÜLLER, J. (1997): Lausfliegen-Funde von heimischen Vögeln, nebst Bemerkungen zur deutschen Checkliste Diptera: Hippoboscidae. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 15: 115-132.
- MÜLLER, J. (2005): Erstnachweis eines Buschspötters *Hippolais caligata* in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 1-10.
- MÜLLER, S. (1966): Nachweis eines Eissturmvogel in Brandenburg. Falke 13: 331.
- MÜLLER, S. (1978): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg. Jahresbericht für 1976. Ornithol. Rundbr. Mecklenburg N. F. 19: 39-69.
- VON MÜNCHHAUSEN, B. (1857): Notizen. Naumannia 7(2): 83-84.
- NACHTIGALL, W. (1999): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus* Linné, 1758) im nordöstlichen Harzvorland. Diplomarb. Univ. Halle-Wittenberg.
- NACHTIGALL, W. & W. GLEICHNER (2005): Mischbruten zwischen Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* – ein weiterer Fall aus Sachsen. Limicola 19: 180-194.
- NACHTIGALL, W., M. STUBBE & S. HERRMANN (2003): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Winter – eine telemetrische Studie im Nordharzvorland. J. Ornithol. 144: 284-294.
- VON NATHUSIUS, G. (1925): Die Vogelarten des Kreises Neuhaudensleben Reg.-Bez. Magdeburg. J. Ornithol. 73: 539-547.
- VON NATHUSIUS, G. (1926): *Stercorarius pomarinus* in der Provinz Sachsen. Ornithol. Monatsber. 34: 20.
- VON NATHUSIUS, G. (1929): Seltenheiten vom Jahr 1928 aus dem Bezirk Magdeburg. Ornithol. Monatsber. 37: 45.
- VON NATHUSIUS, G. (1931): Beobachtungen und Seltenheiten 1930/31. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 5(2): 35-36.
- VON NATHUSIUS, G. (1939): Meine Vogelsammlung mit Beobachtungen aus den Jahren 1904-1939. Beitr. Avifauna Mitteltd. 3, Sonderh.: 1-26.
- NAUMANN, J. A. (1799a): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 2. Köthen.
- NAUMANN, J. A. (1799b): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 3. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1803): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 4.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1804): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 1. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1805): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 2. Nachtrag. Köthen. .
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1808): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 3. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1811): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 4. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1817): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 8. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. F. (1820): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 1. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1822): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 2. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1823): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 3. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1824): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 4. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1826): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 5. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1833): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 6. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1834): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 7. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1836): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 8. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1838): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 9. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1840): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 10. Leipzig.

- NAUMANN, J. F. (1842): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 11. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1844): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 12. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1849): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in Anhalt. Naumannia 1(1): 1-11.
- NAUMANN, J. F. (1850): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in unserm Anhalt. Naumannia 1(2): 1-23.
- NAUMANN, J. F. (1854): Reminiscenzen über stufenweise Entwicklung der vaterländischen Ornithologie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. Naumannia 4: 149-160.
- NAUMANN, J. F. (1860): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 13.: Nachträge und Verbesserungen. Stuttgart.
- NEHRING, S. & S. SKOWRONEK (2017): Die invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 – Erste Fortschreibung. BfN-Skripten 471: 1-176.
- NEUBAUER, R. (1908): Die Fauna Krosigks. Göttingen.
- NEUMANN, J. (1986): Die Brutnachweise der Zwergtrappe, *Tetrax tetrax* L., in der Mark Brandenburg. Beitr. Vogelkd. 36: 62.
- NEUMANN, J. & U. KOLBE (1988): Der Eissturmvogel in der DDR. Falke 35: 14-17.
- NEUSCHULZ, F. (1988): Zur Synökie von Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (Bechst., 1795) und Neuntöter *Lanius collurio* (L., 1758). Ergebnisse einer populationsbiologischen Studie. Lüchow-Dannenberg Ornithol. Jber. 11: 1-234.
- NICOLAI, B. (1972): Der Vogelbestand einer Kontrollfläche in der Elbniederung westlich von Burg bei Magdeburg. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 69-82.
- NICOLAI, B. (1988a): Kartierung bestandsgefährdeter Brutvogelarten im Bezirk Magdeburg. Hinweise (4). Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artenschutz Magdeburg 11(2): 1-4.
- NICOLAI, B. (1988b): Revierbesetzungsfolge beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Acta Ornithocol. 1: 367-377.
- NICOLAI, B. (1992a): Quantitative Untersuchungen zum Polymorphismus der Gefiederfärbung beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Anz. Ver. Thür. Ornithol. 1: 65-72.
- NICOLAI, B. (1992b): Brutbiologische Angaben für den Hausrotschwanz in Sachsen-Anhalt. Apus 8: 66-77.
- NICOLAI, B. (1992c): Gesangsdialekt beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Tradierung und Gesangslernen. Rudolstädter nat.hist. Schr. 4: 83-90.
- NICOLAI, B. (1992d): Untersuchungen zur Nahrung und zum Nahrungserwerb des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 10: 75-105.
- NICOLAI, B. (1993): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. Jena & Stuttgart.
- NICOLAI, B. (1995): Bestand und Bestandsentwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Ostdeutschland. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 11-19.
- NICOLAI, B. (1997): Vögel (Aves) in: Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt, Landschaftsraum Harz. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 233-243.
- NICOLAI, B. (2001): Über das Füttern fremder Jungvögel beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Anz. Ver. Thür. Ornithol. 4: 173-177.
- NICOLAI, B. (2002): Ökologie und Brutbiologie des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (S. G. GME-LIN 1774) in Halberstadt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 20: 3-55.
- NICOLAI, B. (2006): Rotmilan *Milvus milvus* und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland. Situation 2006. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: 1-34.
- NICOLAI, B. (2011): Rotmilan *Milvus milvus* und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland: Situation 2011. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 29: 1-26.
- NICOLAI, B. (2012): Phänologie der Frühjahrsankunft beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* in Mittelddeutschland in den letzten 200 Jahren. Ökol. Vögel 34: 507-524.
- NICOLAI, B. & M. BIRTH (1975): Spurbereule bei Burg beobachtet. Apus 3: 284-285.
- NICOLAI, B. & W. BÖHM (1997): Zur aktuellen Situation der Greifvögel (Accipitridae) insbesondere des Rotmilans *Milvus milvus* im nordöstlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 15: 73-87.
- NICOLAI, B. & W. BÖHM (1999): Zur Bestandsentwicklung des Rotmilans *Milvus milvus* im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 17: 109-112.
- NICOLAI, B., E. BRIESEMEISTER, H. STEIN & K. J. SEELIG (1982): Avifaunistische Übersicht über die Passeriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises "Mittelelbe – Börde". Magdeburg.
- NICOLAI, B., E. GÜNTHER & M. HELLMANN (2009): Artenschutz beim Rotmilan. Zur aktuellen Situation in seinem Welt-Verbreitungszentrum Deutschland/Sachsen-Anhalt. Natursch. Landschaftspl. 41: 69-76.
- NICOLAI, B., E. GÜNTHER & E. KARTHEUSER (2012): Rotmilane *Milvus milvus* als Opfer eines Hagelschlages. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 123-126.
- NICOLAI, B. & M. HELLMANN (2008): Der Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* im Harz und sein Vorkommen auf der Brockenkuppe. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 40: 269-275.
- NICOLAI, B. & U. MAMMEN (2009): Dichtezentrum des Rotmilans *Milvus milvus* im Nordharzvorland – Bestandsentwicklung, Ursachen und Aussichten. Inform.dienst Natursch. Niedersachs. 29(3): 144-150.
- NICOLAI, B., U. MAMMEN & M. KOLBE (2017): Long-term changes in population and habitat selection of Red Kite in the region with the highest population density. Vogelwelt 137: 194-197.
- NICOLAI, B., F.-U. SCHMIDT & C. SCHMIDT (1996): Gefiedermerkmale, Maße und Alterskennzeichen des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros*. Limicola 10: 1-41.
- NICOLAI, B. & M. WADEWITZ (2003): Die Brutvögel von Halberstadt. Ergebnisse einer Brutvogelkartierung 1998 bis 2002. Abh. Ber. Mus. Heineanum 6, Sonderh.: 1-187.
- NICOLAI, B. & F. WEIHE (2001): Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland – Situation 2001. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 33-47.
- NIELITZ, U. & B. NICOLAI (2013): Außergewöhnlicher Fall einer „Doppelbrut“ beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 31: 65-72.
- NIETHAMMER, G. (1938): Handbuch der deutschen Vogelkunde. Bd. 2. Leipzig.
- NIETHAMMER, G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa – Ergebnisse und Aussichten. Hamburg.
- NOTHDURFT, W. (1960): Die Vogelwelt von Buntenbock. Unser Harz, H. 3: 8-10.

- OAK NORDHARZ U. VORLAND (1972): Avifaunistischer Jahresbericht 1971 für den Nordharz und das nördliche Vorland. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 7: 81-108.
- OBEBECK, H. (1906): Brutverhältnisse in der Saale-Niederung bei Bernburg. Ornithol. Monatsber. 14: 121-127.
- OLEJNIK, O. (2012): Beobachtungen zur Rufaktivität und zum Habitat der Wachtel *Coturnix coturnix* aus der nördlichen Altmark. Ornithol. Mitt. 64: 329-332.
- OLSEN, K. M. & L. JONSSON (1989): Die Bestimmung der Raubmöwen Stercorariidae. Limicola 3: 93-136.
- OLSEN, K. M. & H. LARSSON (1997): Skuas and jaegers: a guide to the skuas and jaegers of the world. London.
- ORTLIEB, R. (1973): Über das Führen der Jungen bei der Wachtel. Falke 20: 318.
- ORTLIEB, R. (1974): Bruten des Raubwürgers im Westteil des Kreises Eisleben. Apus 3: 108-113.
- ORTLIEB, R. (1980): Der Rotmilan. Neue Brehm-Bücherei 532. Wittenberg-Lutherstadt.
- ORTLIEB, R. (1982): Zur Bestandsentwicklung des Raubwürgers im Westteil des Kreises Eisleben. Apus 5: 36-38.
- ORTLIEB, R. (1988): Kaiseradlerbeobachtung im Bezirk Halle. Falke 35: 230-231.
- OSTERWALD, D. (1951): Raubwürger als Stadtgast. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 45.
- OTTO, A. (1901): Katalog der Vogelsammlung des Gymnasiums zu Eisleben, nebst einer Übersicht über die in der Grafschaft Mansfeld beobachteten Vögel. Jber. Königl. Gymnasiums Eisleben 1901, Beil.: 1-55.
- OTTO, W. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 44-53.
- PÄSSLER, W. (1854): Ornithologische Aphorismen. J. Ornithol. 2: 180-182.
- PÄSSLER, W. (1856): Die Brutvögel Anhalts. J. Ornithol. 4: 34-68.
- PÄSSLER, W. (1857): Beobachtung über ziehende und brütende Vögel in Anhalt, im Frühjahr 1857. J. Ornithol. 5: 399-415.
- PÄSSLER, W. (1859): Etwas Ornithologisches aus Anhalt vom Jahre 1859. J. Ornithol. 7: 318-319.
- PÄSSLER, W. (1861): Beobachtungen in den Jahren 1859 und 1860 in der Umgegend von Mühlstedt und Rosslau, in Anhalt. J. Ornithol. 9: 433-439.
- PÄSSLER, W. (1867): Einige Beobachtungen aus dem Jahre 1866. J. Ornithol. 15: 56-64.
- PANOV, E. N. (1983): Die Würger der nördlichen Paläarktis. Neue Brehm-Bücherei 557. Wittenberg-Lutherstadt.
- PARKIN, D. T. & A. G. KNOX (2010): The Status of Birds in Britain and Ireland. London.
- PATZAK, U. (2003a): Die Bedeutung der Elbaue bei Wörlitz für Greifvögel. Apus 11: 385-394.
- PATZAK, U. (2003b): Die Gebäudebrüter der Stadt Dessau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 15: 105-120.
- PATZAK, U. & K.-J. SEELIG (2006): Die Brutvögel des Mittelbegebietes zwischen Mulde- und Saalemündung. Apus 13, Sonderh.: 1-119.
- PELNY, H.-J. (2002): Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Landkreis Lüchow-Dannewitz von 1965 bis 2002. Lüchow-Dannewitz. Ornithol. Jber. 15/16: 489-498.
- PERTL, C. & T. SPÄTH (2014): Ergebnisse der Erfassung wertgebender Brutvogelarten im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt) und EU SPA Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2013. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 41-48.
- PIECHOCKI, R. (1954): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 1. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 3: 274-279.
- PIECHOCKI, R. (1958): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 2. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 6: 106-112.
- PIECHOCKI, R. (1965): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 4. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 10: 413-425.
- PIECHOCKI, R. (1979): Christian Ludwig Nitzsch, Ordinarius für Naturgeschichte an der Universität Halle, an Johann Friedrich Naumann. Wiss. H. Pädagog. Hochsch. Köthen 6(1): 49-76.
- PIETSCHMANN, G. (2002): Forstgeschichte und Waldentwicklung im Staatlichen Forstamt Nedlitz. Wald in Sachsen-Anhalt Bd. 12. Magdeburg.
- PIRL (1889): Eine Schneeeule erlegt bei Wittenberg. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 14: 168-170.
- PLASCHKA, F. (1970): Bestand und Ökologie der Greifvögel und Eulen des Kreises Merseburg. Zusammengestellt nach Untersuchungen im Jahre 1969. Apus 2: 152-156.
- PLATH, L. (1979): Löffler (*Platalea leucorodia* L.) an der Mittelbe im Kreis Havelberg. Beitr. Vogelkd. 25: 124.
- PLATH, L. (1986): Die Brutvogelbestände an Hecken, Straßen und Wegen der Havelberger Oberfeldmark. Apus 6: 119-127.
- POHLE, W. & B. NICOLAI (2003): Beobachtungen an einem futterzahmen Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 21: 27-38.
- PONTIUS, H. (1986): Die ornithologischen Sammlungen am Naturkundemuseum Erfurt. Nachweise in Thüringen seltener Vogelarten. Veröff. Naturkundemus. Erfurt 5: 86-96.
- POTAPOV, E. & R. SALE (2012): The Snowy Owl. London.
- PRIGGE, R. (1967): Purpurreiher bei Tangerhütte. Falke 14: 282.
- PRIGGE, R. (1972): Beobachtung eines Thorswassertreters (*Phalaropus fulicarius*) am Treuel/Elbe im Bezirk Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 18: 434.
- PSCHORN, A. (2008a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Zeitzer Forst im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 35-41.
- PSCHORN, A. (2008b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 47-52.
- PSCHORN, A. (2011): Ergebnisse der landesweiten Erfassung von Raufußkauz (*Aegolius funereus*) und Sperlingskauz (*Glauclidium passerinum*) in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-82.
- PUZOVIC, S. (2000): Atlas Ptica Grabljivica Srbije – Atlas of Birds of Prey of Serbia. Beograd.
- RADOMSKI, U. (1986): Die Bergente (*Aythya marila*) als Brutvogel in Deutschland. J. Ornithol. 127: 509-511.
- REHBERG, H. & E. SPERLING (1927): Vogelfauna der Umgebung von Magdeburg. Ornithol. Monatsschr. 52: 63-68.
- RESEARITZ, A. (2006): Ökologie überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* (Linné, 1758) im Nordharzvorland. Jber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 4. Sonderbd.: 4-112.

- REY, E. (1871): Die Ornis von Halle. Z. ges. Naturwiss. 37 (N. F.): 453-489.
- REY, E. (1905): Die Eier der Vögel Mitteleuropas. Gera-Untermhaus.
- RIECHE, H. (1993): Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*, brütet im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 117.
- VON RIESENTHAL, O. (1876): Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mitteleuropas. Kassel.
- RIMPAU, W. (1906): [Rotköpfige und schwarzstirnige Würger im Kreis Oschersleben]. Ornithol. Monatsschr. 31: 417.
- RIMROD, F.L. (1840/41): Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthum Anhalt-Bernburg. Ber. naturwiss. Ver. Harzes 1840/41: 8-12.
- RIMROD, F.L. (1842): Die Strich- und Zugvögel, welche die Grafschaft Mansfeld und das Oberherzogthum Bernburg zu passieren pflegen. Ber. naturwiss. Ver. Harzes 1842, Beil.: 1-7.
- RIMROD, F.L. (1852): Einige ornithologische Wahrnehmungen und Bemerkungen. Naumannia 2(3): 21-24.
- RIMROD, F.L. (1866): Reihenfolge der Rückkehr des grössten Theils unserer Sommervögel im Frühling. Nach zwanzigjähriger Beobachtung zu Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld, welcher Ort unter dem 51° 45' nördlicher Breite liegt. J. Ornithol. 14: 354-360.
- RINGLEBEN, H. (1934): Ein Beitrag zur Avifauna der Goldenen Aue. Ornithol. Monatsschr. 59: 142-159, 161-165.
- RINGLEBEN, H. (1953): Kommt der Felsenpieper im nordwestdeutschen Binnenland vor? Beitr. Naturkd. Niedersachs. 6: 82-86.
- RINGLEBEN, H. (1957): Bergpieper (*Anthus s. spinoletta* [L.]) in Niedersachsen. Ber. naturhist. Ges. Hannover: 103: 91-100.
- RINGLEBEN, H. (1959): Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel. Nat.kdl. Abh. Niedersächs. Landesmus. 1: 26-56.
- RINGLEBEN, H. (1968): „Gebirgsvögel“ und andere Vogelarten im Harz. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 28-46.
- RINGLEBEN, H. (1974): Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Land. I. Teil: Passeriformes. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 6: 85-96.
- ROCHLITZER, R. (1972): Zum gegenwärtigen Auftreten der Entenvögel und der Greifvögel im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst, Teilgebiet Lödderitzer Forst. Hercynia N.F. 9: 279-301.
- ROCHLITZER, R. (1983): Graubruststrandläufer 1982 bei Köthen. Falke 30: 312-313.
- ROCHLITZER, R. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Monogr. Naumann-Mus. 1: 1-220.
- ROCHLITZER, R. & H. KÜHNEL (1979): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Monogr. Naumann-Mus. 1: 1-131.
- RÖDL, T., B.-U. RUDOLPH, I. GEIERSBERGER, K. WEIXLER & A. GÖRGEN (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern. Stuttgart
- RÖBLER, A. (2002): Rotmilan, Mäusebussard und Aaskrähe als Brutnachbarn. Apus 11: 207-208.
- RÖBLER, A. (2016): Über eine Mischbrut aus Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* in Sachsen-Anhalt. Apus 21: 79-81.
- ROHN, B. (1987): Schmarotzerraubmöwe im Harz. Apus 6: 284-285.
- ROHN, B. (1992): Rotmilan „schlägt“ Elster. Apus 8: 128-129.
- ROST, F. (2009): Das Zugverhalten europäischer Mönchsgrasmücken *Sylvia atricapilla* im Wandel – Daten aus Ostdeutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee. 19: 21-35.
- ROST, F. & H. GRIMM (2004): Kommentierte Liste der Vögel Thüringens. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 5, Sonderh.: 3-78.
- RUBACHA, S. & O. KRYSZEK (2007): Fourth record of the Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus* in Poland. Not. Ornithol. 48: 60-62.
- RÜDIGER, W. (1912): *Lanius excubitor*, Brutvogel in der Letzlinger Heide. Z. Ool. Ornithol. 22 (6): 11-12.
- RÜHLING, J.P. (1786): Verzeichnis der wilden Thiere auf dem Harze. In: GATTERER, C. W. J.: Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. T. 2., S. 248-284. Göttingen.
- RUPPE, S. & S. MATERNA (1990): Zur Brutbiologie und Ernährung des Raubwürgers (*Lanius excubitor* L.) im Kreis Sangerhausen. Beitr. Vogelkd. 36: 222-226.
- RYSLAVY, T. (2002): Weiterer Nachweis eines Rosapelikans (*Pelecanus onocrotalus*) in Brandenburg. Otis 10: 151-154.
- RYSSEL, A. (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 43-46.
- RYSSEL, A. & U. SCHWARZ (1981a): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. [Teil 1]. Merseburger Land Sonderh. 18: 1-92.
- RYSSEL, A. & U. SCHWARZ (1981b): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. [Teil 2]. Merseburger Land Sonderh. 19: 1-91.
- SCHÄFER, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Zerbster Land im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 38-43.
- SCHÄFER, B. (2007): Revierkartierung wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Feldflur bei Kusey im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 73-82.
- SCHÄFER, B., W. LIPPERT & K.-J. SEELIG (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Colbitz-Letzlinger Heide im Jahr 2004/2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 33-45.
- SCHÄFER, B. & A. PSCHORN (2011): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg im Jahr 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-52.
- SCHÄFER, B. & K.-J. SEELIG (2015): Die Vögel (*Aves*) der Colbitz-Letzlinger Heide. Entomol. Mitt. Sachs.-Anhalt 23, Sonderh.: 355-399.
- SCHALOW, H. (1919): Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin.
- SCHELPER, W. (1983): Der Rauhfußkauz in Altkreis Münden – ein Beispiel für angewandten Artenschutz. DBV-Gruppe Münden 1923-1983, Festschrift: 22-27.
- SCHERZINGER, W. (2006): Die Wiederbegründung des Habichtskauz-Vorkommens *Strix uralensis* im Böhmerwald. Ornithol. Anz. 45: 97-156.
- SCHIEMANN, H. (1972): Über Winterquartiere nordeuropäischer Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*). Vogelwarte 26: 330-336.
- SCHILDMACHER, H. (1930): Beobachtungen an ziehenden Weindrosseln im Frühjahr 1930 bei Magdeburg. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 4: 22-24.



- SCHLÜTER, W. (1910): *Anser albifrons* und *Ibis falcinellus*. Zwei seltene Gäste in Deutschland. Falco 6: 25-26.
- SCHMIDT, C. (1993): Die Unterscheidung des Spornpiepers *Anthus richardi* von unausgefärbten Brachpiepern *A. campestris*. Limicola 7: 178-190.
- SCHMIDT, F. & D. WEIS (1986): Der Brutvogelbestand des Peißnitz-Auwaldes in Halle. Apus 6: 177-182.
- SCHMIDT, J., J. SCHMIDT & T. KRÜGER (1998): Zum möglichen Vorkommen des Haselhuhnes (*Bonasia bonasia*) in der Dübener Heide. Actitis 33: 93-95.
- SCHMIDT, W. (1987): Erstbeobachtung von Vogelarten. 10. Nachtrag 1986: Rauhfußkauz (*Aegolius funereus* L. 1758). Biol. Studien Luckau 16: 83-84.
- SCHMIEDEL, J. (1968): Der Wasserpieper im Stadtkreis Halle/S. Apus 1: 247-249.
- SCHNEIDER, R. (1963a): Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) und Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) am Barleber See bei Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 8: 315-316.
- SCHNEIDER, R. (1963b): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) und Purpurreiher (*Ardea purpurea*) im Nordharzvorland. Beitr. Vogelkd. 8: 468.
- SCHNEIDER, R. (1969): Die Siedlungsdichte der Vögel einer Bruchlandschaft im nördlichen Harzvorland im Jahr 1962. Mitt. IG Avifauna DDR 2: 3-12.
- SCHNEIDER, R. (1972): Schmutzgeier (*Neophron percnopterus* (L.)) über Oschersleben (Bode). Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 7: 121.
- SCHNEIDER, R. (1981): Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) 1981 bei Oschersleben (Bezirk Magdeburg). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 5-6: 94.
- SCHNEIDER, R. (2005): Die Siedlungsdichte der Vögel in einem Auwaldrest im Großen Bruch bei Oschersleben. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 73-87.
- SCHÖNAU, O. (1967): Samtenten im Elsnigker Teichgebiet (Kreis Köthen). Apus 1: 144.
- SCHÖNBERG, R. & J. MÜLLER (1965): Zwergohreule (*Otus scops* [L.]) in der Börde. Beitr. Vogelkd. 11: 199-200.
- SCHÖNBRODT, M. & M. SCHULZE (2017): Rote Liste der Brutvögel des Landes Sachsen-Anhalt (3. Fassung, Stand November 2017 – Vorabdruck). Apus 22, Sonderheft: 3-80.
- SCHÖNBRODT, R. & T. SPRETKE (1989): Brutvogelatlas von Halle und Umgebung. Ergebnisse einer Feinrasterkartierung 1983-1986. Halle.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (1987): Ergebnisse 10-jähriger Planberingung von jungen Greifvögeln in den Kreisen Halle, Halle-Neustadt und Saalkreis. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 67-84.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (1991): Greifvogelhorstkontrollen der Jahre 1986 bis 1990 bei Halle. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 61-74.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (2000): Greifvogelhorstkontrollen von 1991 bis 1998 im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 4: 153-166.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (2006): 2005 und 2006 – zwei außergewöhnliche Jahre für Greifvögel. Apus 13: 62-65.
- SCHÖNEKERL, H. (1929): Der Stelzvogelzug im Herbst 1928 bei Magdeburg. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 3: 29-34.
- SCHÖNFELD, M. (1983): Beiträge zur Ökologie und zum interspezifischen Verhalten der Baumläufer *Certhia familiaris* und *C. brachydactyla* in Eichen-Hainbuchen-Lindenwäldern unter dem Aspekt der erhöhten Siedlungsdichte durch eingebrachte Nisthöhlen. Hercynia N.F. 20: 290-311.
- SCHÖNFELD, M. (1984): Migration, Sterblichkeit, Lebenserwartung und Geschlechtsreife mitteleuropäischer Rotmilane, *Milvus milvus* (L.), im Vergleich zum Schwarzmilan, *Milvus migrans* (Boddaert). Hercynia N.F. 21: 241-257.
- SCHÖNFELD, M. (1992): Untersuchung zur Vogelwelt eines Industriestandortes bei Wittenberg-Piesteritz. Apus 8: 120-126.
- SCHÖNFELD, M. (1995): Die Vogelwelt des Stadtfriedhofes Weißenfels/Saale in den Jahren 1973 bis 1975. Apus 9(1): 27-37.
- SCHÖNFELD, M. (1998): Zum Vorkommen, Neststand und Nestern des Neuntöters *Lanius collurio* und zum syntopen Vorkommen der Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* im Mittelbegebiet bei Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Ornithol. Mitt. 50: 221-226.
- SCHÖNFELD, M. (2002): Die Vogelwelt des Apollensberges – Landkreis Wittenberg. Apus 11: 255-260.
- SCHÖNFELD, M. (2004): Hohes Alter eines Gartenbaumläufers. Apus 12: 196-197.
- SCHÖNFELD, M. (2005a): Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VII/2): Die Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) des Mittelbegebietes/Sachsen-Anhalt (Aves, Passeriformes, Certhiidae). Zool. Abh. (Dresden) 55: 139-175.
- SCHÖNFELD, M. (2005b): Klimaerwärmung und Ankunft der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Elbtal um Wittenberg. Ornithol. Mitt. 57: 266.
- SCHÖNFELD, M. (2006a): Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VII/3): Die Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. Brehm, 1831) des Mittelbegebietes/Sachsen-Anhalt (Aves, Passeriformes, Certhiidae). Zool. Abh. (Dresden) 56: 113-150.
- SCHÖNFELD, M. (2006b): Medianwerte der Erst- und Letztfeststellungen ausgewählter Zugvögel in Vergleich von 1975 bis 2005 sowie von Zehnjahreszeiträumen für den Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. 1. Teil: Jahresvögel, Teilzieher, Überwinterer Südeuropa/Nordafrika. Ornithol. Mitt. 58: 131-140.
- SCHÖNFELD, M. (2007): Vorkommen und Verbreitung von Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C. L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820) im Mittelbegebiet, Altkreis Wittenberg, vom Südrand des Fläming bis zum Nordrand der Dübener Heide. Vertebrate Zool. 51: 83-102.
- SCHÖNFELD, M. (2010): Abriss zur wissenschaftlichen Vogelberingung im Altkreis Wittenberg. Apus 15: 51-64.
- SCHÖNFELD, M. (2014): Frühjahrsankunft und Sangesbeginn von 50 Brutvogelarten in den Jahren 1975 bis 2012 im Altkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Mitt. 66: 187-218.
- SCHÖNFELD, M. & U. ZUPPKE (2008): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg. Apus 13: 373-415.
- SCHÖNFELD, M., U. ZUPPKE & H. REHN (1997): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Apus 9: 301-344.
- SCHÖNN, S. (1980): Der Sperlingskauz. Neue Brehm-Bücherei 513. Wittenberg-Lutherstadt.

- SCHÖPWINKEL, A. (1892): Die Vogelwelt der Grafschaft Wernigerode. Schr. Naturwiss. Ver. Harzes Wernigerode 7: 1-62.
- SCHONERT, A. & B. SIMON (2014): Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle von Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensraumtypen im NATURA 2000-Gebiet Mittlere Oranienbaumer Heide - Brutvögel. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 39-48.
- SCHRÖDER, H. (1956): Purpurreiher in Sachsen-Anhalt. Falke 3: 68.
- SCHUBERT, P. (1978): Schwarzstirnwürger bei Roßlau Elbe. Apus 4: 96.
- SCHUBERT, P. (1982): Ein Baßtöpel im Kreis Roßlau. Apus 4: 279.
- SCHUBERT, P. (1985a): Eine späte Brut des Neuntöters im Kreis Zerbst. Apus 6: 44-45.
- SCHUBERT, P. (1985b): Ein Nachtrag zum Vorkommen des Kolkrahen im Fläming. Apus 6: 81-88.
- SCHUBERT, P., P. BIRKE & E. SCHWARZE (1983): Zwei neue Wassertreter-Feststellungen im mittleren Mittelelbegebiet. Apus 5: 95-96.
- VON DER SCHULENBURG, I. (1914): Von der Gebirgsbachstelze. Ornithol. Monatsschr. 39: 269-270.
- SCHULZ, F. (2008): Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*) mit auffallender Prägung auf Weißstörche (*Ciconia ciconia*) in Norddeutschland im Jahr 2001. In: KAATZ, C. & M. KAATZ, 3. Jubiläumsband Weißstorch: 432-434.
- SCHULZE, M. (2004): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 69-75.
- SCHULZE, M. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Saale-Elster-Aue südlich Halle im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 106-117.
- SCHULZE, M. (2005b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2004/05. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 126-132.
- SCHULZE, M. (2006): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2005/2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 63-72.
- SCHULZE, M. (2007): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2006/2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 109-119.
- SCHULZE, M. (2008): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2007/2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 79-90.
- SCHULZE, M. (2009): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2008/09. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 67-78.
- SCHULZE, M. (2010): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2009/10. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 73-84.
- SCHULZE, M. (2011): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2010/11. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 95-107.
- SCHULZE, M. (2012): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2011/12. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 95-106.
- SCHULZE, M. (2014a): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2012/13. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 61-74.
- SCHULZE, M. (2014b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2013/14. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 49-62.
- SCHULZE, M. (2015): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2014/15. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 55-70.
- SCHULZE, M. & F. MEYER (2004): Brutvorkommen ausgewählter Brutvogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Glücksburger Heide. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 40-46.
- SCHULZE, M. & A. PSCHORN (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Mittlere Oranienbaumer Heide im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 47-56.
- SCHULZE, M. & B. SCHÄFER (2012): Landesweite Brutbestandsaufnahme des Brachpiepers (*Anthus campestris*) in Sachsen-Anhalt im Jahr 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 47-60.
- SCHULZE, M., D. LÄMMEL & A. PSCHORN (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 53-64.
- SCHULZE, M., F. MEYER & S. FISCHER (2015): Bedeutung der von *Calluna*-Heiden dominierten Europäischen Vogelschutzgebiete Sachsen-Anhalts für den Schutz der Leitarten von Sandheiden und deren Management. Ber. Vogelsch. 52: 79-97.
- SCHULZE, M., A. RYSEL & A. PSCHORN (2007): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Buchenwälder am Stolberg im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 101-108.
- SCHULZE, W. (1957): Ein Steinadler im Harz. Falke 4: 215.
- SCHULZE, W. (1962): Küstenseeschwalbe im Binnenland. Falke 9: 247.
- SCHULZE, W. (1985): Rotkopfwürger brütet von 1975-1980 bei Sangerhausen. Apus 6: 43-44.
- SCHULTZ, H. (1990): Brut des Rotmilans auf Hochspannungsmast. Apus 7: 267.
- SCHWARZ, U. (1992): Erfolgreiche Rotmilanbrut auf Hochspannungsmast. Apus 8: 59-61.
- SCHWARZ, W. & H. TISCHER (1929): Aus der Brutperiode 1928 im Magdeburger Beobachtungsgebiet. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 3(2): 7-12.
- SCHWARZE, D. (1995): Weißkopf-Ruderente bei Roßlau. Apus 9: 59-60.
- SCHWARZE, E. (1968): Schelladler und Eisente bei Roßlau. Apus 1: 196-197.
- SCHWARZE, E. (1978): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kreis Roßlau, Bezirk Halle). 1. Teil. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 1: 43-62.
- SCHWARZE, E. (1980a): Ergebnisse der Wasservogelzählungen der Saison 1978/79 im Bezirk Halle. Apus 4: 162-166.
- SCHWARZE, E. (1980b): Einige Nachweise südlich verbreiteter Vogelarten in den Kreisen Roßlau und Dessau. Apus 4: 171-175.
- SCHWARZE, E. (1982): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1978/79 und 1980/81 im Bezirk Halle. Apus 4: 235-259.
- SCHWARZE, E. (1983): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1981/82 und 1982/83 im Bezirk Halle. Apus 5: 122-127.

- SCHWARZE, E. (1986): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kreis Roßlau, Bezirk Halle). 3. Teil: Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 23-33.
- SCHWARZE, E. (1987): Ergebnisse der Wasservogelzählung 1983/84, 1984/85 und 1985/86 im Bezirk Halle. Apus 6: 204-212.
- SCHWARZE, E. (1988): Mornellregenpfeifer an der Mittelbe. Apus 7: 36-37.
- SCHWARZE, E. (1990): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1986/87 und 1987/88 im Bezirk Halle. Apus 7: 256-260.
- SCHWARZE, E. (1995): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1988/89 bis 1992/93 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 9: 83-98.
- SCHWARZE, E. (2000a): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1993/94 bis 1997/98 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 10: 311-323.
- SCHWARZE, E. (2000b): Eine neue Feststellung des Graubruststrandläufers in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 341-343.
- SCHWARZE, E. (2008): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1998/99 bis 2002/03 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 13: 313-322.
- SCHWARZE, E. (2010): Spornpieper *Anthus richardii* erstmals in Sachsen-Anhalt. Apus 15: 72-73.
- SCHWARZE, E. & H. KOLBE (2006): Die Vogelwelt der zentralen Mittelbe-Region. Halle.
- SCHWARZE, E. & G. PUHLMANN (2012): Ergänzungen zum Vorkommen einiger Watvogelarten (Aves: Charadriiformes) im zentralen Mittelbegebiet und am Stausee Ladeburg (Landkreis Jerichower Land). Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 24: 123-128.
- SCHWARZENBERG, T. (2001): Das Auerhuhn in den Nationalparken Harz und Hochharz. Bestandsentwicklung und Verbreitung. Jahresbericht 2001. Unveröff. Gutachten i. Auftr. d. Nationalparkverw. Harz u. Hochharz.
- SCHWERDTFEGER, O. (2008): Ist der Raufußkauz *Aegolius funereus* ein echter Harzer? – Über die Bedeutung einer lokalen Population. Vogelkundl. Ber. Niedersachs. 40: 247-253.
- SEELIG, K.-J., H.-G. BENECKE, F. BRAUMANN & B. NICOLAI (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. Abh. Ber. Mus. Heineanum 3, Sonderh.: 1-243.
- SEELIG, K.-J. & P. CLAUSING (1971): Thorswassertreter im Herbst 1970 bei Magdeburg. Apus 2: 192.
- SEIFERT, E. & E. SCHWARZE (1998): Zur Bestandsentwicklung der Nachtigall bei Roßlau. Apus 10: 22-24.
- SEITZ, E. & U. VON WICHT (1980): Der Einflug von Raubmöwen ins mitteleuropäische Binnenland im Spätsommer/Herbst 1976. Ornithol. Beob. 77: 2-20.
- SELLIN, D. (1965): Sperbereule (*Surnia ulula*) in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 86: 61-62.
- SELLIN, D. (1967): Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) als Freibrüter. Beitr. Vogelkd. 12: 429-436.
- SELLIN, D. (1968a): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Coswig im Jahre 1967. Apus 1: 239-242.
- SELLIN, D. (1968b): Zur Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) in der nordwestlichen Umgebung Magdeburgs. Vogelwelt 88: 79-83.
- SELLIN, D. (1973): Avifaunistische Notizen aus der Umgebung von Coswig/Anhalt. Apus 3: 34-36.
- SELLIN, D. (1994): Notizen zum Vorkommen der Wachtel im Raum Wolfen-Zörbig. Apus 8: 265-271.
- SIANO, R. & S. KLAUS (2013): Auerhuhn *Tetrao urogallus* – Wiederansiedlungs- und Bestandsstützungsprojekte in Deutschland nach 1950 – eine Übersicht. Vogelwelt 134: 3-18.
- SIANO, R., F. BAIRLEIN, K.-M. EXO & S. A. HERZOG (2006): Überlebensdauer, Todesursachen und Raumnutzung gezüchteter Auerhühner (*Tetrao urogallus* L.), ausgewildert im Nationalpark Harz. Vogelwarte 44: 145-158.
- SIANO, R., S. A. HERZOG, K.-M. EXO & F. BAIRLEIN (2011): Nahrungswahl ausgewildelter Auerhühner (*Tetrao urogallus* L.) im Harz. Vogelwarte 49: 137-148.
- SIMON, B. (1987): Untersuchung zum Bestand der Taggreifvögel (Falconiformes) im Elbniederungsgebiet südlich der unteren Schwarzen Elster. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 85-98.
- SIMON, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Annaburger Heide in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 118-125.
- SIMON, B. & U. SIMON (1996): Schutzwürdigkeitsstudie für das auszuweisende Naturschutzgebiet „Mittlere Glücksburger Heide“. unveröff. Gutachten.
- SIMON, B. & U. SIMON (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mündungsgebiet der Schwarzen Elster im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 59-65.
- SITTLER, B., A. AEBISCHER & O. GILG (2011): Post-breeding migration of four Long-tailed Skuas (*Stercorarius longicaudus*) from North and East Greenland to West Africa. J. Ornithol. 152: 375-381.
- SLACK, R. (2009): Rare birds where and when. An analysis of status and distribution in Britain and Ireland. Vol. 1: sandgrouse to New World orioles. York.
- SNOW, D.W. & C.M. PERRINS (1998): The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Vol. 1. Oxford, New York.
- SORGE, C. (1923): *Oceanodroma leucorhoa* (Vieill.), der gabelschwänzige Schwalbensturmvogel, in Nordthüringen. Ornithol. Monatsber. 31: 16-17.
- SOMMER, G. (1957): Baßtölpel bei Merseburg. Falke 4: 105.
- SOMMER, G. (1959): Ein Flamingo in Merseburg. Merseburger Land 1959: 160-162.
- SOMMER, O. (1893): Notizen aus Bernburg. Ornithol. Monatsber. 1: 85.
- SPERLING, D. (1970): Das Vorkommen der Möwen (Laridae) im Bitterfelder Braunkohlenrevier. Hercynia N. F. 7: 273-298.
- SPERLING, E. (1933): *Podiceps n. nigricollis* bei Schollene als Brutvogel verschwunden? Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 7: 17-19.
- SPERLING, E. (1934): *Motacilla c. cinerea* auf dem Zug in Magdeburg. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 8: 31.
- SPERLING, E. (1935): Die Vogelfauna des Schollener Sees. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 9: 11-16.
- SPRETKE, T. (1982a): Avifaunistischer Jahresbericht 1977 für den Bezirk Halle. Apus 5: 1-13.
- SPRETKE, T. (1982b): Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle. Apus 5: 13-25.
- SPRETKE, T. (1986): Avifaunistischer Jahresbericht 1981 für den Bezirk Halle. Apus 6: 98-110.

- SPRETKE, T. (1987): Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle. Apus 6: 193-204.
- STAAR, A., G. DORNBUSCH, S. FISCHER & A. HOCHBAUM (2015): Entwicklung und Bestand von Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst/Untersuchungsgebiet Steckby von 1991 bis 2015. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 43-53.
- STACHOWIAK, G. (1959): Der Rote Milan und seine Siedlungsdichte im Hohen Holz. Abschlussarb., Forstfachsch. Schwarzburg (unveröff.).
- STAHL, E. (1996): Die Rote Liste der Brutvögel der Stadt Dessau und der unmittelbaren Umgebung. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 9: 119-133.
- STARKE, W., A. STIEFEL & R. STIEFEL (1974): Erneute Brutnachweise des Rotkopfwürgers im Gebiet des Süßen Sees. Apus 3: 115-117.
- STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. Dresden.
- STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (1998): Die Vogelwelt Sachsens. Jena.
- STEIN, H. (1968): Siedlungsdichteuntersuchung in einem Auwald bei Magdeburg. Mitt. IG Avifauna DDR 1: 29-39.
- STEIN, H. (1969): Der Barleber See bei Magdeburg – ein Rast- und Überwinterungsgewässer für Wasservogel. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 4: 25-54.
- STEIN, H. (1972): Über Ankunft und Legebeginn des Neuntötters in den Bezirken Magdeburg und Halle. Apus 2: 266-272.
- STEIN, H. (1973): Der Vogelbestand eines Torfstiches in der Niederung der Unterhavel. Mitt. IG Avifauna DDR 6: 53-58.
- STEIN, H. (1974): Ein Beitrag zur Brutbiologie von Singdrossel, *Turdus philomelos*, Amsel, *Turdus merula*, und Mönchsgasmücke, *Sylvia atricapilla*, mit besonderer Berücksichtigung der Brutverluste. Beitr. Vogelkd. 20: 467-477.
- STEIN, H. (2000): Populationsökologie und Phänologie von Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* und Dorngrasmücke *Sylvia communis* im nördlichen Sachsen-Anhalt nach Beringungsergebnissen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 93-128.
- STEIN, H. (2008): Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers *Phylloscopus proregulus* in Sachsen-Anhalt. Apus 13: 348-349.
- STEIN, H. (2013): Zur Phänologie von Nachtigall *Luscinia megarhynchos* und Heckenbraunelle *Prunella modularis* im Raum Magdeburg nach Beringungsergebnissen. Apus 18: 99-113.
- STEIN, H. & P. GOTTSCHALK (2004): Die Dorngrasmücke *Sylvia communis* als Hiddensee-Ringvogel – Ergebnisse 25-jähriger Beringungsarbeit in Ostdeutschland. Apus 12, Sonderh.: 52-75.
- STEINKE, G. (1971): Schmarotzerraubmöwen in der Elbaue bei Tangermünde. Apus 2: 196.
- STEINKE, G. (1999): Die Vögel der Altmark. Stendal.
- STEINKE, G. & K. HEINDORFF (1982): Die Vögel des Kreises Tangerhütte. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 7: 1-105.
- STEOF, K. (2011): Handlungserfordernisse im Umgang mit nichtheimischen und mit invasiven Vogelarten in Deutschland. Ber. Vogelsch. 47/48: 93-118.
- STIŠOV, M. S., V. I. PRIDATKO & V. V. BARANJUK (1991): Pticy ostrova Vrangolja. Novosibirsk.
- STRESEMANN, E. (1953): Zur Vogelwelt des Harzes. Beitr. Naturkd. Niedersachs. 6: 80-81.
- STRESEMANN, E. (1954): Zur Avifauna der Mark Brandenburg. J. Ornithol. 95: 178-181.
- STRESEMANN, E. & P. THOMSEN (1954): J.F. Naumanns Briefwechsel mit H. Lichtenstein. Kopenhagen.
- STUBBE, C. (1961): Die Besiedlungsdichte eines abgeschlossenen Waldgebietes (Hakel) mit Greifvögeln im Jahre 1957. Beitr. Vogelkd. 7: 155-224.
- STUBBE, H. (1987): Buch der Hege. Federwild. 2. Aufl. Berlin.
- STUBBE, M. (1982): Brutdichte und Altersstruktur einer Rotmilan-Population – *Milvus milvus* (L., 1758) – im nördlichen Harzvorland der DDR im Vergleich zum Mäusebussard *Buteo buteo* (L., 1758). Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 22: 205-214.
- STUBBE, M. (1987): Die Erforschung der Greifvogel- und Eulenarten in der DDR – Stand und Perspektive. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 9-26.
- STUBBE, M. (1991): Der Hakel als bedeutendes Vogelschutzgebiet in Europa. Ber. Dt. Sekt. Internat. Rates Vogelsch. 30: 93-105.
- STUBBE, M. & A. STUBBE (2000): Zwergohreulen (*Otus scops*) im Hakelgebiet/Sachsen-Anhalt. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten; Bd. 4: 522.
- STUBBE, M. & K. UHLENHAUT (1977): Habichtsadler in der DDR. Falke 24: 192-197.
- STUBBE, M., M. WEBER, T. HOFMANN & S. HERRMANN (1996): Der Zwergadler *Hieraaetus pennatus* als neuer Brutvogel in Deutschland. Limicola 10: 171-177.
- STUBBE, M., H. ZÖRNER, H. MATTHES & W. BÖHM (1991): Reproduktionsrate und gegenwärtiges Nahrungsspektrum einiger Greifvogelarten im Nördlichen Harzvorland. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 39-60.
- STÜBING, S., J. WAHL, T. SACHER (2013): Erfolgreiche Suche im Herbst 2013: Rastende Mornellregenpfeifer. Falke 60: 498-499.
- SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, W. FREDERKING, K. GEDEON, B. GERLACH, C. GRÜNEBERG, J. KARTHÄUSER, T. LANGGEMACH, B. SCHUSTER, S. TRAUTMANN & J. WAHL (2013): Vögel in Deutschland – 2013. Münster.
- TASCHENBERG, O. (1909): Die Tierwelt. In: ULE, W., Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises. Halle.
- TASCHENBERG, O. (1893): Die Avifauna in der Umgebung von Halle I. Ornithol. Monatsschr. 18: 133-142.
- TAUCHNITZ, H. (1966): Schwarzstirnwürger bei Halle/S. Apus 1: 54.
- TAUCHNITZ, H. (1968): Zur Brutbiologie und Brutdichte des Rotrückenwürgers in einem Auegebiet bei Halle. Apus 1: 229-233.
- TAUCHNITZ, H. (1970): Die Sperbergrasmücke – *Sylvia nisoria* (Bechst.) – im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. Apus 2: 32-38.
- TAUCHNITZ, H. (1972): Purpurreiher und Nachtreiher bei Halle. Apus 2: 275-276.
- TAUCHNITZ, H. (1975): Beobachtung einer Maskenstelze bei Halle. Apus 3: 287-289.
- TAUCHNITZ, H. (1977): Beobachtungen an einem Schlafplatz des Bergpiepers bei Halle. Apus 4: 9-14.
- TAUCHNITZ, H. (1981): Die Vögel der Saale-Elster-Aue im Südteil des Stadtkreises Halle. Apus 4: 193-240.
- TAUCHNITZ, H. (1982): Mornellregenpfeifer am Helmestausee. Apus 4: 282.

- TAUCHNITZ, H. (2005): Greifvögel in der Saale-Elster-Aue südlich Halle (Saale). Brutbestand, Bruterfolg und Brutgröße von Rotmilan, Schwarzmilan und Mäusebussard zwischen 1976 und 2003. *Apus* 12: 303-313.
- TEICHMANN, A. (1975): Adlerbussard (*Buteo rufinus* Cretzschm.) bei Halle. *Beitr. Vogelkd.* 21: 496-497.
- TEICHMANN, A. (1986): Eiderente rastet in der Feldflur. *Apus* 6: 141-142.
- TEICHMANN, A. (1987): Seeregenpfeifer im Binnenland. *Apus* 6: 222-225.
- TEICHMANN, A. & R. TSCHÄPE (1992): Ändert sich die Phänologie des Eiderenten-Zuges im Binnenland? *Apus* 8: 54-58.
- TEICHMANN, A. & D. WEIS (1986): Sommerfeststellungen von Eiderenten im Raum Halle-Merseburg. *Apus* 6: 129-130.
- TEIDOFF, E. (1956): Das Haselhuhn – ein in Deutschland aussterbendes Waldhuhn. *Falke* 3: 124-126.
- THIELE, A. (1857): Auszüge aus meinem Tagebuch. *Naumannia* 7(2): 43-52.
- THIELCKE, G. (1972): Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*) ahmen artfremdes Signal nach und reagieren darauf. *J. Ornithol.* 113: 287-296.
- THIENEMANN, G. A. (1852): Einige Bemerkungen über Albino's in der ornithologischen Welt. *Naumannia* 2(2): 40-42.
- THIENEMANN, J. A. (1899): *Lanius excubitor major*. *Ornithol. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt* 24: 354-355.
- THIOLLAY, J.-M. & V. BRETAGNOLLE (2004): *Rapaces nicheurs de France*. Paris.
- TISCHER, H. (1928): Ornithologisch Interessantes für Magdeburg und Umgebung aus den Jahren 1822-1850 (Fortsetzung und Schluss). *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 2(1): 1-9.
- TODTE, I. (1983): Ungewöhnlich hoher Neststandort des Rotrückenwürgers. *Apus* 5: 99.
- TODTE, I. (1986a): Polygynie beim Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochruros*. *Beitr. Vogelkd.* 32: 341-342.
- TODTE, I. (1986b): Sommernachweis der Eiderente im Kreis Havelberg. *Apus* 6: 184-185.
- TODTE, I. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg im Jahr 2004. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh.* 1: 94-99.
- TODTE, I. (2014): Ornithologische Ereignisse nach der Überflutung des Elbe-Saale-Winkels und deren Umgebung der Stadt Aken im Jahr 2013. *Apus* 19: 3-17.
- TODTE, I. & K.-H. BOUDA (1996): Beobachtungen an der ersten Brut des Purpurreiher *Ardea purpurea* in Sachsen-Anhalt. *Limicola* 10: 192-196.
- TODTE, I. & B. NICOLAI (2001): Aktueller Nachweis der Wanderdrossel *Turdus migratorius* für Deutschland. *Limicola* 15: 157-162.
- TÖPFER, T. (2008): Nachweise seltener Vogeltaxa (Aves) in Sachsen aus der ornithologischen Sammlung des Museums für Tierkunde Dresden. *Faun. Abh. (Dresden)* 26: 63-101.
- TOLKMITT, D., D. BECKER, M. HELLMANN, E. GÜNTHER, F. WEIHE, H. ZANG & B. NICOLAI (2012): Einfluss des Waschbären *Procyon lotor* auf Siedlungsdichte und Bruterfolg von Vogelarten – Fallbeispiele aus dem Harz und seinem nördlichen Vorland. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 30: 17-46.
- TORKLER, A. & H. LANGBEHN (2009): Der Sperlingskauz (*Glauucidium passerinum*) im Landkreis Lüneburg – von der heimlichen „Geistereule“ zum verbreiteten Brutvogel. *Beitr. Avif. Landkr. Lüneburg* 2001-2007. Bd. 6: 169-175.
- TRAUE, H. (1970): Zur Ernährung des Rotmilan (*Milvus milvus* L.) während der Brut- und Fütterungsperiode im Verlaufe der Jahre 1962 bis 1967. *Natursch. naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg* 7: 38-57.
- TRAUE, H. (1978): Zur Brutperiode einer Greifvogelpopulation im Mansfeld-Harzgeroder Bergland im Verlauf der Jahre von 1962 bis 1967. *Falke* 25: 6-11, 50-54.
- TRAUE, H. & K. WÜTTKY (1966): Die Entwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus* L.) vom Ei bis zum flüggen Vogel. *Beitr. Vogelkd.* 11: 253-275.
- TRAUTMANN, S., J. SCHWARZ & S. FISCHER (2012): Das Monitoring häufiger Brutvögel in Sachsen-Anhalt – Zwischenergebnisse nach acht Jahren Laufzeit (2003 bis 2010). *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H.* 1: 71-84.
- TREEB, J. (2000): Flamingos presumably escaped from captivity find suitable habitat in Western Europe. *Waterbirds* 23: 32-37.
- TREEB, J. (2011): Flamingo's in het Zwillbrocker Venn. *Beilen*.
- TUCHSCHERER, K. (1966): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Gohrau/Wörlitzer Winkel 1966 [I]. *Apus* 1: 74-80.
- TUCHSCHERER, K. (1968): Beiträge zur Vogelwelt des Wörlitzer Winkels II. *Apus* 1: 243-245.
- TUCHSCHERER, K. (1971): Beiträge zur Vogelwelt des Wörlitzer Winkels IV. Besondere Beobachtungen 1969/70 (Nachträge 1968). *Apus* 2: 186-189.
- UHLENHAUT, K. (1998a): Zur Räumung der von Nathusius'schen Vogelsammlung aus dem Schloß Hundisburg Ende November 1945. *Haldensleber Vogelkd.-Inform.* 16: 77-79.
- UHLENHAUT, K. (1998b): Seidenreiherr an der Mittelbe. *Apus* 10: 87.
- ULRICH, A. (1970): Avifaunistische Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Colbitzer Lindenwald“. *Mitt. IG Avifauna DDR* 3: 27-50.
- ULRICH, A. (1984): Beobachtungen zum Durchzug und Geschlechtsverhältnis von Wasservögeln am Jersleber See. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 8-9: 3-16.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1986): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil I. *Wolmirstedter Beitr.* 11: 3-63.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1988): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil II. *Wolmirstedter Beitr.* 13: 3-75.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1989): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil III. *Wolmirstedter Beitr.* 14: 3-66.
- VON VELTHEIM, H. H. (1924): Ein Uralkauz in Mitteldeutschland. *Mitt. Vogelwelt* 23: 89.
- VIEWEG, A. (1979): Der Waldkauz – eine Gefahr für den Rauhfußkauz. *Falke* 26: 392-393.
- VIKSNE, J. A. & H. A. MIHELSONS (1985): Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. *Moskau*.
- VOERKEL, S. H. (1926): Beitrag zur Avifauna des Torgau-Annaburg-Jessener Gebietes. *Ornithol. Monatsschr.* 51: 25-40.
- VOIGT, W. (1908): Altes und Neues vom Harz. *Ornithol. Monatsschr.* 33: 38-39.

- VOIGT, H. (1960): Flamingo bei Magdeburg gefangen. Mittbl. BFA Ornithol. Vogelsch. Magdeburg 1: 31.
- VOOUS, K.H. (1962) Die Vogelwelt Europas und ihre Verbreitung. Hamburg, Berlin.
- VOSKAMP, P., S. VOLPONI & S. VAN RIJN (2005): Global population development of the Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmeus*. Overview of available data and proposal to set up a network of national specialists. Cormorant Research Gr. Bull. 6: 21-35.
- WADEWITZ, M. (1995): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben – Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 1: Nonpasseriformes. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 13: 53-100.
- WADEWITZ, M. (1996): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben – Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 2: Passeriformes. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 11-47.
- WADEWITZ, M. (2001): Die Vögel im Kerbtal der Bode bei Thale im Harz 1997-1999: Vorkommen und Dichte im Jahresverlauf. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 95-130.
- WADEWITZ, M. (2004): Entwicklung von Vogelbeständen auf den Friedhöfen in der gehölzarmen Ackerlandschaft der Börde 1996 bis 2004. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 22: 59-81.
- WADEWITZ, M. (2008): Bestand von Wasseramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 26: 117-129.
- WADEWITZ, M. (2009): Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 27: 61-78.
- WADEWITZ, M. (2010): Bestandsentwicklung und Vertikalvorkommen häufiger Brutvogelarten in den Hochlagen des Harzes: Untersuchungen von 1982 bis 2010 am Hohnekopf. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 28: 37-63.
- WADEWITZ, M. (2012a): Brutvögel auf einem Trockenrasen am Huy 1995-2012: Auf und Ab mit Büschen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 63-80.
- WADEWITZ, M. (2012b): Abhängigkeit des Legebeginns vom Vertikalvorkommen bei der Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 107-118.
- WADEWITZ, M. (2015): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben - Bestandsentwicklung 1979 bis 2015 nach Individuenzahlen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 33: 97-135.
- WAGNER, M. & M. JENTZSCH (2000): Zur Verbreitung, Populationsdynamik und Nahrungsökologie des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus* L.) im Südharz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 51-70.
- WAGNER, M. & J. SCHEUER (2003): Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmeestausee. Bürgel.
- WAHN, R. (1930): Der Schwarzhalstaucher Brutvogel der Michelschen Teiche. Beitr. Avifauna Anhalts 1(4): 14.
- WAHN, R. (1937): Gedanken und Beobachtungen über den Frühjahrszug 1937. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 1-7.
- WAHN, R. (1939): Bestandsschwankungen vieler Vogelarten. Beitr. Avifauna Mitteldt. 3(1-2): 33-35.
- WAHN, R. (1950): Beobachtungen und Gedanken am Nest der Mönchsgrasmücke. Vogelwelt 71: 33-39.
- WAHN, R. (1951): Bestandsschwankungen unserer Vogelwelt in letzten drei Jahrzehnten. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 9-23.
- WALLACE, D. & W. BOURNE (1981): Seabird movements along the east coast of England. Brit. Birds 74: 417-426.
- WALTHER, H. (1972): Erster Nachweis einer Brut des Wasserpiepers [*Anthus s. spinoletta* (L.)] im Harz. Beitr. Vogelkd. 18: 455-456.
- VON WANGELIN, G. J. (1897): Zwergtrappen. Ornithol. Monatschr. 22: 363-364.
- WATSON, J. (2010): The Golden Eagle. 2. Aufl., London.
- WEBER, B. (1950): Rotkehlchen-Flavino und Mönchsgrasmücken-Albino. Ornithol. Mitt. 2: 199.
- WEBER, B. (1957): Rotkopfwürger, *Lanius senator*, Brutvogel im Drömling (Altmark). Beitr. Vogelkd. 5: 235-237.
- WEBER, B. (1965): Milane als Nahrungsschmarotzer im Stadtgebiet. Falke 12: 317-318.
- WEBER, B. (1976): Bemerkenswerte Vogelfunde im Kreis Haldensleben von 1957 bis 1973. Beitr. Vogelkd. 22: 83-100.
- WEBER, B. (1993): Wilhelm Riesel (1871-1951) aus Haldensleben – Erfahrungen und Erinnerungen eines alten Vogelfreundes. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 11: 49-69.
- WEBER, M. (2002): Untersuchungen zu Greifvogelbestand, Habitatstruktur und Habitatveränderungen in ausgewählten Gebieten von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Jber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 3. Ergebnisbd.: 1-114.
- WEBER, M., W. FIEBER & M. STUBBE (1998): Persistente chlororganische Verbindungen, Quecksilber und radioaktive Nuklide in Eiern von Rotmilanen (*Milvus milvus*) aus Sachsen-Anhalt. J. Ornithol. 139: 141-147.
- WEBER, M., L. KRATZSCH & M. STUBBE (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Hakel im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 49-57.
- WEBER, M., L. KRATZSCH, M. STUBBE, H. ZÖRNER, W. LÜTJENS, H. DOMKE & A. STUBBE (2009): Bestandssituation und Reproduktion ausgewählter Greifvogelarten in verschiedenen Gebieten des Nordharzvorlandes (Sachsen-Anhalt). Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 6: 167-179.
- WEBER, M. & M. STUBBE (1995): Biometrische Untersuchungen zu Eierschalenveränderungen bei Rotmilan (*Milvus milvus*), Schwarzmilan (*Milvus migrans*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) nach 1950. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 133-139.
- WEBER, M. & M. STUBBE (2000): Nahrungsangebot und Nahrungswahl von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im nordöstlichen Harzvorland. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 4: 203-222.
- WEGENER, U. (1968): Die Siedlungsdichte von Greifvögeln in einem Waldgebiet (Huy) des Nordharz-Vorlandes. Falke 15: 328-335.
- WEGST, C. (2008): Der Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*, eine neue Art für Deutschland. Limicola 22: 161-175.
- WEICHELT, O. (1937): Purpurreiher, *Ardea p. purpurea* L., bei Klieken/Anhalt. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1 (1): 16.
- WEIßGERBER, R. (1986): Siedlungsdichteuntersuchung im Zeitzer Tiergartengehölz. Apus 6: 127-129.
- WEIßGERBER, R. (1987a): Bruten der Gebirgsstelze im Südzipfel des Bezirkes Halle. Apus 6: 269-273.

- WEIßGERBER, R. (1990a): Zum Stromtod von Vögeln. Apus 7: 262-263.
- WEIßGERBER, R. (1990b): Zum Legebeginn der Gebirgsstelze. Apus 7: 274.
- WEIßGERBER, R. (1992): Brutvogelbestand in rekultivierten Tagebaurestlöchern. Apus 8: 23-29.
- WEIßGERBER, R. (1995): Zum Vorkommen des Rotmilans im Zeitzer Gebiet. Apus 9: 69-74.
- WEIßGERBER, R. (1996): Brutverbreitung und Habitat des Neuntöters im Süden des Burgenlandkreises. Apus 9: 180-183.
- WEIßGERBER, R. (1999): Rothals- und Schwarzhalstaucher Brutvögel im südlichen Burgenland-Kreis. Apus 10: 196-198.
- WEIßGERBER, R. (2002): Zum Vorkommen einiger Brutvogelarten in der Aue der Weißen Elster nordöstlich von Zeitz. Apus 11: 187-195.
- WEIßGERBER, R. (2007): Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes. Apus 13, Sonderh.: 1-191.
- WEIßGERBER, R. (2011): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in der Aue der Weißen Elster bei Zeitz. Apus 16: 41-46.
- WEIßGERBER, R. (2014): Ein Vergleich phänologischer Daten zum Heimzug der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Raum Zeitz und bei Magdeburg. Apus 19: 26-30.
- WEIßGERBER, R. & H. GEHLHAAR (1999): Häufigkeitsverteilung von *Sylvia communis*, *S. curruca*, *S. borin* und *S. atricapilla* während der Zugzeiten in der Zeitzer Tagebaufolgelandschaft. Mauritiana 17: 325-332.
- WEIßGERBER, R. & K. KRESSE (2002): Die Brutvogelfauna kleiner Bachtäler im Grenzbereich von Zeitzer Hügelland und Leipziger Tieflandsbucht. Apus 11: 235-246.
- WEIßGERBER, R. & G. SMYK (2002): Die Ornithozönose eines Sanddornbestandes bei Lucka im Landkreis Altenburger Land (Ostthüringen). Mauritiana 18: 251-261.
- WELK, D. & F. BRAUMANN (2003): Avifaunistischer Jahresbericht 2001 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 21: 35-59.
- WENZEL, K. (1895): Ornithologisches aus der Umgebung von Halle. I.-III. Ornithol. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 20: 150-155, 198-203, 218-222.
- WENZEL, K. (1901): Beobachtungen über den Kuckuck bei Halle nebst einigen Bemerkungen zur Naturgeschichte des Kuckucks. Z. Ool. 11: 55-60.
- WENZEL, K. (1908): Zur Naturgeschichte des Kuckucks und seiner Brutpfleger. Ornithol. Monatsschr. 33: 462-475.
- WENZEL, K. (1914): Neues zur Fortpflanzungsgeschichte des Kuckucks. Ornithol. Monatsschr. 39: 457-464.
- WERNER, J. (1961): Eissturmvogel, *Fulmarus glacialis*, im Harz. J. Ornithol. 102: 96.
- WESTPHAL, J. (1979): Rotkopfwürger-Paar 1977 bei Schraplau. Apus 4: 143.
- WEX, H. (1938): Sperbergrasmücke bei Biederitz. Beitr. Avifauna Mitteldt. 2(2): 46.
- WHITE, S. & C. KEHOE (2015): Report on scarce migrant Birds in Britain in 2011-12: Part I: Non-passerines. Brit. Birds 108: 126-157.
- WIESNER, J. (1997): Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. Naturschutzreport 13: 82-98.
- WIESNER, J., H. ZANG & H. HECKENROTH (1992): Brut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Harz. Acta ornithocol. 2: 327-329.
- WIKLUND, C. G., A. ANGERBJORN, E. ISAKSON, N. KJELLEN & M. TANNERFELDT (1999): Lemming predators on the Siberian tundra. Ambio 28: 281-286.
- WILEY, R. H. & D. S. LEE (2000): Pomarine Jaeger (*Stercorarius pomarinus*). In: POOLE, A. & F. GILL (ed.). The Birds of North America, Philadelphia.
- WINKLER, P. (1955): Zum Vorkommen des Schwarzstirnwürgers, *Lanius minor*, in Mitteldeutschland. Beitr. Vogelkd. 4: 171.
- WITSACK, W. (1968b): Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarellii* Gould) an den Runstedter Klärteichen nördlich Halberstadt. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 109.
- WITSACK, W. (1969a): Die Siedlungsdichte der Vögel zweier Grünlandtypen im Nordharz und im Nordharzvorland. Mitt. IG Avifauna DDR 2: 13-20.
- WÜRL, R. (2009): Ein Rosapelikan auf Reisen. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 132-133.
- WÜST, W. (1981): Avifauna Bavariae – Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. München.
- WUTTKY, K. (1963): Beutetier-Funde in Greifvogelhorsten des Hakei. Ein Beitrag zur Ernährungsbiologie und zum Greifvogelschutz. Beitr. Vogelkd. 9: 140-171.
- WUTTKY, K. (1964): Schnee-Eule, *Nyctea scandiaca* L., in Mitteldeutschland. Beitr. Vogelkd. 9: 382.
- WUTTKY, K. (1967): Blitzschlag als Todesursache beim Rotmilan (*Milvus milvus* L.). Beitr. Vogelkd. 12: 370.
- WUTTKY, K. (1968): Ergebnisse 10jähriger Beobachtungen an der Greifvogelpopulation des Wildforschungsgebietes Hakei (Kr. Aschersleben). Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 104: 159-173.
- ZANG, H. (1981): Zum Status des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*) im Harz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124: 279-289.
- ZANG, H. & H. HECKENROTH (1986): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.7.
- ZANG, H. & H. HECKENROTH (2001): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.8.
- ZANG, H., G. GROSSKOPF & H. HECKENROTH (1995): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.5.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & F. KNOLLE (1989): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.3.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & P. SÜDBECK (2005): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.9.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & P. SÜDBECK (2009): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.11.
- ZAPPE, K. (1975): Erster Brutnachweis für den Raubwürger im Kreis Bernburg. Apus 3: 289.
- ZIEMER, E. (1885): Notizen aus Halle. J. Ornithol. 33: 225-337.
- ZINK, G. (1975): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 3. Möggingen.
- ZINK, G. (1981): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 3. Radolfzell.
- ZINK, G. & F. BAIRLEIN (1995): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 5. Wiesbaden.
- ZÖRNER, G.-J. (1992): Der Brutvogelbestand einer Kontrollfläche in der Purnitzau (Altmark). Apus 8: 30-31.

- ZÖRNER, G.-J. (1993): Brutvogelerfassung in verschiedenen Wald- und Forstflächen der Altmark. Apus 8: 201-220.
- ZSCHERNITZ, E. (1967): Purpurreiher-Beobachtung im Edderitzer Teichgebiet. Apus 1: 137.
- ZUPPKE, U. (1975): Zwergmaus als Raubwürgerbeute. Falke 22: 175.
- ZUPPKE, U. (1976): Raubwürger im Kreis Wittenberg. Falke 23: 426-429.
- ZUPPKE, U. (2002): Rauhfußkauz im Fläming bei Wittenberg. Apus 11: 276-277.
- ZUPPKE, U. (2009): Die Vogelwelt der Region Lutherstadt Wittenberg. Norderstedt.