

- ABBO (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf.
- ACHTERBERG, H. & R. BRENNECKE (1986): Erstnacheis eines Thorshühnchens, *Phalaropus fulicarius* (L.), im Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 27: 82-83.
- AKNB (2019): Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen 2012-2017 – 5. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKNB). Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 47: 1-82.
- ALEX, U. & J. FLESCNER (1994): Zur Bedeutung von Zwergstrauchheiden und Sandoffenlandschaften für die Vogelwelt, dargestellt am Beispiel des Truppenübungsplatz Altengrabow. Natursch. Landschaftspf. Brandenb. 3(3): 23-26.
- ALTUM, B. (1870): Inventarium der zoologischen Sammlung II. Vögel. Neustadt/Eberswalde.
- ALTUM, B. (1880): Forstzoologie. II. Vögel. 2. Aufl. Berlin.
- ALTUM, B. (1887): Führer durch die Zoologischen Sammlungen der Königlichen Forstakademie Eberswalde. Eberswalde.
- AMAR, A., C.M. HEWSON, R.M. THEWLIS, K.W. SMITH, R.J. FULLER, J.A. LINDSELL, G. CONWAY, S. BUTLER & M.A. MACDONALD (2006): What's happening to our woodland birds? Long-term changes in the populations of woodland birds. RSPB Research Report no. 19. BTO Research Report no. 169. Sandy.
- Anonymus (1952): Weitere Stadtbruten des Eichelhäfers. Mitt. Thür. Ornithol. 3: 11.
- Anonymus (1853): Abschätzungswerk für die Oberförsterei Ziegelroda aus dem Jahr 1853. Weimar.
- AUGST, U. (1997): Der Würgfalke (*Falco cherrug*) – ein neuer Brutvogel Sachsens. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 8: 111-113.
- AUGST, U. (1998): Die Ansiedlung des Würgfalken *Falco cherrug* als Brutvogel in Deutschland. Limicola 12: 297-313.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1880): IV. Jahresbericht (1879 des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 28: 355-407.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1883): 6. Jahresbericht (1881) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 31: 13-76.
- AUSSCHUSS FÜR BEOBACHTUNGSSTATIONEN DER VÖGEL DEUTSCHLANDS (1887): 10. Jahresbericht (1885) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. J. Ornithol. 35: 337-615.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2004): Erster Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 12: 238-241.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2005): Zweiter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 12: 283-287.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2006): Dritter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalts (AK ST). Apus 13: 34-37.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2008): Vierter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 13: 427-437.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2011): Fünfter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 16: 64-80.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2012): Sechster Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 17: 86-98.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2014): Siebenter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 19: 75-94.
- AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION SACHSEN-ANHALT (AK ST) (2015): Achter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST). Apus 20: 65-75.
- BACH, W. (1962): Ein Rotkehlpieper bei Magdeburg. Falke 9: 212.
- BÄR, E. (1958): Ein Baßtöpel-Fund im Kreise Köthen. Falke 5: 33.
- BÄSECKE, K. (1938): Beobachtungen am Waldbaumläufer. Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel 14: 31-32.
- BAIRLEIN, F., J. DIERSCHKE, V. DIERSCHKE, V. SALEWSKI, O. GEITER, K. HÜPPOR, U. KÖPPEN & W. FIEDLER (2014): Atlas des Vogelzuges. Ringfunde deutscher Brut- und Gastvögel. Wiebelsheim.
- BALDAMUS, A. (1852a): Verzeichnis der Brutvögel der Umgegend von Diebzig. Naumannia 2(3): 55-58.
- BALDAMUS, E. (1852b): Notizen. Naumannia 2(3): 104.
- BALDAMUS, E. (1855): Protokoll der neunten Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Naumannia 5: 226-246.
- BALDAMUS, E. (1870): Eine Brutstelle von *Branta rufina* in Mitteldeutschland. J. Ornithol. 18: 278-281.
- BALSCHUN, D. (1988): Beobachtung eines Sichlers im Gebiet der Mansfelder Seen. Apus 7: 35-36.
- BANNASCH, F. (1968): Eisenten (*Clangula hyemalis* [L.]) bei Magdeburg. Beitr. Vogelkdl. 14: 175.
- BARFKNECHT, R., B. GIESSING & J.-D. LUDWIGS (2007): Aktionsraum und Habitatnutzung der Wachtel *Coturnix coturnix* in einer Agrarlandschaft im Nördlichen Harzvorland. Vogelwarte 45: 268.
- BARRAQUAND, F., T.T. HOYE, J.A. HENDEN, N.G. YOCCOZ, O. GILG, N.M. SCHMIDT, B. SITTNER & R.A. IMS (2014): Demographic responses of a site-faithful and territorial predator to its fluctuating prey: long-tailed skuas and arctic lemmings. J. Animal Ecol. 83: 375-387.
- BARTHEL, P.H. & T. KRÜGER (2018): Artenliste der Vögel Deutschlands. Vogelwarte 56: 171-203.
- BAUER, H.-G. & F. WOOG (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland – Teil I: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46: 157-194.
- BAUER, H.-G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Wiebelsheim.
- BAUER, H.-G., O. GEITER, S. HOMMA & F. WOOG (2016): Vogelneozoen in Deutschland – Revision der nationalen Statureinstufungen. Vogelwarte 54: 165-179.

- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1987): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1. 2. Aufl., Wiesbaden.
- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1990): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2. 2. Aufl., Wiesbaden.
- BAUER, K. M. & U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM (1992): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 3. 2. Aufl., Wiesbaden.
- BAUMGARTEN, E. & W. BACH (1957): Eiderenten und Zwergmöwen bei Magdeburg. Falke 4: 70.
- BEHN, E. (1993): Sichtung einer Schmarotzer-Raubmöwe, *Stercorarius parasiticus*, am Arendsee (Sachsen-Anhalt). Falke 40: 270.
- BEHRENDT, G. (1983): Zum Wasservogeldurchzug auf dem Tagebausee Edderitz. Apus 5: 66-75.
- BEHRENDT, G. (1998): Der Nachtigallenbestand 1991 und 1995 im Südwesten des Kreises Köthen. Apus 10: 96-98.
- BEHRENDT, G. (1999a): Der Vogelbestand von Feldstraßen und Feldwegen 1995 im Kreis Köthen. Apus 10: 190-193.
- BEHRENDT, G. (1999b): Die Brutvögel einer Bergbauhalde im Kreis Köthen in den Jahren 1982 und 1993. Apus 10: 193-196.
- BEICHE, S. (1967): Die Vogelbesiedlung eines chemischen Werkes in Osternienburg. Apus 1: 126-135.
- BEICHE, S. (1985): Die Schuß- und Fangliste des Försters Carl Andreas Naumann. Versuch einer faunistischen Interpretation. Monogr. Naumann-Mus. 2: 1-121.
- BEICHE, S. (2002): Die Avifauna der Goitzsche. Vögel in der Bergbaufolgelandschaft. Bitterfeld.
- BEICHE, S. & J. LUGE (1974): Zwergammern im Kreis Köthen. Apus 3: 134-135.
- BEICHE, S. & J. LUGE (2006): Habitatauswahl und Reproduktion einer Neuntöter-Population im Nordteil des Köthener Gebietes. Apus 13: 102-123.
- BELLEBAUM, J., C. BOCK, S. GARTHE, J. KUBE, M. SCHILZ & N. SONNTAG (2010): Vorkommen des Gelbschnabeltauchers *Gavia adamsii* in der deutschen Ostsee. Vogelwelt 131: 179-184.
- BENECKE, H.-G. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Milde-Niederung/Altmark im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-72.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2009): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2008. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 78-98.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2010): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2009. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 28: 101-120.
- BENECKE, H.-G., R. HORT & R. WÜRL (2011): Das Seelschenbruch, Situationsbericht zur Vogelwelt im Jahr 2010. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 29: 55-69.
- BERG, W. (1966): Zum Vorkommen von Möwen an den Mansfelder Seen. Apus 1: 24-33.
- VAN DEN BERG, A. B. & M. HAAS (2014): WP reports. Dutch Birding 36: 122-130.
- BERGMANN, H.-H., S. KLAUS, F. MÜLLER, W. SCHERZINGER, J. E. SWENSON & J. WIESNER (1996): Die Haselhühner. Neue Brehm-Bücherei 77. 4. Aufl., Magdeburg.
- BERGMANN, H.-H. & K. NIKLASCH (1995): Das Haselhuhnprojekt im Harz – Methoden, Ergebnisse und Probleme der Wiederansiedlung. Naturschutzreport 10: 282-295.
- BERNDT, R. (1936): Massenaufreten des Bergfinken, *Fringilla montifringilla* L. in Deutschland. Vogelzug 7: 80.
- BERNDT, R. (1937a): Die Dreizehenmöwe, *Rissa t. tridactyla* (L.), im Mittelbegebiet. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 7-10.
- BERNDT, R. (1937b): Trauerente, *Oidemia n. nigra* (L.), auf der Elbe bei Steckby. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 10-11.
- BERNDT, R. (1938): Erneut Trauerente und Dreizehenmöwe bei Steckby a. d. Elbe. Beitr. Avifauna Mitteldt. 2: 15.
- BERNDT, R. (1939): Zur Nistweise des Hausrotschwanzes. Dt. Vogelwelt 64: 9-12.
- BERNDT, R. (1940a): Sommervorkommen eines jungen Weissrückenspechtes, *Dryobates l. leucotos* (Bechst.), im Mittelbegebiet. Ornithol. Monatsber. 48: 83-84.
- BERNDT, R. (1940b): Schlagschwirl, *Locustella fluviatilis* (Wolf), bei Steckby. Beitr. Avifauna Mitteldt. 4: 58-60.
- BERNDT, R. (1941): Merlin jagt auf Haustauben. Ornithol. Monatsber. 49: 174-175.
- BERNDT, R. (1942): Gartenbaumläufer als Pflegeeltern von Gartenrotschwänzen. Dt. Vogelwelt 67: 51-54.
- BERNDT, R. K. & G. BUSCHE (1993): Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Bd. 4. Neumünster.
- BERTHOLD, P. (1973): Über den starken Rückgang der Dorngrasmücke *Sylvia communis* und anderer Singvogelarten im westlichen Europa. J. Ornithol. 114: 348-360.
- BERTHOLD, P., U. QUERNER & R. SCHLENKER (1990): Die Mönchgrasmücke. Neue Brehm-Bücherei 603. Wittenberg-Lutherstadt.
- BIERBACH, U. (1987): Schnee-Eule bei Siptenfelde (Harz). Apus 6: 237.
- BIETERGEMEINSCHAFT BODETAL (2013): Managementplan für das EU SPA „Nordöstlicher Unterharz“. Gutachten i. Auftr. des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.
- BIRD, D. (2014): Haubenmeise *Parus cristatus* brütet in Halle auf dem Gertraudenfriedhof. Apus 19: 23-25.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2015): European Red List of Birds. Luxemburg.
- BIRTH, M. & B. NICOLAI (1970): Bestandsaufnahme der in einem Teilgebiet des Burger Holzes im Jahre 1969 brütenden Greifvögel. Apus 2: 19-24.
- BLASIUS, R. (1986): Die Vögel des Herzogthums Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Braunschweig.
- BLEY, D., U. MAMMEN & E. GÜNTHER (2015): Die Bedeutung von Pappeln (*Populus spec.*) im nördlichen Harzvorland für den Rotmilan *Milvus milvus*. Abh. Ber. Mus. Heineanum 10, Sonderh.: 63-84.
- BLOCK, B. & P. BLOCK (1986): Zum Brutvorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Flachland und zu ersten Brutnachweisen im Bezirk Potsdam. Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artenschutz Potsdam 2: 30-35.
- BLUME, D. & J. TIEFENBACH (1997): Die Buntspechte. Neue Brehmbücherei 315. Magdeburg.
- BOCK, H. (2008): Wildvogel-Geflügelpest am Helmestausee. Apus 13: 424-426.
- BOCK, H. & S. HERRMANN (2006): Ergebnisse der Greifvogeluntersuchungen 2003 bis 2005 im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz und der Goldenen Aue. Apus 13: 45-61.
- BÖHM, W. (1968a): Die Siedlungsdichte der Vögel einer Kleingartenanlage bei Frose (Kreis Aschersleben). Mitt. IG Avifauna DDR 1: 45-50.
- BÖHM, W. (1968c): Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis* (Wolf)) im NSG Schierstedter Busch bei Aschersleben. Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum 3: 111.

- BÖHM, W. (1969): Gelbbräunlaubsänger (*Phylloscopus inornatus* [Blyth]) erstmalig im nördlichen Harzvorland. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 4: 81.
- BÖHM, W. (2003): Erstnachweis der Brandseeschwalbe in Sachsen-Anhalt für das 20. Jahrhundert. Apus 11: 330-331.
- BÖHM, W. & O. STROHKORB (1964): Eine natürliche Bastardierung zwischen Hausrotschwanz-Weibchen und Gartenrotschwanz-Männchen. Beitr. Vogelkd. 10: 235-236.
- BÖHME, F. (1968a): Einige bemerkenswerte Beobachtungen aus der Elbniederung bei Wittenberg. Beitr. Vogelkd. 14: 92.
- BÖHME, F. (1968b): Seidenreihler (*Egretta garzetta*) an den Altwässern bei Wittenberg. Beitr. Vogelkd. 14: 93.
- BOERNER, O. (1905): [Kiebitze, Zwergtrappe, Dreizehenmöve, Seidenschwanz.]. Ornithol. Monatsschr. 30: 387-388.
- BOERNER, O. (1924a): *Oidemia fusca fusca* (L.) in Anhalt. Ornithol. Monatsber. 32: 15.
- BOERNER, O. (1924b): *Anser brachyrhynchus* Baill. in Anhalt. Ornithol. Monatsber. 32: 85.
- BÖSCHE, H.-J. (2002): Erlebnisse mit Hausrotschwänzen. Ziergeflügel Exoten 47: 253-254.
- BOHN (1897): *Pelecanus crispus* bei Zwebendorf erlegt. Saalezeitung (Halle) v. 06.10.1897.
- BORCHERT, W. (1925): Die Vogelwelt der Umgebung von Schönebeck (Elbe). Abh. Ber. Mus. Natur- und Heimatkd. Magdeburg 4: 4-60.
- BORCHERT, W. (1927): Die Vogelwelt des Harzes, seines nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. Magdeburg.
- BRACKHAHN, F. (1993): Bemerkungen zur Vogelwelt des Truppenübungsplatzes in der Colbitz-Letzlinger Heide. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 11: 73-82.
- BRACKHAHN, F. (2005a): Gebirgsstelzen (*Motacilla cinerea*) im Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 71-75.
- BRACKHAHN, F. (2005b): Zur Siedlungsdichte des Raubwürgers *Lanius excubitor* in der Heide. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 76-77.
- BRACKHAHN, F. (2008): Gebirgsstelzen *Motacilla cinerea* im Raum Magdeburg – Vorkommen und Nistplätze. Apus 13: 420-423.
- BRANDT, S. (1972): Einige interessante Beobachtungen aus dem südöstlichen Teil des Kreises Artern. Apus 2: 287-288.
- BRAUMANN, F. (1991): Bestandserfassung brütender Wiesenvögel im Ohretal bei Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 9: 27-40.
- BRAUMANN, F. (2005): Avifaunistischer Jahresbericht 2003 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 40-58.
- BRAUMANN, F., F. LIEBEL & A. RAUE (2006): Avifaunistischer Zweijahresbericht 2004/05 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 24: 43-68.
- BRAUNEIS, J. (2014): Die Wachtel (*Coturnix coturnix*): Heimkehr eines einheimischen Wildvogels oder Scheinblüte einer Invasionsvogelart? – Betrachtungen am Beispiel des nordhessischen Berglandes. Acta ornithoecol. 8: 3-18.
- BRAUNS, O. (1877): Ankunft der Nachtigall. Monatsschr. Sächs.-Thür. Ver. Vogelkd. Vogelschutz 2: 82.
- BREHM, C. L. (1820): Beiträge zur Vögelkunde. Bd. 1. Neustadt an der Orla.
- BREHM, C. L. (1837): Etwas über die Vögel bey Jena. Isis (Oken) 30: 673-685.
- BRENNECKE, R. (1972a): Der Vogelbestand eines höhlenreichen Buchen-Altholzes in Randlage im Revier Behnsdorf (Kreis Haldensleben) 1971. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 41-45.
- BRENNECKE, R. (1972b): Der Brutvogelbestand eines Eichenforstes (Altholz) im Kerngebiet des eigentlichen Flechtinger Höhenzuges (Revier Behnsdorf, Kreis Haldensleben) 1971. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 51-54.
- BRENNECKE, R. (1973): Der Vogelbestand in Kiefern-Feldgehölzen bei Behnsdorf 1972. Mitt. IG Avifauna DDR 6: 45-50.
- BRENNECKE, R. (1975): Greifvogelbestandsaufnahmen bei Behnsdorf (Kreis Haldensleben) und ihre Auswertung. Mitt. IG Avifauna DDR 7: 3-17.
- BRENNECKE, R. (1976): Avifaunistischer Bericht 1974/75 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 17: 79-96.
- BRENNECKE, R. (1977): Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 18: 50-53.
- BRENNECKE, R. (1978): Avifaunistischer Jahresbericht 1977 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 19: 50-68.
- BRENNECKE, R. (1979): Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 20: 72-85.
- BRENNECKE, R. (1980): Avifaunistischer Jahresbericht 1979 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 21: 50-73.
- BRENNECKE, R. (1981): Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 22: 63-77.
- BRENNECKE, R. (1982): Avifaunistischer Jahresbericht 1981 für den Kreis Haldensleben. Jschr. Kreismus. Haldensleben 23: 46-57.
- BRENNECKE, R. (1983): Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Kreis Haldensleben. Ornithol. Ber. Haldensleben 1: 2-24.
- BRENNECKE, R. (1984a): Artenliste der Vögel des Kreises Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 2: 2-27.
- BRENNECKE, R. (1984b): Avifaunistischer Jahresbericht 1983 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 2: 28-48.
- BRENNECKE, R. (1985): Avifaunistischer Jahresbericht 1984 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 3: 2-23.
- BRENNECKE, R. (1986): Avifaunistischer Jahresbericht 1985 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 4: 2-25.
- BRENNECKE, R. (1987): Avifaunistischer Jahresbericht 1986 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 5: 2-25.
- BRENNECKE, R. (1988a): Avifaunistischer Jahresbericht 1987 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 6: 2-22.
- Brennecke, R. (1988b): Vom Birkhuhn, *Lyrurus tetrix*, einst im Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 6: 37-40.
- BRENNECKE, R. (1989): Avifaunistischer Jahresbericht 1988 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 7: 2-22.
- BRENNECKE, R. (1990): Avifaunistischer Jahresbericht 1989 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 8: 2-20.
- BRENNECKE, R. (1991): Avifaunistischer Jahresbericht 1990 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 9: 2-17.

- BRENNECKE, R. (1992): Avifaunistischer Jahresbericht 1991 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 10: 2-18.
- BRENNECKE, R. (1993): Avifaunistischer Jahresbericht 1992 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 11: 2-18.
- BRENNECKE, R. (1994): Avifaunistischer Jahresbericht 1993 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 12: 2-20.
- BRENNECKE, R. (1995): Avifaunistischer Jahresbericht 1994 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 13: 5-26.
- BRENNECKE, R. (1996): Avifaunistischer Jahresbericht 1995 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 14: 2-20.
- BRENNECKE, R. (1997): Avifaunistischer Jahresbericht 1996 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 15: 2-26.
- BRENNECKE, R. (1998a): Avifaunistischer Jahresbericht 1997 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 16: 3-30.
- BRENNECKE, R. (1998b): Die Blauracke (*Coracias garrulus* L.) – ein ehemaliger Brutvogel unserer Heimat. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 16: 62-76.
- BRENNECKE, R. (1998c): Gottlob von Nathusius (1884-1948) als Ornithologe und Vogelsammler. Jschr. Mus. Ohrekr. 5: 55-82.
- BRENNECKE, R. (1999a): Avifaunistischer Jahresbericht 1998 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 17: 2-32.
- BRENNECKE, R. (1999b): Ergänzung zum Blauracken-Beitrag von 1998. Haldensleber Vogelkd.-Informationen 17: 72.
- BRENNECKE, R. (1999c): August Reimann (1874-1957) - ein Gewährsmann von Bruno Weber aus dem Drömlig. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 17: 79-88.
- BRENNECKE, R. (2000a): Avifaunistischer Jahresbericht 1999 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 18: 2-29.
- BRENNECKE, R. (2000b): Vogelkundliches aus den Braunschweigischen Forsten von Calvörde unter Georg Alers bis 1880. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 18: 69-75.
- BRENNECKE, R. (2001): Avifaunistischer Jahresbericht 2000 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 19: 2-34.
- BRENNECKE, R. (2002a): Avifaunistischer Jahresbericht 2001 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 20: 2-30.
- BRENNECKE, R. (2002b): Zur Vogelwelt der braunschweigischen Exklave Calvörde von 1880 bis 1912 unter Bezugnahme auf Oberförster Rudolph Uhde. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 20: 74-94.
- BRENNECKE, R. (2003): Avifaunistischer Jahresbericht 2002 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 21: 3-34.
- BRENNECKE, R. (2004): Avifaunistischer Jahresbericht 2003 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 22: 2-36.
- BRENNECKE, R. (2005a): Avifaunistischer Jahresbericht 2004 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 2-40.
- BRENNECKE, R. (2005b): Nachweise aus Born (Altmark) oder Borne (Börde): Mönchsgeier, Mehlschwalben? Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 78-79.
- BRENNECKE, R. (2005c): Zur Vogelwelt des Südwest-Teiles der alten preußischen Kreise Gardelegen und Neu-Haldensleben bis 1915. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 23: 90-112.
- BRENNECKE, R. (2006): Avifaunistischer Jahresbericht 2005 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 24: 2-42.
- BRENNECKE, R. (2007): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 25: 2-34.
- BRENNECKE, R. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2007 für den Altkreis Haldensleben. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 26: 2-33.
- BRENNECKE, R. (2009): Der Forstmann Friedrich Menzel (1867-1935) – Ornithologe, Vogelschützer, Eier- und Vogelsammler. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 102-130.
- BRENNECKE, R. (2012): Preußische Forstbeamte aus der Familie Meyerinck mit ornithologischen Kenntnissen. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 30: 43-74.
- BRICHETTI, P. & G. FRACASSO (2003): Ornitologia Italiana. Vol. 1. Gaviidae – Falconidae. Bologna.
- BRIESEMEISTER, E. (1968): Purpurreiher in der Nähe von Magdeburg. Apus 1: 250.
- BRIESEMEISTER, E. (1970): Weiterer Nachweis der Spornammer – *Calcarius lapponicus* (L.) – im Mittelbegebiet um Magdeburg. Apus 2: 91-92.
- BRIESEMEISTER, E. (1979): Nachtigallenzählung im Stadtkreis Magdeburg 1977. Apus 4: 113-120.
- BRIESEMEISTER, E. (1985): Über den Lebensweg zweier entfloher Kuhreiher. Falke 32: 275-277.
- BRIESEMEISTER, E. (1997): Die Brutvögel des Magdeburger Rotehornparks. Apus 9: 245-258.
- BRIESEMEISTER, E. (2002): Mittlere Erstbeobachtungen einiger Vogelarten aus dem Raum Haldensleben und Magdeburg. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 20: 72-73.
- BRIESEMEISTER, E. & M. BIRTH (1992): Der Stausee Ladeburg, ein Wasservogelschongebiet im Bezirk Magdeburg. Apus 8: 78-85.
- BRIESEMEISTER, E., H. STEIN & K.-J. SEELIG (1987): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes (Teil 1) für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“. Magdeburg.
- BRIESEMEISTER, E., H. STEIN & K.-J. SEELIG (1988): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes (Teil 2) für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelbe-Börde“. Magdeburg.
- BRINKMANN, M. (1919): Die abweichende Zusammensetzung der Vogelwelt im östlichen und westlichen Süden der Provinz Hannover. Ein Beitrag zur Avifauna von Hannover. 5. bis 10. Jber. der Niedersächs. Zool. Vereinigung 48-82.
- BRINKMANN, M. (1933): Die Vogelwelt Nordwestdeutschlands. Hildesheim.
- BRUDERER, B. & W. HIRSCHI (1984): Langfristige Bestandsentwicklung von Gartenrötel *Phoenicurus phoenicurus* und Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca* nach schweizerischen Beringungszahlen und Nisthöhlenkontrollen. Ornithol. Beob. 81: 285-302.



- BRUECKMANN, F. E. (1749): Epistola itineraria XVII. sistens. Aves Sylvae Hercynicae (ad. Dn. Joh. Heinr. Zorn, d. 6. Nov. 1745, in Epp. itiner. Cent. II, 143-162). Wolfenbüttel.
- BRUNS, H. & H. NOCKE (1959): Die Erstankunft der Nachtigall in Deutschland 1948-1957. Ornithol. Mitt. 11: 81-86.
- BÜHLER, U. (2001): Brutvorkommen des Weißrückenspechts *Dendrocopos leucotos* in Nordbünden. Ornithol. Beob. 98: 1-11.
- BÜRGER, M. (1963): Baßtöpel, *Morus bassanus*, im Bezirk Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 8: 313-314.
- BÜRGER, M. (1964): Rosaflamingo, *Phoenicopterus antiquorum*, bei Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 9: 374-375.
- BUNDESDEUTSCHER SELTENHEITENAUSCHUß (1991): Seltene Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland von 1977 bis 1986. Limicola 3: 157-196.
- BURFIELD, I. & F. VAN BOMMEL (2004): Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge.
- BUSCHENDORF, J. (2011): Hassen und Kleptoparasitismus. Apus 16: 102.
- BUSCHING, W. (2003): Die Vogelsammlung Johann Friedrich Naumanns im Naumann-Museum Köthen (Vogelbestände im Saal 3). Bl. Naumann-Mus. 22: 1-44.
- BUSCHING, W.-D., U. KOLBE & J. NEUMANN (1990): Der Rötelfalke in der DDR. Falke 37: 24-29.
- CABANIS, J. (1850/51): Museum Heineanum. Verzeichnis der ornithologischen Sammlung. I. Theil, Singvögel. Halberstadt.
- CADE, T., P. KOSKIMIES & O. K. NIELSEN (1998): *Falco rusticolus* Gyrfalcon. BWP Update. The Journal of Birds of the Western Palearctic 2: 1-25.
- CIMIOTTI, D. V., R. SCHULZ, B. KLINNER-HÖTKER & H. HÖTKER (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland: Seeregenpfeifer. Falke 62: 24-29.
- CLAUSING, P. & W. GLEICHNER (1978): Überwinternde Rotmilane, *Milvus milvus*, bei Bernburg, Mühlhausen und im Nordharz-Vorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 3: 23-30.
- CLEVEN, B. & W. TÖPFER (1966): Die Brutdichte im Peißnitz-Auwald (Halle). Apus 1: 48-52.
- CRAMP, S. & K. E. L. SIMMONS (1983): The Birds of the Western Palearctic. Vol. III. Oxford.
- CREUTZ, G. (1964): Das Vorkommen der Blauracke in der DDR und ihr Rückgang in den letzten Jahrzehnten. Falke 11: 39-49.
- CREUTZ, G. (1975): Die Kanadagans in der DDR. Falke 22: 375-381.
- CREUTZ, G. (1979): Die Entwicklung des Blaurackenbestandes in der DDR 1961-1976. Falke 26: 222-230.
- CSÖRGÖ, T., K. KARCZA, G. HALMOS, G. MAGYAR, J. GYURÁCZ, T. SZÉP, A. BANKOVICS, A. SCHMIDT & E. SCHMIDT (2009): Magyar madárvonulási atlasz. Budapest.
- DAMKE, U. (1930): Über die Wirkung intensiver Bodenkultur auf die Tierwelt, insbesondere auf die Vögel. Naturschutz 11: 200-204.
- DANKERT, P. (1959): Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) im Drömling nachgewiesen. J. Ornithol. 100: 108-109.
- DATHE, H. (1940): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Drömlings (Altmark). (Fortsetzung, Schluß). Beitr. Avifauna Mitteldt. 4: 3-21, 49-54.
- DATHE, H. (1960): Vom Brüten der Blauracke, *Coracias garrulus*, und des Schwarzstorches, *Ciconia nigra*, in der Dübener Heide. Beitr. Vogelkd. 7: 64.
- DAVENPORT, D. L. (1979): Spring passage of skuas at Balranald, North Uist. Scott. Birds 10: 216-221.
- DAVENPORT, D. L. (1981): The spring passage of Pomarine and Longtailed Skuas off the south and west coasts of Britain and Ireland. Irish Birds 2: 73-79.
- DELANY, S., D. SCOTT, T. DODMAN & D. STROUT (2009): An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Eurasia. Wageningen.
- DEMUTH, K. (2000): Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*) im Drömling. Milvus 19: 59-60.
- DETMERS, E. (1912): Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung einiger jagdlich wichtiger Brutvögel in Deutschland. Jahrb. Inst. f. Jagdkd. 1: 65-164.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2012): Seltene Vogelarten in Deutschland 2010. Seltene Vögel Dt. 2010: 10-49.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2013): Seltene Vogelarten in Deutschland 2011 und 2012. Seltene Vögel Dt. 2011-2012: 2-47.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2014): Seltene Vogelarten in Deutschland 2013. Seltene Vögel Dt. 2013: 2-39.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2015): Seltene Vogelarten in Deutschland 2014. Seltene Vögel Dt. 2014: 2-36.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2018): Seltene Vogelarten in Deutschland 2016. Seltene Vögel Dt. 2016: 2-33.
- DEUTSCHE AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION (DAK) (2019): Seltene Vogelarten in Deutschland 2017. Seltene Vögel Dt. 2017: 2-34.
- DEUTSCHE ORNITHOLOGEN-GESELLSCHAFT (DO-G) (1868): Bericht über die XVI. Versammlung der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft in Kiel am 2ten, 3ten und 4ten Juni 1868. Münster.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. Limicola 8: 153-216.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1995): Seltene Vogelarten in Deutschland 1993. Limicola 9: 77-109.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. Limicola 10: 209-257.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1997): Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. Limicola 11: 153-208.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. Limicola 12: 161-227.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2000): Seltene Vogelarten in Deutschland 1997. Limicola 14: 273-339.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. Limicola 16: 113-184.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2005): Seltene Vogelarten in Deutschland 1999. Limicola 19: 1-63.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2006): Seltene Vogelarten in Deutschland 2000. Limicola 20: 281-353.

- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2008): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2001 bis 2005. *Limicola* 22: 249-339.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2009): Seltene Vogelarten in Deutschland von 2006 bis 2008. *Limicola* 23: 257-334.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) (2010): Seltene Vogelarten in Deutschland 2009 (mit Nachträgen 2001-2008). *Limicola* 24: 233-286.
- DIELITZSCH, E. (1940): *Locustella fl. fluviatilis* (Wolf) bei Dessau-Großkühnau. Beitr. Avifauna Mitteldt. 4: 60-61.
- DIELITZSCH, E. (1944): Löffler, *Platalea l. leucorodia* L., bei Klieken in Anhalt. Ornithol. Monatsber. 52: 52.
- DIERSCHKE, J. (2014): Das Vorkommen der Pazifischen Ringelgans *Branta bernicla nigricans* in Deutschland. Seltene Vögel in Deutschland 2013: 40-49.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, F. JACHMANN & F. STÜHMER (2006): Ornithologischer Jahresbericht 2005 für Helgoland. Ornithol. Jber. Helgoland 16: 1-60.
- DIERSCHKE, J., V. DIERSCHKE, K. HÜPPÖR, O. HÜPPÖR, K. F. JACHMANN (2011): Die Vogelwelt der Insel Helgoland. Helgoland.
- DIERSCHKE, V. (1997): Das Vorkommen des Sumpfläufers *Limicola falcinellus* in Deutschland. *Limicola* 11: 217-230.
- DIESSNER, F. (1966): Schnee-Eule im Kreis Köthen. Falke 13: 426.
- DOBBRICK, W. (1933): Die Zaunammer in Weißenfels (Prov. Sachsen). Ornithol. Monatsber. 41: 55-56.
- VAN DONGEN, R. M., R. HOFLAND & P. W. W. DE ROUW (2007): Recente meldungen September – Oktober 2007, Nederland. Dutch Birding 29: 400-411.
- DORNBUSCH, G. (2002): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt von 1990 bis 2000. *Natursch. Land Sachsen-Anhalt* 39: 29-42.
- DORNBUSCH, G. (2007): Der Langzeit-Vogelschutzversuch Steckby. *Natursch. Land Sachsen-Anhalt* 44, Sonderh.: 65-76.
- DORNBUSCH, G., S. FISCHER, K. GEORGE, B. NICOLAI & A. PSCHORN (2007): Bestände der Brutvögel Sachsen-Anhalts – Stand 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 121-125.
- DORNBUSCH, G., K. GEDEON, K. GEORGE, R. GNIELKA & B. NICOLAI (2004a): Rote Liste der Vögel (Aves) des Landes Sachsen-Anhalt (2. Fassung, Stand: Februar 2004). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 39: 138-143.
- DORNBUSCH, G., K. GEDEON, K. GEORGE, R. GNIELKA & B. NICOLAI (2004b): Die Bestandssituation der Brutvögel Sachsen-Anhalt – Stand 1999. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 79-84.
- DORNBUSCH, M. (1968a): Erstbeobachtung des Blutspechts (*Dendrocopos syriacus*) in Deutschland. J. Ornithol. 109: 128.
- DORNBUSCH, M. (1971a): Zur Brutvogel-Siedlungsdichte in Kiefernforsten mit Bemerkungen zur Auswertungsmethodik. Mitt. IG Avifauna DDR: 3-11.
- DORNBUSCH, M. (1971b): Mischbruten und nichtarteigene Fütterungsbeteiligung bei Baumläufern. Falke 18: 208.
- DORNBUSCH, M. (1972): Die Siedlungsdichte des Brutvogelbestandes und die Vogeldichte außerhalb der Brutzeit in Kiefernjungbestockungen sowie ihre Beeinflussung durch Vogelschutzmaßnahmen. Beitr. Vogelkd. 18: 265-294.
- DORNBUSCH, M. (1977): Rauhfußkauz bei Steckby. Apus 4: 43-44
- DORNBUSCH, M. (1980): *Certhia*-Erkenntnisse. Falke 27: 46-51.
- DORNBUSCH, M. (1981): Die Ernährung einiger Kleinvogelarten in Kiefernjungbestockungen. Beitr. Vogelkd. 27: 73-99.
- DORNBUSCH, M. (1982): Zur Mauser des Gartenbaumläufers, *Certhia b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820. Ann. Ornithol. 6: 87-90.
- DORNBUSCH, M. (1990): Ein interessanter Ringfund. Habichtskauz-Nachweis. Falke 37: 300-301.
- DORNBUSCH, M. (1992): Rote Liste der Vögel des Landes Sachsen-Anhalt (1. Fassung, Stand, April 1991). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt 1: 13 –15.
- DORNBUSCH, M. (2001): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt (Stand: 31.12.2010). Apus 11, Sonderh.: 1-46.
- DORNBUSCH, M. (2012): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. Stand: 31.12.2010. Apus 17, Sonderh. 2: 1-63.
- DORNBUSCH, M. (2013): In Sachsen-Anhalt beobachtete nicht heimische Vogelarten und Anmerkungen zur Artenliste 2012. Apus 18: 9-15.
- DORNBUSCH, M. (2017): Bemerkenswerte Ringfunde von Waldbaumläufern *Certhia familiaris* und Gartenbaumläufer *C. brachydactyla*. Apus 22: 81-95.
- DORNBUSCH, M. & C. DORNBUSCH (2010): Ein Adlerbussard *Buteo rufinus* bei Steckby. Apus 15: 69-70.
- DORNBUSCH, M. & G. DORNBUSCH (1996): Ein Steppenadler im Zerbster Land. Apus 9: 222-223.
- DRIECHCIARZ, R. & E. DRIECHCIARZ (2009): Vergleichende Untersuchung zur Jagdstrategie ausgewählter Greifvogelarten und damit verbundene Nutzungshäufigkeit verschiedener Landschaftselemente. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 6: 181-186.
- DRÖSSLER, H.-P. (1974): Beobachtung einer Zwergtrappe, *Tetrax tetrax* L., im Fiener Bruch (Kreis Genthin). Beitr. Vogelkd. 20: 320.
- DUDÁS, M., G. KOVÁCS & I. SÁNDOR (1993): Der Adlerbussard *Buteo rufinus* als mitteleuropäischer Brutvogel in der ungarischen Hortobagy-Pušta. *Limicola* 7: 141-146.
- EBELING (1871): Schneeeule bei Domersleben. Bl. Handel, Gewerbe und soziales Leben. Beibl. Magdeburg. Ztg.: 110.
- EBELING (1874): Die Magdeburgische Vogelwelt. Bl. Handel, Gewerbe soziales Leben. Beibl. Magdeburg. Ztg.: 182.
- EICHLER, R. & K. HAARSTICK (1995): Die Wiederansiedlung des Auerhuhns im Harz. Naturschutzreport 10: 125-134.
- ELLERMAA, M. & A. LINDÉN (2015): Sügisränne põõsaspeal 2014. aastal. *Hirundo* 1: 20-49.
- ERTAN, K. T. (2000): Evolutionary Biology of the genus *Phoenicurus* – Phylogeography, natural hybridisation and population dynamics. Marburg.
- ESTAF'EV, A. A. (1995): Otrjad Charadriiformes ržankoobraznye. In: Fauna Evropejskogo Severo-Vostoka Rossii. Pticy. Tom I, Čast' I. Nevorob'inye. Sankt-Peterburg.
- EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (EEA) (2012): EEA Technical Report: The impacts of invasive alien species in Europe. No. 16.
- FABER, G. (1932): Trauerente schon im August in Mitteldeutschland. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 6: 21.
- FEILER, A. (1969): Die Verbreitung und Entwicklung der Auerwildbestände in den Kiefernwäldern zwischen Mulde und Neißة. Beitr. Vogelkd. 14: 290-309.

- FELDMANN, M. & H. KEIL (1972): Spornammern an der Mittel-  
elbe. Apus 2: 286.
- FEUERSTEIN, W. (1953): Neues vom Rauhfußkauz, *Aegolius f. funereus* (L.). Mitt. Thür. Ornithol. 4: 28-29.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2007): Meldungen aus den Beringungszentralen. Vogelwarte 45: 227-229.
- FIEDLER, W., U. KÖPPEN & O. GEITER (2008): Meldungen aus den Beringungszentralen. Vogelwarte 46: 59-60.
- FIGARSKI, T. & L. KAJTOCH (2018): Hybrids and mixed pairs of Syrian and Great-spotted Woodpeckers in urban populations. J. Ornithol. 159: 311-314.
- FISCHER, S. & M. RICHTER (2019): Die Vogelwelt des Altkreises Bitterfeld. Bitterfelder Heimatbl. 33: 1-212.
- FISCHER, S. (2009): Sechs Jahre Beringungsarbeit an einem IMS-Fangplatz in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 59-66.
- FISCHER, S. (2012): Zehn Jahre Punkt-Stopp-Zählungen im EU SPA Zerbster Land. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 85-94.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2004): Bestandssituation seltener Vogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2001 bis 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 5-31.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2005): Bestandssituation seltener Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 3-23.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2006): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-27.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2007): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-30.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2009): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 5-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2010b): Abschluss der Ersterfassungen wertgebender Brutvogelarten in den Europäischen Schutzgebieten Sachsen-Anhalts. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2011): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 5-36.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2012): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 5-35.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2014a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2012. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 5-38.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2014b): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2013. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 5-39.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2015a): Bestandssituation ausgewählter Brutvogelarten in Sachsen-Anhalt – Jahresbericht 2014. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 5-41.
- FISCHER, S. & G. DORNBUSCH (2015b): Bestand und Bestandsentwicklung der Brutvögel Sachsen-Anhalts – Stand 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 71-80.
- FISCHER, S. & F. FABIAN (2019): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im Europäischen Vogelschutzgebiet Zerbster Land in den Jahren 2015 und 2016. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 71-86.
- FISCHER, S. & A. PSCHORN (2012): Brutvögel im Norden Sachsen-Anhalts – Kartierung auf TK25-Quadranten von 1998 bis 2008. Apus 17, Sonderh. 1: 9-236.
- FLADE, M. & J. JEBRAM (1995): Die Vögel des Wolfsburger Raums im Spannungsfeld zwischen Industriestadt und Natur. Wolfburg.
- FLOORICKE, C. (1927): Zum Vorkommen des Uhu. Mitt. Vogelwelt 26: 40.
- FORRESTER, R. & I. ANDREWS (2007): The Birds of Scotland. Vol. 2. Aberlady.
- FOX, A. & S. ASPINALL (1987): Pomarine Skuas in Britain and Ireland in autumn 1985. British Birds 80: 404-421.
- FRANSSON, T. & S. HALL-KARLSSON (2008): Svensk ringmärkningsatlas Vol. 3. Stockholm.
- FRANZ, E. (1963): Die Sperbergrasmücke im Raum Magdeburg. Falke 10: 114-115.
- FREIDANK, K. (1973): Partieller Albinismus bei Wacholder- (*Turdus pilaris* L.) und Rotdrossel (*Turdus iliacus* L.). Beitr. Vogelkd. 19: 468-470.
- FREIDANK, K. (1989): Die Vögel des Fiener Bruches und seiner Randgebiete. Teil II: (Passeres). Beitr. Tierwelt Mark 11: 89-103.
- FREIDANK, K. & H.-P. DRÖSSLER (1983): Die Vögel des Fiener Bruches und seiner Randgebiete. Teil I: Nonpasseres. Beitr. Tierwelt Mark 10: 41-69.
- FREIDANK, K. & L. PLATH (1982): Zur Vogelwelt der Elbe-Havel-Winkels. Genthin.
- FRICK (1904): Zwergtrappe (*Otis tetrax*) hier seit mehreren Jahren Brutvogel. Ornithol. Monatsschr. 29: 313.
- FRIEDRICHS, T. (1993): Löffler im Landkreis Stendal. Apus 8: 186-187.
- FRIEDRICHS, T. (2006): Die Nilgans im Landkreis Stendal. Untere Havel, Naturkd. Ber. Altmark Prignitz 16: 33-38.
- FRIEDRICHS, T. (2014): Zum Aggressionsverhalten der Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*). Untere Havel, Naturkd. Ber. Altmark Prignitz 24: 36-38.
- FRIEDRICHS, T. (2016): Zur Überwinterung der Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* in der Altmark. Apus 21: 60-65.
- FRITSCH, G. (1983): Die Vogelwelt eines chemischen Großbetriebes. Apus 5: 133-142.
- FRITSCH, G. (1992): Kolkrahen- und Rotmilanbrut auf Hochspannungsmasten im Kreis Weißenfels. Apus 8: 91-92.
- FRITSCH, G. (1995): Wiederansiedlung der Gebirgsstelze im Kreis Weißenfels. Apus 9: 135.
- FRÜHAUF, W. & M. DORNBUSCH (1978): Höchstalter des Kernbeißers. Falke 25: 212-213.
- FUCHS, E. (1963): Der Rauhfußkauz, *Aegolius funereus*, Brutvogel im Harz. Beitr. Vogelkd. 8: 469-470.



- FUCHS, E. (2000): Einfluss fünfjähriger ökologischer Bewirtschaftung eines Landwirtschaftsbetriebes auf die Vogelfauna – dargestellt am Ökohof Seeben. UZU-Schriftenreihe, N.F., Sonderbd.: 217-229.
- FURNESS, R. W. (2010): The skuas. London.
- FUX, O. (1959): „Ein Odinhühnchen im Vogtland ...“. Falke 6: 177.
- GÄTKE, H. (1891). Die Vogelwarte Helgoland. Braunschweig
- GARTHE, S., N. SONNTAG, P. SCHWEMMER & V. DIERSCHKE (2007): Estimation of seabird numbers in the German North Sea throughout the annual cycle and their biogeographic importance. Vogelwelt 128: 163-178..
- GEDEON, K., C. GRÜNEBERG, A. MITSCHKE, C. SUDFELDT, W. EIKHORST, S. FISCHER, M. FLADE, S. FRICK, I. GEIERSBERGER, B. KOOP, M. KRAMER, T. KRÜGER, N. ROTH, T. RYSLAVY, S. STÜBING, S.R. SUDMANN, R. STEFFENS, F. VÖKLER & K. WITT (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Münster.
- GEHLHAAR, H. & G. LENZER (1968): Ringelgans bei Luckenau (Kr. Zeitz). Apus 1: 195.
- GEHLHAAR, H. & R. WEIßGERBER (2009): Brutgrößen von Greifvögeln und Eulen im Zeitzer Land. Apus 14: 35-43.
- GEITER, O., S. HOMMA & R. KINZELBACH (2002): Bestandsaufnahme und Bewertung von Neozoen in Deutschland. Forschungsbericht 296 89 901/01, UBA-FB 000215.
- GENTZ, K. (1955): Zur Verbreitung des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers. Falke 2: 113-114.
- GEORGE, B. (2009): Die Gebäudebrüter in Dessau-Zoberberg und Dessau-Schaftrift (Stadt Dessau-Roßlau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 21: 5-17.
- GEORGE, K. (1983): Zum Vorkommen der Wachtel *Coturnix coturnix* (Linné, 1758) in der Deutschen Demokratischen Republik. Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sektion Pflanzenproduktion.
- GEORGE, K. (1988): Beobachtung eines Kuhreihers im nördlichen Harzvorland. Apus 7: 34-36.
- GEORGE, K. (1989): Zur Überwinterung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland. Acta Ornithoecol. 2: 65-77.
- GEORGE, K. (1993a): Untersuchung eines Landschaftsausschnitts im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) als Lebensraum für Vögel. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 31-46.
- GEORGE, K. (1993b): Ziehende Kraniche (*Grus grus*) hassen auf Raubmöwe (*Stercorarius spec.*). Vogelwarte 37: 145.
- GEORGE, K. (1994): Zur Überwinterung von Rotmilanen *Milvus milvus* im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt). Vogelwelt 115: 127-132.
- GEORGE, K. (1995a): Überwinterung von Rotmilanen (*Milvus milvus*) im nördlichen Harzvorland/Sachsen-Anhalt. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 59-66.
- GEORGE, K. (1995b): Herkunft und Alter überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* nördlich der traditionellen Winterquartiere. Vogelwelt 116: 311-315.
- GEORGE, K. (1996a): Entwicklung der Anzahl überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* L. zwischen Harz und Havel bis 1994. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 3: 199-205.
- GEORGE, K. (1996b): Deutsche Landwirtschaft im Spiegel der Vogelwelt. Vogelwelt 117: 187-197.
- GEORGE, K. (1999): Sommerlebensräume der Wachtel *Coturnix coturnix* in der mitteleuropäischen Agrarlandschaft. NNA-Berichte 12 (3): 88-92.
- GEORGE, K. (2001): Langjährige Bestandsaufnahmen der Wachtel: Gute Aussichten in Ostdeutschland. Falke 48: 309-311.
- GEORGE, K. (2004): Veränderungen der ostdeutschen Agrarlandschaft und ihrer Vogelwelt insbesondere nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Apus 12: 1-138.
- GEORGE, K. (2005c): Fußerkrankungen bei Buchfinken, Bergfinken und Rohrammern: Bemerkungen zum Beitrag von H. Dittberner und W. Dittberner: „Viröse Fußerkrankungen beim Buchfink *Fringilla coelebs* auf Rügen“ – Ornithologische Mitteilungen 57, Heft 7/8, 2005. Ornithol. Mitt. 57: 413-415.
- GEORGE, K. (2007): Waldbaumläufer *Certhia familiaris* und Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla* auf einer Untersuchungsfläche im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 25: 107-112.
- GEORGE, K. (2008a): Vergleichende Betrachtung der Brutbestandsentwicklung von Meisen der Gattung *Parus* und ausgewählter weiterer Arten im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) seit 1993. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 201-211.
- GEORGE, K. (2008b): Wie kurz- oder langlebig sind Meisen der Gattung *Parus*? Vogelwarte 46: 217-221.
- GEORGE, K. (2009): Schlagschwirl *Locustella fluviatilis* brütet im Harz. Ornithol. Mitt. 61: 112-116.
- GEORGE, K. (2010): Veränderungen der ostdeutschen Agrarlandschaft und ihrer Vogelwelt. Naturschutzarb. Sachsen 52: 66-73.
- GEORGE, K. & B. NICOLAI (1996): Lebenserwartung freilebender Milane (*Milvus milvus*, *Milvus migrans*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 49-51.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1997): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt. Apus 9: 259-290.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 37-71.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 125-160.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2000): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1999 in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 221-259.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2001): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2000 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 1-36.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2002): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2001 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 127-177.
- GEORGE, K. & M. WADEWITZ (2003): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2002 in Sachsen-Anhalt. Apus 11: 283-326.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2004): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2003 in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 205-237.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2005): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2004 in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 257-287.
- GEORGE, K., M. WADEWITZ & S. FISCHER (2006): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 2005 in Sachsen-Anhalt. Apus 13: 3-33.



- GIEBEL, H. (1933): Zugbeobachtungen bei Magdeburg im Herbst 1932. *Der Vogelfreund* 2: 35.
- GIERTH, D. (1967): Rallenreier bei Halle. *Falke* 14: 138.
- GILG, O., I. HANSKI & B. SITTLER (2003): Cyclic dynamics in a simple vertebrate predator-prey community. *Science* 302: 866-868.
- GILG, O., B. SITTLER, B. SABARD, A. HURSTEL, R. SANE, P. DELATTRE & I. HANSKI (2006): Functional and numerical responses of four lemming predators in high arctic Greenland. *Oikos* 113: 193-216.
- GLATZEL, K. & J. ZAUMSEIL (1997): Der Rosenstar (*Sturnus roseus* L.). Erstnachweis für das Gebiet des Burgenlandkreises. *Saale-Unstrut-Jahrb.* 2: 79-80.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2013): Bruten von Greifvögeln auf Gittermasten. *Apus* 18:161-163.
- GLEICHNER, W. & A. BOBBE (2015): 50 Jahre Greifvogelkartierung im Plötzkauer Auwald 1964-2013. *Apus* 20: 16-37.
- GLEICHNER, W., F. GLEICHNER & A. BOBBE (2008): Gemeinsames Nisten von Rot- und Schwarzmilan auf einem Baum. *Apus* 13: 355-356.
- GLEICHNER, W., F. GLEICHNER, A. BOBBE, U. HENKEL & S. KAMP-RATH (2013): Die Schlafplätze des Rotmilans *Milvus milvus* im Altkreis Bernburg von 1985 bis 2013. *Ornithol. Jber. Mus. Heineanum* 31: 37-49.
- GLEICHNER, W. & K. ZAPPE (1980): Die Graureiherkolonie bei Plötzkau (Kr. Bernburg). *Apus* 4: 167-171.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 12., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 14., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & K.M. BAUER (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 8. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1986): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 7. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1989): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 4. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1994): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. 2. Aufl., Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N., K.M. BAUER & E. BEZZEL (1999): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6. 3. Aufl., Wiesbaden.
- GNIELKA, R. (1965): Die Vögel der Rabeninsel bei Halle (Saale). Ergebnisse ganzjähriger quantitativer Bestandsaufnahmen in einem Steleichen-Eschen-Ulmen-Auwald. *Hercynia N.F.* 2: 221-254.
- GNIELKA, R. (1966): Die Vögel des Tagebaurestlochs Halle-Bruckdorf. *Apus* 1: 65-74.
- GNIELKA, R. (1967): Bestandsaufnahmen der Nachtigallen im Stadtkreis Halle. *Apus* 1: 113-117.
- GNIELKA, R. (1974): Die Vögel des Kreises Eisleben. *Apus* 3: 145-248.
- GNIELKA, R. (1977a): Avifaunistischer Jahresbericht 1974 für den Bezirk Halle. *Apus* 4: 25-39.
- GNIELKA, R. (1977b): Zwergohreule in Halle. *Apus* 4: 43.
- GNIELKA, R. (1978a): Der Einfluß des Ulmensterbens auf den Brutvogelbestand eines Auwaldes. *Apus* 4: 49-66.
- GNIELKA, R. (1978b): Zur Ökologie und Brutbiologie des Girlitz (*Serinus serinus*). *Ornithol. Mitt.* 30: 81-90.
- GNIELKA, R. (1979): Avifaunistischer Jahresbericht 1975 für den Bezirk Halle. *Apus* 4: 97-112.
- GNIELKA, R. (1981): Die Vögel des Südfriedhofes Halle. Ergebnisse ganzjähriger Bestandsaufnahmen 1964-1978. *Hercynia N.F.* 18: 134-184.
- GNIELKA, R. (1982): Avifaunistische Daten aus dem Fotonotizbuch von Fritz Stenzel. *Apus* 5: 38-40.
- GNIELKA, R. (1983a): Avifauna von Halle und Umgebung. Teil 1: Halle.
- GNIELKA, R. (1983b): Vogelwelt des Kreises Querfurt. Erläuteretes Verzeichnis der im Kreis Querfurt nachgewiesenen Vogelarten. Querfurt.
- GNIELKA, R. (1983c): Avifaunistischer Jahresbericht 1979 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 101-112.
- GNIELKA, R. (1983d): Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 112-122.
- GNIELKA, R. (1984): Avifauna von Halle und Umgebung. Teil 2. Halle.
- GNIELKA, R. (1987a): Die Brutvögel der Autobahngehölze in der Ackerlandschaft bei Halle. *Apus* 6: 244-248.
- GNIELKA, R. (1987b): Daten zur Brutbiologie der Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) aus dem Bezirk Halle. *Beitr. Vogelkd.* 33: 103-113.
- GNIELKA, R. (1989a): Avifaunistischer Jahresbericht 1983 für den Bezirk Halle. *Apus* 7: 97-112.
- GNIELKA, R. (1989b): Avifaunistischer Jahresbericht 1984 für den Bezirk Halle. *Apus* 7: 112-124.
- GNIELKA, R. (1992b): Vogelzählung im winterlichen Unterharz. *Apus* 8: 85-91.
- GNIELKA, R. (1993): Die Brutvögel eines Villengebietes 1966-1992. *Apus* 8: 172-181.
- GNIELKA, R. (1995): Die frühere Verbreitung des Rotkopfwürgers in Sachsen-Anhalt. *Apus* 9: 9-19.
- GNIELKA, R. (2001): Wie verfälscht der „persönliche Faktor“ die Ergebnisse von Vogelerfassungen? *Ornithol. Mitt.* 53: 156-161.
- GNIELKA, R. (2003): Flußregenpfeifer brüten auf Erdgassonden im Altmarkkreis Salzwedel. *Ornithol. Mitt.* 55: 89-92.
- GNIELKA, R. (2005): Brutvogelatlas des Altmarkkreises Salzwedel. *Apus* 12, Sonderh.: 1-167.
- GNIELKA, R. (2010): Brutvogelatlas des Altkreises Haldensleben. *Apus* 15, Sonderh.: 1-185.
- GNIELKA, R. (2014): Die Vögel des Südfriedhofs Halle 1964-2005. *Apus* 19, Sonderh.: 1-252.
- GNIELKA, R. & T. SPRETKE (1982): Avifaunistischer Jahresbericht 1976 für den Bezirk Halle. *Apus* 4: 241-253.
- GNIELKA, R. & J. ZAUMSEIL (1997): Atlas der Brutvögel Sachsen-Anhalts. Kartierung des Sütteils 1990 bis 1995. Halle.
- GÖRNER, M., W. SCHULZE, W. SCHRÖDTER & K. KARLSTEDT (1983): Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung „Stausee Kelbra“ und seine Vogelwelt. *Landschaftspfl. Natursch. Thür.* 20: 30-54.
- GOEZE, J.A.E. & J.A. DONNDORF (1795): Europäische Fauna oder Naturgeschichte der europäischen Thiere. Bd. 5. Leipzig.
- GORMAN, G. (2014): Woodpeckers of the World. London.

- GOTTSCHALK, P. (1917): Zur Einwanderung des Girlitz in Norddeutschland. Ornithol. Monatsber. 25: 13-14.
- GOTTSCHALK, T., S. FRANKE, U. MÄRKEL & S. TRAUTMANN (2014): Einfluss von Klima und Landnutzung auf die Verbreitung ausgewählter Brutvogelarten des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 7: 1-196.
- GOTTSCHLING, H.-J. (1973): Bergente bei Zeitz. Apus 3: 45.
- GRAF ZU WALDECK UND PYRMONT, H. (1934): Brut des Merlins im Regierungsbezirk Merseburg. Ornithol. Monatsschr. 59: 191-192.
- GRAFF, H. (1966): Blauracken-Beobachtung 1966 in der Mosigkauer Heide. Apus 1: 96.
- GRAFF, H. (1967a): Zum Vorkommen des Rohrschwirls im Gebiet Mittelbe. Apus 1: 136-137.
- GRAFF, H. (1968): Über die Flügelänge von Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). Beitr. Vogelkd. 14: 182.
- GRAFF, H. (1970): Bemerkenswerte Vogelarten im Mennewitzer Teichgebiet. Falke 17: 20-23.
- GREMPE, G. (1968): Rotkopfwürger bei Wittenberg. Apus 1: 254.
- GRIMM, H. & J. HAENSEL (1991): Zur Sommernahrung des Raubwürgers, *Lanius excubitor* L., im Süd- und Nordharzvorland. Beitr. Vogelkd. 37: 129-147.
- GROSSE, W. (1925): Der Harz und die Jagd. Harz 28: 527-528.
- GROTE, H. (1905): Beiträge zur heimischen Avifauna (Aus der Vogelsammlung der Kgl. Forst-Akademie Eberswalde). Ornithol. Monatsber. 13: 1-7.
- GRUHL, G. (1964): Seidenreihler bei Magdeburg. Falke 11: 23.
- GÜNTHER, E. (1992a): Untersuchung zum Brutbestand, zur Bestandsentwicklung und zum Habitat des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 10: 31-53.
- GÜNTHER (1992b): Zum Ringeln der Spechte im Nordharzgebiet. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 10: 55-62.
- GÜNTHER, E. (1993a): Zur Wahl des Höhlenstandortes von Bunt- und Mittelspecht (*Dendrocopos major* und *D. medius*) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 67-73.
- GÜNTHER, E. (1993b): „Umgekehrte Begattung“ beim Mittelspecht (*Dendrocopos medius*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 107-108.
- GÜNTHER, E. (1994): Zum Schmieden des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 12: 85-86.
- GÜNTHER, E. (2004): Zur Bestandsentwicklung der Spechte (Picidae) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) unter dem Einfluss des Eichensterbens und der forstlichen Nutzung. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 22: 37-47.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (1997): Der Mittelspecht und die Buche: Versuch einer Interpretation seines Vorkommens in Buchenwäldern. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 15: 97-108.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2001a): Mauersegler *Apus apus* und Mittelspecht *Picoides medius* brüten in einer Eiche. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 55-63.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2001b): Zum avifaunistischen Wert der Laubwälder des Selketals im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 65-94.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2004): Mittelspecht *Picoides medius* brütet in abgebrochener Hainbuche *Carpinus betulus*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 22: 49-50.
- GÜNTHER, E. & M. HELLMANN (2012): Die Vögel auf dem Ausberg im Naturschutzgebiet „Selketal“ im Harz 1991, 2005, 2012. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 81-90.
- GÜNTHER, E. & B. OHLENDORF (1990): Steinrötel *Monticola saxatilis* und Alpenbraunelle *Prunella collaris* auf dem Brocken. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 22: 68-69.
- GÜNTHER, E. & M. WADEWITZ (1990): Der Bestand der Greifvögel im Huy (Nördliches Harzvorland) im Jahre 1981. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1: 1-3.
- GÜNTHER, E., M. HELLMANN & H. LYHS (1978): Bruten der Kolbenente und der Schnatterente im südlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 3: 63-65.
- GÜNTHER, F. (1888): Der Harz in Geschichts-, Kultur- und Landschaftsbildern. Hannover.
- GUYOMARCH, J.C. (2003): Elements for a Common Quail (*Coturnix c. coturnix*) management plan. Game and Wildlife Science 20: 1-92.
- HABICHT, W. (1852): Notizen. Naumannia 2(1): 99-101.
- HADARICS, T. & T. ZALAI (2008): Nomenclator Avium Hungariae. MME Budapest.
- HAENSCHKE, W. (1966): Beobachtung einer Blauracke bei Möst (Kreis Bitterfeld). Apus 1: 96.
- HAENSCHKE, W. (1998): Die Brutvögel der Mosigkauer Heide. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 10: 113-124.
- HAENSCHKE, W. (2000): Beobachtung eines Weißrückenspechtes, *Dendrocopos leucotos* (Bechst. 1803) in der Mulde-Aue bei Möst/Landkreis Bitterfeld. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 12: 75-78.
- HAENSCHKE, W. & J. HAENSCHKE (1991): Mandarinente, *Aix galericulata* (L.), brütet auf dem Wallwitzsee bei Dessau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 6: 74-75.
- HAENSCHKE, W., H. HAMPE, P. SCHUBERT, E. SCHWARZE (1983): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 1. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 3-96.
- HAENSCHKE, W., H. HAMPE, P. SCHUBERT, L. REICHHOFF & E. SCHWARZE (1985): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. Teil 2. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh.: 97-200.
- HAENSEL, J. (1961): Spornammerbeobachtungen bei Halberstadt und Magdeburg. Falke 8: 118-121.
- HAENSEL, J. (1963): Vom Schwarzstirnwürger (*Lanius minor* Gmelin) im nordöstlichen Harzvorland, seine Bestandsschwankungen und ihre vermutlichen Ursachen. Beitr. Vogelkd. 8: 353-360.
- HAENSEL, J. (1964): Zur Ernährungsbiologie des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor* Gm.) nach Gewölluntersuchungen im nördlichen Harzvorland. Beitr. Vogelkd. 10: 199-210.
- HAENSEL, J. (1968a): Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus* (L.)) an der Seeburg bei Gröningen. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 105-106.
- HAENSEL, J. (1968b): Rotkehlpieper (*Anthus cervinus* (Pall.)) an der Seeburg bei Gröningen. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 109-110.
- HAENSEL, J. (1986): Wiederfund eines sibirischen Gartenrotschwanzes, *Phoenicurus phoenicurus* (L.), in Berlin. Beitr. Vogelkd. 32: 336-337.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1974): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 2: 1-96.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1978): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 3: 97-198.

- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1981): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 4: 199-261.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1984): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 5: 263-358.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1987): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 6: 359-462.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1990): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 7: 463-538.
- HAENSEL, J. & H. KÖNIG (1991): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum IX, 1: 539-630.
- HAENSEL, J., K. HANDTKE, H. KÖNIG & R. SCHNEIDER (1964): Der Einfluß der Vernässungserscheinungen 1961 auf die Vogelwelt im Großen Bruch bei Oschersleben/Bode. Erneutes Brüten des Nachtreihers in Deutschland - Neuansiedlung von Reiher- und Tafelente, Lach- und Sturmmöwe und Trauerseeschwalbe. Beitr. Vogelkd. 9: 402-419.
- HAGEMANN, K. (1948): Der Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis* (Wolf)) bei Rathenow. Ornithol. Ber. 1: 143.
- HAGEMEIJER, W.J.M. & M.J. BLAIR (1997): The EBCC Atlas of European Breeding Birds – their Distribution and Abundance. London.
- HALBAUER, J. & H. SÄNGER (2009): Bemerkenswerte Beobachtung zu den Neozoen Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) und Waschbär (*Procyon lotor*). Acta ornithoecol. 6: 163-166.
- HAMPE, A., T. HEINICKE & A. HELBIG (1996): Erste Brut der Zitronenstelze *Motacilla citreola* in Deutschland. Limicola 10: 311-316.
- HAMPE, H. (1966): Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) bei Dessau. Beitr. Vogelk. 12: 118.
- HAMPE, H. (1968a): Schmarotzerraubmöwe auf der Elbe bei Aken. Apus 1: 197.
- HAMPE, H. (1968b): Rohrschwirl am Kühnauer See bei Dessau. Apus 1: 255.
- HAMPE, H. (1970): Das Vorkommen der Sperbergrasmücke – *Sylvia nisoria* (Bechst.) – im Dessauer Raum. Apus 2: 75-82.
- HAMPE, H. (1975a): Der Raubwürger im Dessauer Raum. Apus 3: 267-271.
- HAMPE, H. (1975b): Winterbeobachtung der Mönchsgrasmücke. Apus 3: 289-290.
- HAMPE, H. (1977): Novemberbeobachtung eines Rotrückenwürgers. Apus 4: 45.
- HAMPE, H. (1980): Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1966-1980. Apus 4: 145-162.
- HAMPE, H. (1982a): Eismöwe an den Fischteichen bei Vockerode. Apus 4: 282-283.
- HAMPE, H. (1982b): Zwergschnäpper und Schlagschwirl in der Dübener Heide. Apus 5: 51-52.
- HAMPE, H. (1985): Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1978-1984. Apus 6: 72-81.
- HAMPE, H. (1986a): Albinismus bei einem Hausrotschwanz. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 34.
- HAMPE, H. (1986b): Der Schlagschwirl bei Dessau. Apus 6: 135-141.
- HAMPE, H. (1988): Überwinterung einer Mönchsgrasmücke. Apus 7: 40-41.
- HAMPE, H. (1990a): Kanadagans-Graugans-Mischlinge bei Dessau. Apus 7: 265-266.
- HAMPE, H. (1992): Wasservogelzählungen im Raum Dessau 1984-1992. Apus 8: 109-118.
- HAMPE, H. (1999): Vom Mittelspecht im Raum Dessau. Mit Ergebnissen zur Siedlungsdichte im Vergleich zu Bunt- und Kleinspecht. Apus 10: 182-190.
- HAMPE, H. & G. PUHLMANN (1996): Bestandserfassung der Nachtigall 1995 im Stadtkreis Dessau und Teilen des Landkreises Anhalt-Zerbst. Apus 9: 176-179.
- HANDTKE, K. & G. MAUERSBERGER (1977): Die Ausbreitung des Kuhreihers, *Bubulcus ibis* (L.). Ann. Ornithol. 1: 3-78.
- HAUCHECORNE, F. (1928): Wiedereinbürgerung des Auerwildes in Anhalt. Dt. Jägerz. 90: 8.
- HEFT, H. (1958): Zur gegenwärtigen Verbreitung des Auerhuhns, *Tetrao urogallus major* Brehm, in der Deutschen Demokratischen Republik. Beitr. Vogelkd. 6: 172-186.
- HEFT, H. (1963): Zur gegenwärtigen Verbreitung des Birkhuhnes, *Lyrurus tetrrix*, in der Deutschen Demokratischen Republik. Beitr. Vogelkd. 9: 123-139.
- HEIDECKE, D. (1966): Laridenvorkommen im Gerlebogker Teichgebiet. Apus 1: 33-38.
- HEIDECKE, D. (1967): Zwei Purpurreiher-Beobachtungen im Gerlebogker Teichgebiet. Apus 1: 137-138.
- HEIDECKE, D. (1972): Die Siedlungsdichte der Brutvögel einer Pappelfflanzung im Gerlebogker Teichgebiet. Mitt. IG Avifauna DDR 5: 25-40.
- HEINE, F. (1877): *Monticola saxatilis* im Harze ausgebrütet. (Correspondenzblatt VII. VIII. des Naturwissenschaftlichen Vereines für die Provinz Sachsen und Thüringen in Halle). Z. ges. Naturwiss. 3. Folge, 1 (= 49): 100-103.
- HEINE, F. & A. REICHENOW (1890): Nomenclator Musei Heinei Ornithologici. Berlin.
- HEINEMANN, H. (1902): Die Pieper oder Spitzlerchen (*Anthus*). Gefied. Welt 31: 209-210, 217-218, 226.
- HEINICKE, T. & U. KÖPPEN (2007): Vogelzug in Ostdeutschland. I - Wasservögel. Teil 1. Ber. Vogelwarte Hiddensee 18, Sonderh.: 1-406.
- HEINICKE, T. & U. KÖPPEN (2013): Vogelzug in Ostdeutschland. I - Wasservögel. Teil 2. Ber. Vogelwarte Hiddensee 22, Sonderh.: 1-562.
- HEINROTH, O. (1921): Bericht über die Septembersitzung 1921. J. Ornithol. 69: 573-575.
- HELBIG, A.J. & D. FRANZ (1990): Einflug der Eiderente *Somateria mollissima* nach Mittel- und Südeuropa im Herbst 1988. Limicola 4: 229-249.
- HELLMANN, M. (1990): Der herbstliche Greifvogelzug am nördlichen Harzvorland. Abh. Ber. Mus. Heineanum 1(2): 1-11.
- HELLMANN, M. (1996): Untersuchungen an Schlafplätzen von Rotmilan und Schwarzmilan (*Milvus milvus*, *M. migrans*) im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 111-132.
- HELLMANN, M. (1999): Die Entwicklung des Rotmilans *Milvus milvus* vom Nahrungsgast zum Brutvogel in der Stadt Halberstadt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 17: 93-107.



- HELLMANN, M. (2002): Der Winterbestand des Rotmilans *Milvus milvus* 2000/01 und 2001/02 im Land Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 20: 57-80.
- HELLMANN, M. (2008): Schneesperling *Montifringilla nivalis* auf dem Brocken im Harz (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 26: 1-10.
- HELLMANN, M. (2011): Der Bestand des Rotmilans *Milvus milvus* im Spätherbst und Winter in einem Schlafgebiet im nördlichen Harzvorland von 1995 bis 2011. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 29: 27-47.
- HELLMANN, M. (2015): Die Vogelwelt auf dem Brocken im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 33: 1-96.
- HELLMANN, M., E. GÜNTHER & B. NICOLAI (1998): Die Vögel des Brockenurwaldes: Vorkommen, Siedlungsdichte, Avizönose. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 16: 103-136.
- HELLMANN, M. & M. WADEWITZ (2000): Die Vögel der Brockenkuppe. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 1-49.
- HELLMUTH, K. (1967): 14 Singvögel verhungerten in einem Eisenbahnabteil. Falke 14: 66.
- HELLWIG, T. (2004): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2003. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 33-39.
- HELLWIG, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 78-82.
- HELLWIG, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Feiner Bruch im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 83-85.
- HELLWIG, T. & S. SCHÖNE (2010): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten in den FFH-Gebieten Bürgerholz bei Burg und Güsener Niederwald im Jahre 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-71.
- HEMPEL, C. & W. REETZ (1957): Der Zug von Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) und Gartenrotschwanz (*Ph. phoenicurus*) nach Beringungsergebnissen. Vogelwarte 19: 97-119.
- HENNECKE (1956): Das letzte Auerwild des Oberharzes. Wild Hund 4: 66.
- HENNICKE, C. R. (1905): Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1. Gera-Untermhaus.
- HENNING, O., J. BRAUN & T. FRIEDRICH (2017): Erst- und Zweitnachweis des Buschrohrsängers *Acrocephalus dumetorum* in Sachsen-Anhalt 2014. Apus 22: 96-101.
- HERDAM, H. (1967): Siedlungsdichte der Vögel auf Kontrollflächen am Westrand der Magdeburger Börde. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 2: 49-66.
- HERING, J., E. FUCHS, O. BUŠEK & V. TEPLY (2003). Aktuelle Nachweise des Dreizehenspechts (*Picoides tridactylus*) im tschechischen Erzgebirge. Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9: 201-208.
- HERMS, K. (1981): Eiderenten auf der Elbe. Falke 28: 66..
- HERRMANN, C. & M. JUNGE (2013): Die Brutbestände der Küstenvögel in den Schutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns 2001-2012. Seevögel 34: 86-148.
- HERRMANN, P., T. RESE, T. RUF & R. WOLF (2006): Zur Siedlungsdichte von Mittel- und Buntspecht in einem Eichen-Eschen-Hainbuchenwald bei Dessau (Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“). Projektgruppe Spechte in der DO-G, Bericht der Tagung am Nationalpark Eifel in Schleiden-Gemünd vom 24.03 bis 26.03.2006: 66-70.
- HERTEL, F. (2003): Habitatnutzung und Nahrungserwerb von Buntspecht *Picoides major*, Mittelspecht *Picoides medius* und Kleiber *Sitta europaea* in bewirtschafteten und unbewirtschafteten Buchenwäldern des nordostdeutschen Tieflandes. Vogelwelt 124: 111-132.
- HERZ, E. (1983): Brauner Sichler bei Merseburg. Apus 5: 142.
- HEUER, J. (1998): Merlin erbeutet Bekassine. Apus 10: 93-94.
- HEYDER, R. (1952): Die Vögel des Landes Sachsen. Leipzig.
- HILDEBRANDT, G. (2001): Die Veröffentlichungen der Ornithologenfamilie Naumann in Zeitschriften. Köthen.
- HILDEBRANDT, G. (2007): Johann Andreas Naumanns „Naturgeschichte der Land- und Wasservögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder“ (1795-1817). Apus 13: 3-164.
- HILDEBRANDT, H. (1919): Beitrag zur Ornithologie Ostthüringens. Mitt. aus dem Osterlande N. F. 16: 289-371.
- HILDEBRANDT, H. (1927): Adolf Gueinzus als Vogelkundler. J. Ornithol. 75: 425-433.
- HILPRECHT, A. (1934): Nachtigall noch Anfang November auf dem Südfriedhof. Der Vogelfreund 3: 61.
- HILPRECHT, A. (1955): Der Rohrschwirl (*Locustella l. luscinioides* (Savi)) am Schollener See. J. Ornithol. 96: 421-422.
- HILPRECHT, A. (1965a): Nachtigall und Sprosser. Neue Brehm-Bücherei 143. 2. Aufl. Wittenberg-Lutherstadt.
- HILPRECHT, A. (1965b): Ringfunde des Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). Auspicium 2: 91-118.
- HINSCHKE, A. (1931a): *Locustella fluviatilis* (Wolf) am Goldberger See. Beitr. Avifauna Anhalts 2: 7.
- HINSCHKE, A. (1931b): Über das Brüten der Blauracke in künstlichen Nistgelegenheiten. Beitr. Avifauna Anhalts 2: 9.
- HINSCHKE, A. (1933): Total-Albinismus bei *Lanius c. collurio* L. Ornithol. Monatsber. 41: 186-187.
- HINSCHKE, A. (1935a): Merlinfalk badet in der Elbe. Beiträge zur Avifauna Anhalts 1932-1934: 21.
- HINSCHKE, A. (1935b): Zweimalige Beobachtung des Wasserpiepers (*Anthus s. spinoletta* [L.]) bei Wörlitz. Beitr. Avifauna Anhalts 4: 22-23.
- HINSCHKE, A. (1937): Wasserpieper, *Anthus s. spinoletta* (L.), bei Vockerode. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 13-14.
- HINSCHKE, A. (1966): Rotkehlpieper bei Bösewig. Apus 1: 96-97
- HINSCHKE, A. (1967a): Purpurreiher bei Wittenberg. Apus 1: 138-139.
- HINSCHKE, A. (1967b): Ein Trupp Eiderenten bei Elsnigk, Kr. Köthen. Apus 1: 142-143.
- HINSCHKE, A. (1968): Herbstbeobachtung des Rotkehlpiepers bei Wittenberg. Apus 1: 201.
- HINSCHKE, A. (1971): Der Greifvogelbestand der Elbaue zwischen Wittenberg und Dessau (Landschaftsschutzgebiet Mittlere Elbe). Apus 2: 171-177.
- HINSCHKE, A. & J. MATTHES (1961): Rothalsgänse im Mittelteelgebiet. Falke 8: 362.

- HIRSCHFELD, K. (1969): Zum Vorkommen des Rotkopf- und des Schwarzstirnwürgers im Kyffhäuser-Unstrut-Gebiet. Apus 1: 270-276.
- HOCHGREVE, W. (1929): Harzer Wildleben einst und jetzt. Harz 1929: 156-157.
- HOCKEY, P. (1995): Waders of Southern Africa. Cape Town.
- HOEBEL, W. (1982): Steppenkiebitz im Saalkreis. Apus 4: 281-282.
- HOEBEL, W. (1987a): Grasläufer am Helme-Stausee Berga-Kelbra. Apus 6: 230-231.
- HOEBEL, W. (1987b): Die Brutvögel ausgewählter Landschaftselemente im nordwestlichen Saalkreis. Apus 6: 249-255.
- HOEBEL, W. (2002): Blutspecht im Saalkreis. Apus 11: 210-211.
- HÖHNE, R. (1993): Bruten der Gebirgsstelze bei Halle. Apus 8: 189-190.
- HÖHNE, R. (1996): Ein Merlin im August. Apus 9: 185-186.
- HÖLZINGER, J. & U. MAHLER (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 2.3: Nichtsingvögel 3. Stuttgart.
- HOERNECKE, E. (2002): Großinsekten als Nahrung des Rotmilans. Apus 11: 209-210.
- HOFMANN, E. & G. RIEGER (1979): Ein Rauhfußkauz im Kreis Merseburg. Apus 4: 142-143.
- HOLTZBERG (1925): Eine Zwergohreule in Braunschweig. Ornithol. Monatsber. 33: 93.
- HOLZÄPFEL, R. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Landgraben-Dumme-Niederung in den Jahren 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 61-66.
- HOMANN, K. (1960): Flamingo bei Magdeburg. Mittbl. BFA Ornithol. Vogelsch. Magdeburg 1: 31.
- VON HOMEYER, E. (1849): Über die Gattung *Turdus*. Rhea 2: 144-159.
- VON HOMEYER, E. (1881): Ornithologische Briefe - Blätter der Erinnerungen an seine Freunde. Berlin.
- HORVÁTH, M., L. HARASZTHY, J. BAGYURA & A. KOVÁCS (2000/2001): Eastern Imperial Eagle (*Aquila heliaca*) populations in Europe. Aquila 107/108: 193-204.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1992): Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1994): Handbook of the Birds of the World. Vol. 2. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1996): Handbook of the Birds of the World. Vol. 3. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (1997): Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & J. SARGATAL (2002): Handbook of the Birds of the World. Vol. 7. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2004): Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2005): Handbook of the Birds of the World. Vol. 10. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2006): Handbook of the Birds of the World. Vol. 11. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2010): Handbook of the Birds of the World. Vol. 15. Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOT & D. A. CHRISTIE (2011): Handbook of the Birds of the World. Vol. 16. Barcelona.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR (2014): HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 1. Barcelona.
- DEL HOYO, J. & N. J. COLLAR (2016): HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World. Vol. 2. Barcelona.
- HRNCIRIK, H. (1968): Löffler (*Platalea leucorodia* L.) im Unterharz. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 100.
- HUBATSCH, K. (2008): Zweiter deutscher Nachweis eines Habichtsadlers *Aquila fasciata* in Nordrhein-Westfalen. Limicola 22: 177-180.
- HÜBNER, M. (1920): Fremde Gäste. Ornithol. Monatsschr. 45: 140-141.
- HÜPPOP, O., H.-G. BAUER, H. HAUPT, T. RYSLAVY, P. SÜDBECK & J. WAHL (2013): Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. Ber. Vogelsch. 49/50: 23-83.
- HULLEN, M. & A. KIRZINGER (2005): Artenbericht 2005. Nationalpark Harz.
- HUTH, J. & H.-M. OELERICH (2013): Zweiter Brutnachweis der Rotdrossel *Turdus iliacus* in Sachsen-Anhalt. Apus 18: 55-57.
- IfAÖ (2011): Spezielle Untersuchungen zur Ursachenermittlung von Bestandsveränderungen von Vogelarten in Sachsen-Anhalt: Analyse von populationsökologischen Parametern, Wanderbewegungen und Todesursachen von Vogelarten in Sachsen-Anhalt anhand von Beringungs- und Wiederfunddaten der Beringungszentrale Hiddensee. Unveröff. Ber. i. Auftr. des LAU.
- VON ILTEN, F. (1938): Wald und Jagd in der Letzlinger Heide. Beitr. Altmark. Heimatkd. 2: 141-171
- ISSA, N. & Y. MULLER (2015): Atlas des oiseaux de France métropolitaine – Nidification et présence hivernale. Paris.
- JACOBI, H. B. (1912): Die Verdrängung der Laubwälder durch Nadelwälder in Deutschland. Tübingen.
- JAWOROWSKI, L. (1966): Seidenreier bei Halle (Saale). Apus 1: 92.
- JENTZSCH, M. (1986): Vogelbeute von Waldkäuzen aus dem Südharz und vom Kyffhäuser. Apus 6: 161-166.
- JENTZSCH, M. (1989a): Beobachtungen und Fang an einem Schlafplatz von Bachstelzen (*Motacilla alba*) mit Untersuchungen zur Flügelänge. Ber. Vogelwarte Hiddensee 9: 57-62.
- JENTZSCH, M. (1989b): Zum Brutvorkommen von Wacholderdrossel und Raubwürger im Kreis Sangerhausen. Apus 7: 131-135.
- JENTZSCH, M. & F. OTTO (1988): Untersuchungen an Wintergewöllen des Raubwürgers (*Lanius excubitor* L.). Beitr. Vogelkd. 34: 93-100.
- DE JUANA, E. & E. GARCIA (2015): The Birds of the Iberian Peninsula. London.
- JURGEIT, S. (1996): Nordische Schafstelzen an der Kiesgrube Sollnitz. Apus 9: 191-192.
- JUST, A. (1832): Meine Beobachtungen über die am Eisleber Salzsee vorkommenden Vögel. Leipzig.
- KACZMAREK, U. (2009): Die Gebäudebrüter in Roßlau, Streetz und Natho. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 21: 19-31.
- KALLENBACH, G., U. PATZAK & F. JURGEIT (2006): Gebäudebrüterschutz in Sachsen-Anhalt am Beispiel der Stadt Dessau. Natursch. Land Sachs.-Anhalt 43: 21-29.

- KAMP, J. (2008): Der Steppenkiebitz – Forschung an einer weltweit bedrohten Art. Falke 55: 130-135.
- KAMP, J. (2010): Neues vom Steppenkiebitz. Falke 57: 113-115.
- KAMP, J. (2011): Zug des Steppenkiebitzes – live im Internet. Falke 58: 101-103.
- KANT, H. (1968b): Thorshühnchen am Süßen See und am Stausee Berga-Kelbra. Apus 1: 251-252.
- KANT, H. (1968d): Rohrschwirl am Süßen See. Apus 1: 254-255.
- KANT, H. (1974): Seltene Gänse im NSG Neolit-Teich (Kr. Köthen). Apus 3: 122-124.
- KANT, H. & K. LIEDEL (1987): Meerstrandläufer bei Halle. Apus 6: 227-230.
- KARLSTEDT, K. (1969): Ornithologische Beobachtungen 1967 am Helmestausee bei Berga-Kelbra. Apus 1: 257-269.
- KARLSTEDT, K. (1979): Die Bedeutung des Helmestausees für Wasservögel. Beitr. Vogelkd. 25: 75-80.
- KASPAREK, M. (1975): Zum Vorkommen des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* an der Westgrenze seines Brutareals. Anz. Ornithol. Ges. Bayern 14: 141-165.
- KATTHÖVER, T. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Altengraber Heide in den Jahren 2003/04. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 87-93.
- KATTHÖVER, T. (2005b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Nordöstlicher Unterharz im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 100-105.
- KEES, W. (1964): Thorswasserreiter (*Phalaropus fulicarius*) bei Halle/Saale. Ornithol. Mitt. 16: 107.
- KEIL, D. (1984): Die Vögel des Kreises Hettstedt. Apus 5: 149-208.
- KEIL, D. (1993/94a): Beobachtung des Braunen Sichlers, *Plegadis falcinellus* (L., 1766), an der Helme und an den Fischteichen Auleben im Landkreis Nordhausen. Thür. Ornithol. Mitt. 43/44: 69-70.
- KEIL, D. (1993/94b): Löffler, *Platalea leucorodia* L., 1758, an den Fischteichen Auleben und am Helmestausee Berga-Kelbra. Thür. Ornithol. Mitt. 43/44: 71-72.
- KEIL, D. (1996a): Steppenkiebitz, *Chettusia gregaria* (PALLAS 1771), an den Fischteichen Auleben und am Helmestausee. Thür. Ornithol. Mitt. 46: 55-57.
- KEIL, D. (1996b): Thorshühnchen am Helmestausee Berga-Kelbra. Apus 9: 187-188.
- KEIL, H. (1966): Blauracke bei Aken (Elbe). Apus 1: 95.
- KIESEWETTER, K. (1979): Beobachtung einer Eiablage beim Kuckuck. Falke 26: 61.
- KIPP, F.A. (1956): Die Gattung *Coturnix* – eine Invasionsvogelgruppe. Vogelwarte 18: 160-164.
- KIRMSE, M. (1955): Avifaunistische Beobachtungen am Süßen See bei Eisleben 1954/1955 unter Berücksichtigung der über dieses Gebiet vorliegenden früheren Befunde. Staatsexamensarb. Halle/S.
- KISS, J.B. & L. SZABÓ (2000): Der Weißschwanzkiebitz *Vanellus leucurus* als europäischer Brutvogel im Donaudelta. Limicola 14: 113-123.
- KLÄRE, K. (1933): Eichelhäherzug über Magdeburg. Der Vogelfreund 2: 56.
- KLAMMER, G. (1991): Untersuchungen im östlichen Saalkreis zum Bestand und zur Reproduktion von Greifvögeln und Eulen, die auf Elektrogittermasten horsten. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 79-83.
- KLAUS, S., H.-H. BERGMANN, C. MARTI, F. MÜLLER, O. A. VITOVIC & J. WIESNER (1990): Die Birkhühner: *Tetrao tetrix* und *T. mlokosiewiczzi*. Neue Brehm-Bücherei 397. Wittenberg-Lutherstadt.
- KLEBB, W. (1984): Die Vögel des Saale-Unstrut-Gebietes um Weißenfels und Naumburg. Apus 5: 209-304.
- KLEBB, W. (1986): Fasan und Rebhuhn im Bezirk Halle. Apus 6: 157-160.
- KLEINSCHMIDT, O. (1905) Zwei seltenere Funde am Mansfelder See bei Eisleben. Orn. Monatsber. 13: 64-65.
- KLEINSCHMIDT, O. (1907/08): *Erithacus Domesticus*. Berajah: 1-14.
- KLEINSCHMIDT, O. (1908): Fußnote zur Besprechung von Ule, Heimatkunde des Saalkreises. Falco 4: 48.
- KLEINSCHMIDT, O. (1912): Stichproben über den Vogelbestand des Kulturlandes. Falco 8: 2-15, 17-23, 25-40, 59-81.
- KLEINSCHMIDT, O. (1930): *Certhia Macronyx* (Kl.). Berajah, Zoographia infinita. Halle a. S.
- KLEINSCHMIDT, O. (1942): Fragen. Falco 38: 2.
- KNOCHENMUß, F. (1972): Spornammer und Seeadler an der Elbe bei Prettin. Falke 19: 283.
- KNOLLE, F. (1970): Wann war das Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*) im Oberharz heimisch? Vogelkd. Ber. Niedersachs. 2: 15-18.
- KNOLLE, F. & H. HECKENROTH (1985): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.4.
- KNOLLE, F., P. MANNES & H. ZANG (1973): Bestandsabnahme des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Westharz. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 5: 1-7.
- KNOPE, O. (1934): *Branta ruficollis* bei Aken. Ornithol. Monatsber. 42: 55.
- KNOPE, O. (1940): Zwei Bruten von Schwarzkehlchen bei Aken an der Elbe. Beitr. Avifauna Mitteltd. 4: 54-58.
- VON KNORRE, D., G. GRÜN, R. GÜNTHER & K. SCHMIDT (1986): Die Vogelwelt Thüringens. Jena.
- KNUST, W. (1936): Vogelkundliche Beobachtungen im Kreis Jerichow I. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 10: 4-7.
- KOCH, E. & B. ROHN (1987): Die Brutvögel Halle-Neustadts. Halle
- KÖCK, U. (1977): Das Vorkommen der Entenvögel (Anatidae) im Kreis Bitterfeld unter besonderer Berücksichtigung der ausgekohlten Braunkohlengruben. Hercynia N.F. 14: 447-463.
- KÖCK, U.-V. (2009): Mandarinente *Aix galericulata* 2007 und 2008 Brutvogel am Muldestausee bei Bitterfeld. Apus 14: 60-62.
- KÖHLER, E. (1992): Blauracke bei Taucha. Apus 8: 130.
- KÖHLER, E. (2011): Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis* an der Saale bei Weißenfels. Apus 16: 81-85.
- KÖNIG, C. (2015): Die Rothalsgans – ein immer häufigerer Wintergast. In: WAHL, J., R. DRÖSCHMEISTER, B. GERLACH, C. GRÜNEBERG, T. LANGGEMACH, S. TRAUTMANN & C. SUDFELDT (2015): Vögel in Deutschland – 2014. Münster: 62-63.
- KÖNIG, C., S. STÜBING & J. WAHL (2014): Vögel in Deutschland aktuell: Frühjahr 2014: Frühe Bruten, eilige Klappergrasmücken und viele Weißflügel-Seeschwalben. Falke 61: 24-29.



- KÖNIG, H. (1968): Die Vogelbestände einiger Bestandstypen des Kiefernforstes und der *Calluna*- und Grasheide in den Thekenbergen (Kreis Halberstadt) in den Jahren 1961-1963. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 67-98.
- KÖNIG, H. (1971): Rotrückenvürger (*Lanius collurio*) füttert adulten Rotkopfvürger (*Lanius senator*). Beitr. Vogelkd. 17: 184.
- KÖNIG, H. (1975): Avifaunistischer Jahresbericht 1973 für den Nordharz und das nördliche Harzvorland. Mitt. IG Avifauna DDR 7: 19-52.
- KÖNIG, H. & R. SCHNEIDER (1968a): Zwergschwan (*Cygnus bewickii* Yarr.) und Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus* Baill.) im Frühjahr 1961 im Großen Bruch bei Oschersleben. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 100-101.
- KÖNIG, H. & R. SCHNEIDER (1968b): Rohrschwirle (*Locustella luscinoides* [Savi]) im Jahre 1960 an der Seeburg bei Gröningen. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 110-111.
- KÖNIG, H. & R. SCHNEIDER (1969): Kurzschnabelgänse (*Anser brachyrhynchus* Baill.) in der Elbaue nördlich Magdeburg und südlich Tangermünde. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 4: 77-78.
- KÖNIGSTEDT, D. & B. NICOLAI (1972): Zur Kenntnis der Avifauna des Kreises Burg – I. Teil. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 7: 43-80.
- KÖNIGSTEDT, D. & D. ROBEL (1978): Zur Problematik ornithologischer Sichtnachweise. Cottbus.
- KOLBE, E. (1932): *Surnia ulula ulula* (L.) bei Klieken. Beitr. Avifauna Anhalts 3(2): 1.
- KOLBE, E. (1937a): Winterbeobachtungen an *Serinus canaria serinus* L. / Girlitz. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 11-12.
- KOLBE, E. (1937b): Die Gebirgsstelze, *Motacilla c. cinerea* Tunst., als Brutvogel bei D.-Roßlau. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 18-20.
- KOLBE, H. (1963): Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) auf der südlichen Flämingabflachung. Vogelwelt 84: 84-90.
- KOLBE, H. (1966): Phänologische und brutbiologische Daten der Gebirgsstelzen-Population der südlichen Flämingabdachung. Apus 1: 80-82.
- KOLBE, H. (1972): Purpurreiher am Deetzer Teich. Apus 2: 275.
- KOLBE, H. (1979): Zum Problem aus Gehegen entflogener oder im Freiflug gehaltener Anatiden in der DDR. Beitr. Vogelkd. 25: 33-37.
- KOLBE, H. (1999): Die Entenvögel der Welt. 5. Aufl. Stuttgart.
- KOLBE, H. (2001): Erstimporte, markante Punkte früherer Haltungen sowie Erstzuchten der Entenvögel in Deutschland bis zum Jahresende 2000. Zool. Garten N.F. 71: 243-265, 335-353.
- KOLBE, H. (2009): Raufußkauz *Aegolius funereus* und Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* als neue Brutvogelarten im Hohen Fläming. Apus 14: 3-13.
- KOLBE, H. (2014): Phänologische Daten von Vogelarten an einem Kleingewässer bei Zerbst/Anhalt. Apus 19: 31-70.
- KOLBE, H., R. SCHMIDT, E. SCHWARZE & T. HOFMANN (2012): Zur Geschichte der Vogelkunde in Dessau. Dessau.
- KOLBE, H., E. SCHWARZE & U. PATZAK (2018): Kommentierte Artenliste der Vögel im östlichen Anhalt für den Zeitraum 2006 bis 2016. Apus 23, Sonderh.: 3-179.
- KOLBE, M. (1965): Ringelgans und Rotkehlpieper auf dem Frühjahrsdurchzug im Mittelbegebiet. Falke 12: 211.
- KOLBE, U. & J. NEUMANN (1988): Der Nachtreiher in der DDR. Falke 35: 398-404.
- KOLBE, U. & J. NEUMANN (1991): Ein typischer Irrgast? Der Löffler in Ostdeutschland. Falke 38: 212-223.
- KOMISJA FAUNISTYCZNA (2015): Rare birds in Poland 2014. Ornithologica 56: 99-136.
- KOOP, B. & R. K. BERNDT (2014): Zweiter Brutvogelatlas. Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Bd. 7. Kiel.
- KOOP, D. (1967): Mittlere Raubmöwe bei Bernburg? Falke 14: 136.
- KOOP, D. (1968): Die Siedlungsdichte der Vögel einer Kontrollfläche im Auwald der unteren Saale. Mitt. IG Avifauna DDR 1: 23-27.
- KOOP, D. (1971): Ergebnisse mehrjähriger Greifvogel-Kartierung in einem Auwald der unteren Saale. Apus 2: 177-183.
- KOOP, D. & D. MIßBACH (1968): Weitere Rohrschwirl-Beobachtungen im Kr. Bernburg. Apus 1: 201.
- KOZLOVA, E. V. (1962): Ržankoobraznye. Podotrjad Kuliki. In: Fauna SSSR. Pticy. Tom II. Vyp. 1, čast' 3. Moskau, Leningrad.
- KRAUSE, S. (1987): Die Brutvögel eines Haldengehölzes bei Halle. Apus 6: 256.
- KRATZSCH, L. & U. PATZAK (2010): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Drömling im Jahr 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 39-53.
- KRATZSCH, L. & M. STUBBE (2003): Untersuchungen zum Höhlenbrüterbestand des Hakels im nördlichen Harzvorland. Tiere im Konflikt 8: 3-160.
- KREIBIG, K. (1951): Seltene Brutplätze von Hausrotschwanz, Gartenrotschwanz, Nachtigall und Amsel. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 46.
- KREIBIG, K. (1960): Ornithologische Beobachtungen an der Mittelbe 1959. Mittbl. BFA Ornithol. Vogelsch. Magdeburg 1: 4-11.
- KREIBIG, K. & H. VOIGT (1956): Übersommernder Bergfink, der brutverdächtig war. Mittbl. BFA Ornithol. Vogelsch. Magdeburg 6: 3.
- KRIEGS, J. O., F. BINDRICH & H. H. DÖRRIE (2012): Das Auftreten der Rötelschwalbe *Cecropis daurica* in Deutschland. Seltene Vögel Dt. 2010: 58-63.
- KRIETSCH, C. (1926): Hochbrut eines Grauammers. Beitr. Fortpflanzungsbiol. Vögel 2: 35-37.
- KRIETSCH, C. (1932): *Clamater glandarius*, Häherkuckuck bei Dessau! Mitt. Vogelwelt 31: 114.
- KRÜGER, A. (1925): Verzeichnis der Vogelsammlung des Museums für Natur- und Heimatkunde. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatk. Magdeburg 4: 203-229.
- KRÜGER, A. (2006): Ein Grasläufer in der Kiesgrube Burgliebenau. Apus 13: 139.
- KRÜGER, T. (2013): Das Vorkommen der Sperbereule *Surnia ulula* in Deutschland. Vogelwelt 134: 203-232.
- KRÜGER, T. & J. DIERSCHKE (2004): Das Vorkommen des Gelbbrauen-Laubsängers *Phylloscopus inornatus* in Deutschland. Vogelwelt 125: 41-52.
- KRÜGER, T. & J.-A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. Limicola 21: 185-217.
- KRÜGER, T., J. LUDWIG, S. PFÜTZKE & H. ZANG (2014): Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005-2008. Natursch. Landschaftspf. Niedersachs. 48: 1-552.

- KÜCHLER, W. (1934): Vom Zug des Eichelhäher in den Jahren 1932 und 1933. Vogelzug 5: 116-120.
- KÜHLHORN, F. (1935): Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. Mein Mansfelder Land, Beil. Eisleber Ztg. 10: 190-200, 233-236, 364-368.
- KÜHLHORN, F. (1937): Nestbautypen bei der Nachtigall (*Luscinia m. megarhynchos* Brehm). Ornithol. Monatsschr. 62: 152-157.
- KÜHLHORN, F. (1938): Die Vögel des Mansfelder See- und Gebirgskreises. 2. Nachtrag. Mein Mansfelder Land. Beil. Eisleber Ztg. 13: 105-124.
- KÜHLHORN, F. (1941): Vogelzugbeobachtungen und Beringungsergebnisse aus der Umgebung von Eisleben. Z. Naturwiss. 95: 197-212.
- KÜHN, H. (1973): Zur Winterbestandsdichte des Rebhuhns (*Perdix perdix*) im Großen Bruch bei Oschersleben. Mitt. IG Avifauna DDR 6: 67-71.
- KUHLIG, A. & K. HEINL (1983): Die Vogelwelt des Kreises Bitterfeld. Teil 1 u. Teil 2. Bitterfelder Heimatbl., Sonderh.: 1-48, 49-96.
- KUHLIG, A. & H. MAHLER (1993): Raubwürger brütet auf Gittermast. Apus 8: 238-239.
- KUHLIG, A. & M. RICHTER (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. Bitterfelder Heimatbl., Sonderh.: 1-204.
- KUHNERT, M. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Kliezter Heide im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 73-77.
- KUHS, K.-J. (2001): Zum Vorkommen der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*, C. L. Brehm, 1831) in der Umgebung von Wust. – Eine Bestandsaufnahme. Untere Havel, Naturkd. Ber. Altmark Prignitz 11: 14-18.
- KUMMER, J. (1962): Ein Baßtölpel, *Sula bassana*, in der Altmark. Beitr. Vogelkd. 7: 450-451.
- KUMMER, J. (1977): Wieder ein Baßtölpel, *Sula bassana*, in der Altmark. Beitr. Vogelkd. 23: 190-191.
- KUMMER, J. (1983): Beitrag zur Avifauna von Halle. Apus 5: 53-66.
- KUMMER, J. (1987a): Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*) bei Stendal gefunden. Beitr. Vogelkd. 33: 230-231.
- KUMMER, J. (1987c): Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) in Stendal. Beitr. Vogelkd. 33: 331.
- KUMMER, J. (1991): Ringelgänse, *Branta bernicla*, bei Tangermünde. Beitr. Vogelkd. 37: 189.
- KUMMER, J. (1992): Zur Avifauna von Halle. Beitr. Vogelkd. 38: 38-80.
- KUMMER, J. (1993a): Karmingimpel und Silbermöwe am Schollener See. Apus 8: 191.
- KUMMER, J. (1993b): Ornithologische Beobachtungen am Schollener See. Untere Havel, Naturkd. Ber. 2: 35-39.
- KUMMER, J., M. MÜLLER & H. STEIN (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 8: 31-77.
- KUPPE, K. (1968): Zu Vorkommen des Rotkopfwürgers – *Lanius senator* L. – im Gebiet des Süßen Sees bei Eisleben. Apus 1: 171-172.
- KURTHS, J. (1986): Die Vogelbestände des Westfriedhofes in Magdeburg. Apus 6: 172-176.
- LANDMANN, A. (1996): Der Hausrotschwanz. Vom Fels zum Wolkenkratzer – Evolutionsbiologie eines Gebirgsvogels. Wiesbaden.
- LANGE, U. (1978): Chile-Flamingo an der Elbe und im NSG „Gerlebogker Teiche“. Apus 4: 93-94.
- LANGLOTZ, W. (1964): Spornammer, *Calcarius lapponicus*, im Frühjahr an den Eggeröder Teichen am nördlichen Harzrand. Beitr. Vogelkd. 9: 456.
- LAPPO, E. G., P. S. TOMKOVIČ & E. E. SYROEČKOVSKIJ (2012): Atlas of breeding waders in the Russian Arctic. Moskau.
- LEHMANN, B., C. ENGELMANN, R. ZSCHÄPE, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2009): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Salziger See und Salztal im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 45-52.
- LIEBE, T. (1878): Die Brutvögel Ostthüringens und ihr Bestand. J. Ornithol. 26: 1-88.
- LIEBE, T. (1907): Nachtrag zu meinem vorjährigen Aufsatz über den Steinsperling (*Petronia petronia*). Ornithol. Monatsschr. 32: 398-410.
- LIEDEL, K. (1970a): Das Vorkommen der Wassertreter in den Bezirken Halle und Magdeburg. Apus 2: 54-67.
- LIEDEL, K. (1970b): Das Vorkommen des Sumpfläufers in den Bezirken Halle und Magdeburg. Apus 2: 140-147.
- LIEDEL, K. (1975): Der Mittelspecht – Brutvogel in der Nordwest-Altmark. Apus 3: 286-287.
- LINDNER, C. (1898): Kleinere ornithologische Mitteilungen. Ornithol. Monatsschr. 23: 226-227.
- LINDNER, C. (1902): Eichelhäher. Ornithol. Monatsschr. 27: 526-527.
- LINDNER, C. (1907): Nachtrag zu meinem vorjährigen Aufsatz über den deutschen Steinsperling (*Petronia petronia*). Ornithol. Monatsschr. 32: 398-410.
- LINDNER, C. (1909): *Turdus atrigularis*? Ornithol. Montasschr. 34: 208-209.
- LINDNER, C. (1919): Die Brutvögel von Naumburg, Weißenfels, Zeitz und Umgegend. Meist nach eigenen Beobachtungen zusammengestellt und allen Freunden der Natur als ein Beitrag zur Heimatkunde und zur Förderung der Heimatliebe und des Heimatschutzes gewidmet. 2. Aufl. Naumburg a. S.
- LINDNER, C. (1920): Einige Seltenheiten aus der Nähe von Naumburg a. S. in den letzten zwanzig Jahren. Ornithol. Monatsschr. 45: 188-189.
- LINDNER, F. (1886): Einzelnotizen aus meinem ornithologischen Taschenbuch I-III. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 11: 16-20, 39-41, 153-158.
- LINDNER, F. (1888): Ein Taucher erlegt bei Zeitz. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 13: 120.
- LINDNER, F. (1901): Grundstein zur Ornithologie des Fallsteingebietes. Ornithol. Monatsschr. 26: 33-56, 81-96, 117-132, 153-167.
- LINDNER, F. (1904): Zweiter Nachtrag zur Ornithologie des Fallsteingebietes, umfassend die Zeit vom 1. Juni 1901 bis zum 18. August 1904. Ornithol. Monatsschr. 29: 376-395, 422-439.
- LINDNER, F. (1912): Systematisches Verzeichnis aller bis Juli 1910 nachgewiesenen Vogelarten des Fallsteingebietes mit kurzer Charakteristik ihres Vorkommens. Osterwieck.
- LINDNER, F. (1919): Ornithologische Seltenheit. Quedlinburger Ztg. Nr. 255 v. 08. November 1919.
- LINDNER, M. & H. KOLBE (2013): 528 Euro für das Fällen eines Höhlenbaumes mit Rauhfußkauzbrut. Eulen-Rundblick 63: 72.

- LIPPERT, W. (1964): Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) bei Tangermünde. Beitr. Vogelkd. 9: 377.
- LIPPERT, W. (1966): Spornammerbeobachtung aus der Elbaue bei Tangermünde. Falke 13: 138.
- LIPPERT, W. (1967): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde. Teil I. Beitr. Vogelkd. 13: 47-71.
- LIPPERT, W. (1973): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde. Teil I. Nonpasseres, 2. Fortsetzung. Beitr. Vogelkd. 19: 179-186.
- LIPPERT, W. (1974): Rallenreiher, *Ardeola ralloides*, südlich Tangermünde/Elbe beobachtet. Beitr. Vogelkd. 20: 247.
- LIPPERT, W. (1977): Ornithologisches Beobachtungsmaterial aus der Elbaue bei Tangermünde (Schluß). Beitr. Vogelkd. 23: 249-264.
- LIPPERT, W. (2007): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Mahlpfuhler Fenn im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 83-88.
- LIPPERT, W. & R. AUDORF (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Aland-Elbe-Niederung im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 54-60.
- LÖSCH, W. (1969): Ein Kuckucksei wird verlegt. Falke 16: 242.
- LOOSE, J. (1968): Purpurreiher am Schelldorfer See. Apus 1: 250-251.
- LUDWIGS, J.-D. (2009): Raumnutzung der Wachtel *Coturnix coturnix* in der Agrarlandschaft. Vortrag zur 19. Jahrestagung des Vereins Thüringer Ornithologen in Mühlberg.
- LÜDEKE, J. C. (1774): Versuch einer Naturgeschichte der Altenmarck. Berlin.
- LUGE, J. (1993): Studien an einer Flußregenpfeiferpopulation in einem künstlich geschaffenen Lebensraum. Apus 8: 151-154.
- LUGE, J. (1995): Die Siedlungsdichte der Vögel eines rekultivierten Kiesabbaugebietes. Apus 9: 114-118.
- LUGE, J. (1998): Kuhreiher im Kreis Köthen. Apus 10: 87-88.
- LUGE, J. (2002): Neuntöter und Sperbergrasmücke als unmittelbare Brutnachbarn. Apus 11: 278-279.
- LUGE, J. (2004): Beobachtungen an einem Neuntöttervorkommen im Kreis Köthen. Apus 12: 176-189.
- LUNK, S. (2013): Ein Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* an Bord eines Segelkutters in der Barentssee – der nördlichste (Weißrücken-)Specht der Welt? Vogelwelt 134: 143-147.
- LUTHER, D. (1955): Der Schmalschnäblige Wassertreter – Herbstdurchzügler in Anhalt. Falke 2: 105.
- LUTHER, D. (1972): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg. (Harz) I. Apus 2: 218-226.
- LUTHER, D. (1978): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg/Harz (II). Apus 4: 67-70.
- LUTHER, D. & D. LUTHER (1986): Ornithologische Beobachtungen um Straßberg (III). Apus 6: 110-118.
- MÄDLow, W. & C. MAYR (1996): Die Bestandsentwicklung ausgewählter gefährdeter Vogelarten in Deutschland 1990-1994. Vogelwelt 117: 249-260.
- MÄDLow, W. & N. MODEL (2000): Vorkommen und Bestand seltener Brutvogelarten in Deutschland 1995/96. Vogelwelt 121: 189-205.
- MAKATSCH, W. (1955): Der Brutparasitismus in der Vogelwelt. Radebeul.
- MAMMEN, K., U. MAMMEN, G. DORNBUSCH & S. FISCHER (2013): Die Europäischen Vogelschutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 10: 1-271.
- MAMMEN, U. (1995): Die Situation der Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes) in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1994. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 13: 101-114.
- MAMMEN, U. & K. MAMMEN (2012): Ergebnisse der landesweiten Erfassung von Grauspecht (*Picus canus*), Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) und Schwarzspecht (*Dryocopus martius*) im Jahr 2011 in Sachsen-Anhalt). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt H. 1: 61-70.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1995): Alterseinschätzung und Brutbeginn des Rotmilans (*Milvus milvus*). Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 91-98.
- MAMMEN, U. & M. STUBBE (1996): Der Greifvogelhorst in seiner populationsökologischen Bedeutung. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 3: 87-111.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESETARITZ (2007a): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Fallsteingebiet nördlich Osterwieck im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 89-93.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN & A. RESETARITZ (2007b): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Huy nördlich von Halberstadt im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 95-100.
- MAMMEN, U., K. MAMMEN, N. WUTTKE & A. RESETARITZ (2012): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im FFH-Gebiet Buntsandstein- und Gipskarstlandschaft bei Questenberg im Südharz im Jahr 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt H. 1: 37-45.
- MAMMEN, U., B. NICOLAI, J. BÖHNER, K. MAMMEN, J. WEHRMANN, S. FISCHER & G. DORNBUSCH (2014): Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 1-160.
- MARSHALL, W. (1899): Die Tierwelt des Harzes. In: HOFFMANN, H.: Der Harz, S. 39-60, Leipzig.
- MARTINEZ, N., B. NICOLAI & V. VAN DER SPEK (2019): Redstart hybrids in Europe and North Africa. Brit. Birds 112: 190-210.
- MAUMARY, L., L. VALOTON & P. KNAUS (2008): Die Vögel der Schweiz. Montmollin.
- MAYR, E. (1926): Die Ausbreitung des Girlitz. J. Ornithol. 74: 571-671.
- MEBS, T. (2001): Aktuelle Verbreitung und Arealerweiterung des Sperlingskauzes (*Glucidium passerinum*) in Deutschland. Kauzbrief 14: 4-12.
- MEBS, T. (2008): Zur aktuellen Situation des Habichtskauzes *Strix uralensis* in Europa. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 40: 241-246.
- MEBS, T. & G. NICKLAUS (2014): Die Brutvorkommen der Zwergohreule *Otus scops* in Deutschland. Ornithol. Anz. 53: 94-104.
- MEIER, H. (1969): Neuntöter erbeutet Braunkehlchen. Falke 16: 390.
- MEIER-PEITHMANN, W. & W. PLINZ (1996): Avifaunistischer Sammelbericht 1989-1993 für den Kreis Lüchow-Dannenberg. Lüchow-Dannengerger Ornithol. Jber. 14: 104-212.
- MEISSNER, S. (1962): Zweite Flamingobeobachtung bei Merseburg. Merseburger Land 1962: 245.
- MEISSNER, S. (1963): Seltene Ornithologische Beobachtungen im Winter 1962/63. Merseburger Land 1963: 123-128.



- MENZEL, F. (1909): Die Vogelwelt von Helmstedt (Herzogtum Braunschweig) und Umgebung. Ornithol. Jb. 20: 85-117.
- MENZEL, F. (1917): Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirkes Harzburg. Ornithol. Jb. 28: 61-80.
- MENZEL, F. (1927): Die Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirks Calvörde. Ornithol. Monatsschr. 52: 138-147, 153-164.
- MENZEL, R. (1933a): Nachtrag zur „Vogelwelt des Amtsgerichtsbezirkes Calvörde“ nebst Verzeichnis der im Forstamtgarten beobachteten Vogelarten. Ornithol. Monatsschr. 58: 7-16.
- MENZEL, F. (1933b): Bemerkungen zur Vogelwelt des Freistaates Braunschweig und der angrenzenden Gebiete. Ornithol. Monatsschr. 58: 153-178, 186-189.
- MERTENS, A. (1890): Klima, Thier- und Pflanzenleben der südlichen Altmark. Jber. Abh. Naturwiss. Ver. Magdeburg.
- MERTENS, A. (1909a): Der braune Sichler *Plegadis autumnalis* Hasselqu. bei Magdeburg. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatkd. Magdeburg 2: 100.
- MERTENS, A. (1909b): Ein Rosenstar *Pastor roseus* L. in der Altmark. Abh. Ber. Mus. Nat. Heimatkd. Magdeburg 2: 100.
- MEYER, A. B. (1889): Die Wanderungen des Rosenstaars (*Pastor roseus* L.) nach Europa, speciell die Wanderung im Jahre 1889. In: MEYER & HELM: IV. Jber. (1888). Orn. Beobachtungsstationen Sachsen, Dresden, Anhang 1: 136-147.
- MICHALCZUK, J. (2014): Expansion of the Syrian Woodpecker *Dendrocopos syriacus* in Europe and Western Asia. Ornithologica 55: 149-161.
- MICHALCZUK, J., A. D. McDEVITT, T., D. MAZGAJSKI, T. FIGARSKI, M. ILIEVA, M. BUJOCZEK, P. MALCZYK & Ł. KAJTOCH (2014): Test of multiple molecular markers for the identification of Great Spotted and Syrian Woodpeckers and their hybrids. J. Ornithol. 155: 591-600.
- MIKKOLA, H. (2013): Owls of the World: A Photographic Guide. 2. Aufl. London.
- MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ DES LANDES BRANDENBURG (MLUV) (2009): Die Hainbuche im nordostdeutschen Tiefland – Wuchsverhalten und Bewirtschaftungshinweise. Eberswalder Forstl. Schr.R. Bd. 41: 1-129.
- MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG DES LANDES BRANDENBURG (MLUR) (2002): Artenschutzprogramm Auerhuhn. Potsdam.
- MISSBACH, D. (1975b): Fische als Beute des Raubwürgers. Falke 22: 314-315.
- MLÍKOVSKÝ, J. (2010): On historical records of *Turdus pallidus* and *Turdus obscurus* (Aves: Turdidae) from the Czech Republic. Sylvia 46: 149-156.
- MÖCKEL, R. (1996): Arealveränderungen des Raufußkauzes *Aegolius funereus* im Osten Deutschlands. Vogelwelt: 117: 57-66.
- MOLLMANN, C. & J. DIERSCHKE (2018): Eine Rostflügeldrossel *Turdus eunomus* auf Helgoland. Vogelkdl. Jber. Helgoland 28: 107-111.
- MOOIJ, J. H. & T. HEINICKE (2008.): Status, distributon and numbers of Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus* in Germany. Vogelwelt 129: 281-292.
- MRLIK, V. & B. LANDSFELD (2002): The occurrence of Long-legged Buzzard (*Buteo rufinus*) in parts of Central Europe during 1980-1998 and possible factors for its recent expansion. Egretta 45: 104-114.
- MÜHLMANN, K. (1927a): *Rissa tridactyla* bei Vehlitz gefunden. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 5.
- MÜHLMANN, K.-H. (1927b): *Stercorarius pomarinus* (Tem.) bei Großbrodensleben erlegt. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 6.
- MÜHLMANN, K.-H. (1927c): Zum Vorkommen des Mornellregenpfeifers bei Magdeburg zur Zugzeit. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 26.
- MÜHLMANN, K.-H. (1927d): *Stercorarius pomarinus* in der Provinz Sachsen. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 27.
- MÜHLMANN, K.-H. (1932): Beobachtungen aus unserem Hüttenbuch. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 6: 6.
- MÜHLMANN, K.-H. (1934): Bericht IV der Zweigberingungsstelle Magdeburg der Vogelwarte Helgoland. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 8: 25-28.
- MÜLLER, A. (1880a): Meine während der Brutzeit gemachten ornithologischen Beobachtungen am Salzigem See bei Eisleben. Zool. Garten 21: 20-24, 48-53, 82-86.
- Müller, A. (1880b): *Turdus atrigularis* wiederholt in Deutschland gefangen. Ornithol. Centralbl. 5: 12.
- MÜLLER, A. (1928): Brutvögel des Oberharzes und ihre vertikale Verbreitung. Verh. Ornithol. Ges. Bayern 18: 160-164.
- MÜLLER, H. (1969): Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus* [L.]) bei Hoym im Nordharzvorland. Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum 4: 80-81.
- MÜLLER, H. (1972): Schafstelze im November und Dezember in Tangermünde. Falke 19: 174.
- MÜLLER, H. (1987): Graubruststrandläufer 1982 bei Tangermünde. Apus 6: 236-237.
- MÜLLER, H.-H. (1977): Subfossile Pelikanfunde aus dem Gebiet der DDR. Hercynia N.F. 14: 352-354.
- MÜLLER, H.J. (1953): Schwarzstirn- und Rotkopfwürger im nordöstlichen Harzvorland. Beitr. Vogelkdl. 3: 138-145.
- MÜLLER, J. (1966a): Beobachtungen an Schwarzstirnwürgern (*Lanius minor* Gm.) und Rotkopfwürgern (*Lanius s. senator* L.) aus dem Bördegebiet. Beitr. Vogelkdl. 11: 331-333.
- MÜLLER, J. (1966b): Aus der Vogelsammlung des Kreisheimatmuseums Staßfurt. Beitr. Vogelkdl. 12: 125-126.
- MÜLLER, J. (1968): Purpurreiher bei Unseburg und Löderburg. Apus 1: 250.
- MÜLLER, J. (1972): Zum Verhalten der Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*). Beitr. Vogelkdl. 18: 449-450.
- MÜLLER, J. (1997): Lausfliegen-Funde von heimischen Vögeln, nebst Bemerkungen zur deutschen Checkliste Diptera: Hippoboscidae. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 15: 115-132.
- MÜLLER, J. (2005): Erstnachweis eines Buschspotters *Hippolais caligata* in Sachsen-Anhalt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 1-10.
- MÜLLER, S. (1966): Nachweis eines Eissturmvogel in Brandenburg. Falke 13: 331.
- MÜLLER, S. (1978): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Mecklenburg. Jahresbericht für 1976. Ornithol. Rundbr. Mecklenburg N. F. 19: 39-69.
- VON MÜNCHHAUSEN, B. (1857): Notizen. Naumannia 7(2): 83-84.
- NACHTIGALL, W. (1999): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus* Linné, 1758) im nordöstlichen Harzvorland. Diplomarb. Univ. Halle-Wittenberg.

- NACHTIGALL, W. & W. GLEICHNER (2005): Mischbruten zwischen Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* – ein weiterer Fall aus Sachsen. *Limicola* 19: 180-194.
- NACHTIGALL, W., M. STUBBE & S. HERRMANN (2003): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus*) im Winter – eine telemetrische Studie im Nordharzvorland. *J. Ornithol.* 144: 284–294.
- VON NATHUSIUS, G. (1911): Die Vogelarten des Kreises Neuhaldensleben. Aus den Protokollen des Aller-Vereins 1910. Neuhaldensleben.
- VON NATHUSIUS, G. (1925): Die Vogelarten des Kreises Neuhaldensleben Reg.-Bez. Magdeburg. *J. Ornithol.* 73: 539-547.
- VON NATHUSIUS, G. (1926): *Stercorarius pomarinus* in der Provinz Sachsen. *Ornithol. Monatsber.* 34: 20.
- VON NATHUSIUS, G. (1929): Seltenheiten vom Jahr 1928 aus dem Bezirk Magdeburg. *Ornithol. Monatsber.* 37: 45.
- VON NATHUSIUS, G. (1931): Beobachtungen und Seltenheiten 1930/31. *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 5(2): 35-36.
- VON NATHUSIUS, G. (1939): Meine Vogelsammlung mit Beobachtungen aus den Jahren 1904-1939. *Beitr. Avifauna Mitteltd.* 3, Sonderh.: 1-26.
- NAUMANN, J. A. (1789): Der Vogelsteller oder die Kunst allerley Arten von Vögeln sowohl ohne als auch auf dem Vogelherd bequem und in Menge zu fangen nebst den dahin gehörigen Kupfern und einer Naturgeschichte der bekannten und neuentdeckten Vögel. Leipzig.
- NAUMANN, J. A. (1799a): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 2. Köthen.
- NAUMANN, J. A. (1799b): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 3. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1803): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. Bd. 4.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1804): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 1. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1805): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 2. Nachtrag. Köthen. .
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1808): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 3. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1811): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 4. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. A. & J. F. NAUMANN (1817): Naturgeschichte der Land- und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschlands und angränzender Länder. 8. Nachtrag. Köthen.
- NAUMANN, J. F. (1820): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 1. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1822): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 2. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1823): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 3. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1824): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 4. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1826a): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 5. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1826b): Unerhörtes Vorkommen eines ausländischen Vogels in der Mitte von Deutschland. *Isis (Oken)* 19: 520-521.
- NAUMANN, J. F. (1833): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 6. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1834): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 7. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1836): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 8. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1838): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 9. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1840): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 10. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1842): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 11. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1844): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 12. Leipzig.
- NAUMANN, J. F. (1849a): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in Anhalt. *Naumannia* 1(1): 1-11.
- NAUMANN, J. F. (1849b): Vorläufige Anzeige der seit c. 30 und einigen Jahren in Deutschland vorgekommenen oder übersehenen fremden Drossel-Arten. *Naumannia* 1(4): 1-9.
- NAUMANN, J. F. (1850): Das Vorkommen seltener europäischer Vögel in unserm Anhalt. *Naumannia* 1(2): 1-23.
- NAUMANN, J. F. (1852): Notizen. *Naumannia* 2(1): 104-106.
- NAUMANN, J. F. (1854): Reminiscenzen über stufenweise Entwicklung der vaterländischen Ornithologie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. *Naumannia* 4: 149-160.
- NAUMANN, J. F. (1860): Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Bd. 13.: Nachträge und Verbesserungen. Stuttgart.
- NEHRING, A. (1878): Die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln nebst Spuren der vorgeschichtlichen Menschen. *Arch. Anthropol.* 10: 359-398.
- NEHRING, S. & S. SKOWRONEK (2017): Die invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 – Erste Fortschreibung. *BfN-Skripten* 471: 1-176.
- NEHRKORN, A. (1894): *Serinus hortulanus* im Harz. *Ornithol. Monatsber.* 2: 146.
- NEUBAUER, W. (1962): Brut der Kolbenente am Krakower See. *Falke* 9: 80.
- NEUBAUER, W. (1971): Zum Vorkommen der Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in der DDR. *Beitr. Vogelkd.* 17: 331-338.
- NEUBAUER, W. (1983): Der Einflug der Kanadagans im Winter 1978/79 ins Binnenland der DDR. *Falke* 30: 378-383.
- NEUBAUER, R. (1908): Die Fauna Krosigks. Göttingen.
- NEUMANN, J. (1986): Die Brutnachweise der Zwergtrappe, *Tetrax tetrax* L., in der Mark Brandenburg. *Beitr. Vogelkd.* 36: 62.
- NEUMANN, J. & U. KOLBE (1988): Der Eissturmvogel in der DDR. *Falke* 35: 14-17.
- NEUSCHULZ, F. (1988): Zur Synökie von Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* (Bechst., 1795) und Neuntöter *Lanius collurio* (L., 1758). Ergebnisse einer populationsbiologischen Studie. *Lüchow-Dannenberg Ornithol. Jber.* 11: 1-234.
- NICOLAI, B. (1972): Der Vogelbestand einer Kontrollfläche in der Elbniederung westlich von Burg bei Magdeburg. *Mitt. IG Avifauna DDR* 5: 69-82.

- NICOLAI, B. (1988a): Kartierung bestandsgefährdeter Brutvogelarten im Bezirk Magdeburg. Hinweise (4). Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artenschutz Magdeburg 11(2): 1-4.
- NICOLAI, B. (1988b): Revierbesetzungsfolge beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Acta Ornithocol. 1: 367-377.
- NICOLAI, B. (1989): Ergebnisse der Bestandserfassung des Rebhuhns im Bezirk Magdeburg im Jahre 1988. Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artenschutz Magdeburg 12 (2): 1-4.
- NICOLAI, B. (1992a): Quantitative Untersuchungen zum Polymorphismus der Gefiederfärbung beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*). Anz. Ver. Thür. Ornithol. 1: 65-72.
- NICOLAI, B. (1992b): Brutbiologische Angaben für den Hausrotschwanz in Sachsen-Anhalt. Apus 8: 66-77.
- NICOLAI, B. (1992c): Gesangsdialekt beim Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*): Tradierung und Gesangslernen. Rudolstädter nat.hist. Schr. 4: 83-90.
- NICOLAI, B. (1992d): Untersuchungen zur Nahrung und zum Nahrungserwerb des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 10: 75-105.
- NICOLAI, B. (1993a): Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands. Jena & Stuttgart.
- NICOLAI, B. (1993b): Siedlungsdichte der Greifvögel (Accipitridae) im nördlichen Harzvorland unter besonderer Berücksichtigung des Rotmilans (*Milvus milvus*). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 11-25.
- NICOLAI, B. (1995): Bestand und Bestandsentwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus*) in Ostdeutschland. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 11-19.
- NICOLAI, B. (1997): Vögel (Aves) in: Arten- und Biotopschutzprogramm Sachsen-Anhalt, Landschaftsraum Harz. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 233-243.
- NICOLAI, B. (1998): Zur Nahrung der letzten deutschen Blauracke *Coracias garrulus*, Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 16: 45-47.
- NICOLAI, B. (2001): Über das Füttern fremder Jungvögel beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Anz. Ver. Thür. Ornithol. 4: 173-177.
- NICOLAI, B. (2002): Ökologie und Brutbiologie des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros gibraltariensis* (S. G. GMELIN 1774) in Halberstadt. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 20: 3-55.
- NICOLAI, B. (2006): Rotmilan *Milvus milvus* und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland. Situation 2006. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 24: 1-34.
- NICOLAI, B. (2011): Rotmilan *Milvus milvus* und andere Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland: Situation 2011. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 29: 1-26.
- NICOLAI, B. (2012): Phänologie der Frühjahrsankunft beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* in Mitteldeutschland in den letzten 200 Jahren. Ökol. Vögel 34: 507-524.
- NICOLAI, B. & M. BIRTH (1975): Sperbereule bei Burg beobachtet. Apus 3: 284-285.
- NICOLAI, B. & W. BÖHM (1997): Zur aktuellen Situation der Greifvögel (Accipitridae) insbesondere des Rotmilans *Milvus milvus* im nordöstlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 15: 73-87.
- NICOLAI, B. & W. BÖHM (1999): Zur Bestandsentwicklung des Rotmilans *Milvus milvus* im nördlichen Harzvorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 17: 109-112.
- NICOLAI, B., E. BRIESEMEISTER, H. STEIN & K. J. SEELIG (1982): Avifaunistische Übersicht über die Passeriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises "Mittelelbe – Börde". Magdeburg.
- NICOLAI, B., E. GÜNTHER & M. HELLMANN (2009): Artenschutz beim Rotmilan. Zur aktuellen Situation in seinem Welt-Verbreitungszentrum Deutschland/Sachsen-Anhalt. Natursch. Landschaftspl. 41: 69-76.
- NICOLAI, B., E. GÜNTHER & E. KARTHEUSER (2012): Rotmilane *Milvus milvus* als Opfer eines Hagelschlages. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 123-126.
- NICOLAI, B. & M. HELLMANN (2008): Der Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* im Harz und sein Vorkommen auf der Brockenkuppe. Vogelkdl. Ber. Niedersachs. 40: 269-275.
- NICOLAI, B. & U. MAMMEN (2009): Dichtezentrum des Rotmilans *Milvus milvus* im Nordharzvorland – Bestandsentwicklung, Ursachen und Aussichten. Inform.dienst Natursch. Niedersachs. 29(3): 144-150.
- NICOLAI, B., U. MAMMEN & M. KOLBE (2017): Long-term changes in population and habitat selection of Red Kite in the region with the highest population density. Vogelwelt 137: 194-197.
- NICOLAI, B., F.-U. SCHMIDT & C. SCHMIDT (1996): Gefiedermerkmale, Maße und Alterskennzeichen des Hausrotschwanzes *Phoenicurus ochruros*. Limicola 10: 1-41.
- NICOLAI, B. & M. WADEWITZ (2003): Die Brutvögel von Halberstadt. Ergebnisse einer Brutvogelkartierung 1998 bis 2002. Abh. Ber. Mus. Heineanum 6, Sonderh.: 1-187.
- NICOLAI, B. & F. WEIHE (2001): Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland – Situation 2001. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 33-47.
- NIELITZ, U. & B. NICOLAI (2013): Außergewöhnlicher Fall einer ‚Doppelbrut‘ beim Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 31: 65-72.
- NIETHAMMER, G. (1938): Handbuch der deutschen Vogelkunde. Bd. 2. Leipzig.
- NIETHAMMER, G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa – Ergebnisse und Aussichten. Hamburg.
- NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGENGESellschaft (NWO) (2002): Die Vögel Westfalens. Ein Atlas der Brutvögel von 1989 bis 1994. Beitr. Avifauna Nordrhein-Westfalens, Bd. 37.
- NOTHDURFT, W. (1960): Die Vogelwelt von Buntenbock. Unser Harz, H. 3: 8-10.
- ÖBERBECK, H. (1906): Brutverhältnisse in der Saale-Niederung bei Bernburg. Ornithol. Monatsber. 14: 121-127.
- OLEJNIK, O. (2012): Beobachtungen zur Rufaktivität und zum Habitat der Wachtel *Coturnix coturnix* aus der nördlichen Altmark. Ornithol. Mitt. 64: 329-332.
- OLSEN, K. M. & L. JONSSON (1989): Die Bestimmung der Raubmöwen Stercorariidae. Limicola 3: 93-136.
- OLSEN, K. M. & H. LARSSON (1997): Skuas and jaegers: a guide to the skuas and jaegers of the world. London.
- ORNITHOLOGISCHER ARBEITSKREIS (OAK) NORDHARZ UND VORLAND (1972): Avifaunistischer Jahresbericht 1971 für den Nordharz und das nördliche Vorland. Naturkdl. Jber. Mus. Heineanum 7: 81-108.



- ORNITHOLOGISCHER ARBEITSKREIS (OAK) NORDHARZ UND VORLAND (1973): Avifaunistischer Jahresbericht 1972 für den Nordharz und das nördliche Vorland. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 8: 79-105.
- ORTLIEB, R. (1972): Eichelhäherbrut im Industriegelände. Falke 19: 426.
- ORTLIEB, R. (1973): Über das Führen der Jungen bei der Wachtel. Falke 20: 318.
- ORTLIEB, R. (1974): Bruten des Raubwürgers im Westteil des Kreises Eisleben. Apus 3: 108-113.
- ORTLIEB, R. (1980): Der Rotmilan. Neue Brehm-Bücherei 532. Wittenberg-Lutherstadt.
- ORTLIEB, R. (1982): Zur Bestandsentwicklung des Raubwürgers im Westteil des Kreises Eisleben. Apus 5: 36-38.
- ORTLIEB, R. (1985): Zum Brüten des Eichelhähers in Ortschaften. Apus 6: 37-38.
- ORTLIEB, R. (1988): Kaiseradlerbeobachtung im Bezirk Halle. Falke 35: 230-231.
- ORTLIEB, R. (2014): Erfolgreiche Brut einer Mandarinente *Aix galericulata* in einem Wohnhaus. Apus 19: 71-72.
- OSTERWALD, D. (1951): Raubwürger als Stadtgast. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 45.
- OTTO, A. (1901): Katalog der Vogelsammlung des Gymnasiums zu Eisleben, nebst einer Übersicht über die in der Grafschaft Mansfeld beobachteten Vögel. Jber. Königl. Gymnasiums Eisleben 1901, Beil.: 1-55.
- OTTO, W. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Untere Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 44-53.
- OTTO, W. (2017): Durchzug und Dismigration im Ausland besender Greifvögel in Brandenburg. Otis 24: 75-83.
- PÄSSLER, W. (1850a): Beobachtungen über Abweichungen einiger Vögel in Bezug auf den Bau des Nestes und die Größe und Farbzeichnung der Eier. Naumannia 1(2): 38-50.
- PÄSSLER, W. (1850b): Beobachtungen über einige inländische Vögel. Naumannia 1 (3): 56-61.
- PÄSSLER, W. (1854): Ornithologische Aphorismen. J. Ornithol. 2: 180-182.
- PÄSSLER, W. (1856): Die Brutvögel Anhalts. J. Ornithol. 4: 34-68.
- PÄSSLER, W. (1857): Beobachtung über ziehende und brütende Vögel in Anhalt, im Frühjahr 1857. J. Ornithol. 5: 399-415.
- PÄSSLER, W. (1859): Etwas Ornithologisches aus Anhalt vom Jahre 1859. J. Ornithol. 7: 318-319.
- PÄSSLER, W. (1861): Beobachtungen in den Jahren 1859 und 1860 in der Umgegend von Mühlstedt und Rosslau, in Anhalt. J. Ornithol. 9: 433-439.
- PÄSSLER, W. (1867): Einige Beobachtungen aus dem Jahre 1866. J. Ornithol. 15: 56-64.
- PANNACH, G. (2001): Der Schwarzschnabel *Cygnus atratus* in Europa. Teil 5: Nachweise aus Brandenburg (Berlin), Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ornithol. Mitt. 53: 269-276.
- PANOV, E. N. (1983): Die Würger der nördlichen Paläarktis. Neue Brehm-Bücherei 557. Wittenberg-Lutherstadt.
- PARKIN, D. T. & A. G. KNOX (2010): The Status of Birds in Britain and Ireland. London.
- PATZAK, U. (2003a): Die Bedeutung der Elbaue bei Wörlitz für Greifvögel. Apus 11: 385-394.
- PATZAK, U. (2003b): Die Gebäudebrüter der Stadt Dessau. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 15: 105-120.
- PATZAK, U. & K.-J. SEELIG (2006): Die Brutvögel des Mittelbegebietes zwischen Mulde- und Saalemündung. Apus 13, Sonderh.: 1-119.
- PATZAK, U. & F. WEIHE (2014): Längerer Aufenthalt eines Schlangennadlers *Circaetus gallicus* bei Kühren. Apus 19: 18-22.
- PECHACEK, P. (2008): Wie wahrscheinlich ist die Besiedlung des Harzes durch den Dreizehenspecht *Picoides tridactylus*? Ein Prognoseversuch. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 40: 217-221.
- PELNY, H.-J. (2002): Zum Vorkommen des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Landkreis Lüchow-Dannewitz von 1965 bis 2002. Lüchow-Dannenberg. Ornithol. Jber. 15/16: 489-498.
- PERTL, C. & T. SPÄTH (2014): Ergebnisse der Erfassung wertgebender Brutvogelarten im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt) und EU SPS Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2013. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 41-48.
- PFENNIG, H. G. (2012): Der Dreizehenspecht von Hüinghausen. Charadrius 48: 82-83.
- PIECHOCKI, R. (1951): Tritt eine Verstädterung des Eichelhähers ein? Rundbr. Arbeitsgem. Ornithol. 2: 10-11.
- PIECHOCKI, R. (1954): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 1. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 3: 274-279.
- PIECHOCKI, R. (1956): Zur Verstädterung des Eichelhähers. Falke 3: 10-17.
- PIECHOCKI, R. (1958): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 2. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 6: 106-112.
- PIECHOCKI, R. (1965): Beiträge zur Avifauna Mitteldeutschlands. 4. Mitteilung. Beitr. Vogelkd. 10: 413-425.
- PIECHOCKI, R. (1979): Christian Ludwig Nitzsch, Ordinarius für Naturgeschichte an der Universität Halle, an Johann Friedrich Naumann. Wiss. H. Pädagog. Hochsch. Köthen 6(1): 49-76.
- PIETSCHMANN, G. (2002): Forstgeschichte und Waldentwicklung im Staatlichen Forstamt Nedlitz. Wald in Sachsen-Anhalt Bd. 12. Magdeburg.
- PIRL (1889): Eine Schneeeule erlegt bei Wittenberg. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 14: 168-170.
- PLASCHKA, F. (1970): Bestand und Ökologie der Greifvögel und Eulen des Kreises Merseburg. Zusammengestellt nach Untersuchungen im Jahre 1969. Apus 2: 152-156.
- PLATE, F. (1964): Beobachtungen und Untersuchungen eines Forstpraktikers über die Beziehungen zwischen Waldvögeln und Forstinsekten. Biol. Abh. 1, H. 29-30: 1-48.
- PLATH, L. (1979): Löffler (*Platalea leucorodia* L.) an der Mittelbe im Kreis Havelberg. Beitr. Vogelkd. 25: 124.
- PLATH, L. (1984): Avifauna des nördlichen Elb-Havel-Winkels (4. Folge). Zw. Elbe u. Havel - Heimatheft des Kreises Havelberg 4: 69-81.
- PLATH, L. (1986): Die Brutvogelbestände an Hecken, Straßen und Wegen der Havelberger Oberfeldmark. Apus 6: 119-127.
- POHLE, W. & B. NICOLAI (2003): Beobachtungen an einem futterzahnenden Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 21: 27-38.
- PONTIUS, H. (1986): Die ornithologischen Sammlungen am Naturkundemuseum Erfurt. Nachweise in Thüringen seltener Vogelarten. Veröff. Naturkundemus. Erfurt 5: 86-96.
- POTAPOV, E. & R. SALE (2012): The Snowy Owl. London.
- PRIGGE, R. (1967): Purpurreiher bei Tangerhütte. Falke 14: 282.

- PRIGGE, R. (1972): Beobachtung eines Thorswassertreters (*Phalaropus fulicarius*) am Treuel/Elbe im Bezirk Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 18: 434.
- PSCHORN, A. (2008a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Zeitzer Forst im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 35-41.
- PSCHORN, A. (2008b): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 47-52.
- PSCHORN, A. (2011): Ergebnisse der landesweiten Erfassung von Raufußkauz (*Aegolius funereus*) und Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) in Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 67-82.
- PSCHORN, A. (2012): Attacken von Nilgänsen *Alopochen aegyptiaca* auf eine Junge führende Stockente *Anas platyrhynchos*. Apus 17: 106-108.
- PUHLMANN, G. & S. FISCHER (2017): Über 300 km entlang der Elbe: Vogellebensraum Fluss. Falke 64 (10): 31-33.
- PUTZIG, P. (1938): Die Wanderungen des Eichelhäherers (*Garrulus glandarius*) im Lichte neuer Erkenntnisse. Schriften Phys.-ökon. Ges. Königsberg (Pr.) 70: 189-216.
- PUZOVIC, S. (2000): Atlas Ptica Grabljiciva Srbije – Atlas of Birds of Prey of Serbia. Beograd.
- RADOMSKI, U. (1986): Die Bergente (*Aythya marila*) als Brutvogel in Deutschland. J. Ornithol. 127: 509-511.
- REHBERG, H. & E. SPERLING (1927): Vogelfauna der Umgebung von Magdeburg. Ornithol. Monatsschr. 52: 30-40, 63-68, 76-82, 98-102, 113-118.
- REICHHOFF, L. (2010): Mittelwald in der Region Dessau-Wörlitz. Veröff. LPR Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GmbH 5: 7-12.
- RESEARITZ, A. (2006): Ökologie überwinternder Rotmilane *Milvus milvus* (Linné, 1758) im Nordharzvorland. Jber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 4. Sonderbd.: 4-112.
- REY, E. (1871): Die Ornis von Halle. Z. ges. Naturwiss. 37 (N. F.): 453-489.
- REY, E. (1905): Die Eier der Vögel Mitteleuropas. Gera-Untermhaus.
- RHEINWALD, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands - Kartierung um 1985. DDA-Schriftenreihe 12. Bonn.
- RICHTER, K. (2016): Erster Nachweis des Blutspechts *Dendrocopos syriacus* für Deutschland. Otus 8: 49-56.
- RICHTER, M. (2010): Nil- und Rostgans – neue Vogelarten in der Region Bitterfeld-Wolfen. Bitterfelder Heimatbl. 28: 29-32.
- RICHTER, M. (2011): Mandarinente *Aix galericulata* brütet Schellenten *Bucephala clangula* aus. Apus 16: 89-90.
- RIECHE, H. (1993): Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria*, brütet im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 11: 117.
- RIEDEL T., P. HENNIG, F. KROIHER, H. POLLEY, F. SCHMITZ & F. SCHWITZGEBEL (2017): Die dritte Bundeswaldinventur (BWI 2012). Inventur- und Auswertemethoden, 124 S.
- VON RIESENTHAL, O. (1876): Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mitteleuropas. Kassel.
- RIMPAU, W. (1906): [Rotköpfige und schwarzstirnige Würger im Kreis Oschersleben]. Ornithol. Monatsschr. 31: 417.
- RIMROD, F.L. (1840/41): Säugethiere, Vögel und Amphibien in der Grafschaft Mansfeld und dem Ober-Herzogthum Anhalt-Bernburg. Ber. naturwiss. Ver. Harzes 1840/41: 8-12.
- RIMROD, F.L. (1842): Die Strich- und Zugvögel, welche die Grafschaft Mannsfeld und das Oberherzogthum Bernburg zu passieren pflegen. Ber. naturwiss. Ver. Harzes 1842, Beil.: 1-7.
- RIMROD, F.L. (1852): Einige ornithologische Wahrnehmungen und Bemerkungen. Naumannia 2(3): 21-24.
- RIMROD, F.L. (1857): Nachträgliche Berichtigung über das Nisten von *A. nycticorax* im nördlichen Deutschland. Naumannia 7: 335.
- RIMROD, F.L. (1866): Reihenfolge der Rückkehr des größten Theils unserer Sommervögel im Frühling. Nach zwanzigjähriger Beobachtung zu Quenstedt in der Grafschaft Mansfeld, welcher Ort unter dem 51° 45´ nördlicher Breite liegt. J. Ornithol. 14: 354-360.
- RINGLEBEN, H. (1934): Ein Beitrag zur Avifauna der Goldenen Aue. Ornithol. Monatsschr. 59: 142-159, 161-165.
- RINGLEBEN, H. (1953): Kommt der Felsenpieper im nordwestdeutschen Binnenland vor? Beitr. Naturkd. Niedersachs. 6: 82-86.
- RINGLEBEN, H. (1957): Bergpieper (*Anthus s. spinoletta* [L.]) in Niedersachsen. Ber. naturhist. Ges. Hannover: 103: 91-100.
- RINGLEBEN, H. (1959): Für Niedersachsen neue Brut- und Gastvögel. Nat.kdl. Abh. Niedersächs. Landesmus. 1: 26-56.
- RINGLEBEN, H. (1965): Einbürgerungsversuche mit Vögeln in Niedersachsen. N. Arch. Niedersachs. 14: 208-224.
- RINGLEBEN, H. (1968): „Gebirgsvögel“ und andere Vogelarten im Harz. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 28-46.
- RINGLEBEN, H. (1974): Über unbeständige Brutvorstöße nach Niedersachsen und Ansiedlungen gebietsfremder Vögel in diesem Land. I. Teil: Passeriformes. Vogelkd. Ber. Niedersachs. 6: 85-96.
- ROBEL, D. (1991): Die bisher letzte Brut der Blauracke *Coracias garrulus* in Deutschland. Vogelwelt 112: 148-149.
- ROCHLITZER, R. (1957): Ornithologische Beobachtungen an der Mittelelbe zwischen Aken/Elbe und Barby/Elbe unter besonderer Berücksichtigung von Standortstreue und Zugvogelerscheinungen. Staatsexamensarbeit, Zool. Inst. MLU Halle Wittenberg.
- ROCHLITZER, R. (1960): Die Vögel der Lödderitz/Breitenhagener Elbaue. Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. (Magdeburg) 11: 3-18.
- ROCHLITZER, R. (1972): Zum gegenwärtigen Auftreten der Entenvögel und der Greifvögel im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst, Teilgebiet Lödderitzer Forst. Hercynia N.F. 9: 279-301.
- ROCHLITZER, R. (1983a): Graubruststrandläufer 1982 bei Köthen. Falke 30: 312-313.
- ROCHLITZER, R. (1983b): Blutspecht bei Köthen. Falke 30: 353.
- ROCHLITZER, R. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Monogr. Naumann-Mus. 1: 1-220.
- ROCHLITZER, R. & H. KÜHNEL (1979): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Monogr. Naumann-Mus. 1: 1-131.
- RÖDL, T., B.-U. RUDOLPH, I. GEIERSBERGER, K. WEIXLER & A. GÖRGEN (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern. Stuttgart
- RÖBLER, A. (2002): Rotmilan, Mäusebussard und Aaskrähe als Brutnachbarn. Apus 11: 207-208.
- RÖBLER, A. (2016): Über eine Mischbrut aus Rot- *Milvus milvus* und Schwarzmilan *M. migrans* in Sachsen-Anhalt. Apus 21: 79-81.

- ROHN, B. (1987): Schmarotzerraubmöwe im Harz. Apus 6: 284-285.
- ROHN, B. (1990): Spornammern in Halle-Neustadt. Apus 7: 274-275.
- ROHN, B. (1992): Rotmilan „schlägt“ Elster. Apus 8: 128-129.
- ROSENBERGER, W. (1956): Der Bergfink (*Fringilla montifringilla*) in Deutschland im Winterhalbjahr 1954/55. Ornithol. Mitt. 8: 81-89.
- ROST, F. (2009): Das Zugverhalten europäischer Mönchsgrasmücken *Sylvia atricapilla* im Wandel – Daten aus Ostdeutschland. Ber. Vogelwarte Hiddensee. 19: 21-35.
- ROST, F. & H. GRIMM (2004): Kommentierte Liste der Vögel Thüringens. Anz. Ver. Thüring. Ornithol. 5, Sonderh.: 3-78.
- RUBACHA, S. & O. KRYSZEK (2007): Fourth record of the Dalmatian Pelican *Pelecanus crispus* in Poland. Not. Ornithol. 48: 60-62.
- RÜDIGER, W. (1912): *Lanius excubitor*, Brutvogel in der Letzlinger Heide. Z. Ool. Ornithol. 22 (6): 11-12.
- RÜHLING, J.P. (1786): Verzeichnis der wilden Thiere auf dem Harze. In: GATTERER, C. W. J.: Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen. T. 2., S. 248-284. Göttingen.
- RUPPE, S. & S. MATERNA (1990): Zur Brutbiologie und Ernährung des Raubwürgers (*Lanius excubitor* L.) im Kreis Sangerhausen. Beitr. Vogelkd. 36: 222-226.
- RYSLAVY, T. (2002): Weiterer Nachweis eines Rosapelikans (*Pelecanus onocrotalus*) in Brandenburg. Otis 10: 151-154.
- RYSLAVY, T. & T. BICH (1999): Das Fiener Bruch – eine schutzwürdige Kulturlandschaft. Natursch. Landschaftspf. Brandenburg. 8 (1): 4-12.
- RYSSEL, A. (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Bergbaufolgelandschaft Kayna-Süd im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 43-46.
- RYSSEL, A. & U. SCHWARZ (1981a): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. [Teil 1]. Merseburger Land Sonderh. 18: 1-92.
- RYSSEL, A. & U. SCHWARZ (1981b): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. [Teil 2]. Merseburger Land Sonderh. 19: 1-91.
- SACHER, P. (1966): Weißrückenspecht, *Dendrocopos leucotos*, im März 1965 bei Blankenburg/Harz. Beitr. Vogelk. 12: 121.
- SCALOUD, W. (1898): Kleinere Mitteilungen (Bachstelze und Kukuck). Ornithol. Nachr. 23: 327-328
- SCHÄFER, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Zerbster Land im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 38-43.
- SCHÄFER, B. (2007): Revierkartierung wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Feldflur bei Kusey im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 73-82.
- SCHÄFER, B. & G. KNÜPPEL (2008): Zur aktuellen Situation des Birkuhns (*Tetrao tetrix*) in der Colbitz-Letzlinger Heide. Mitt. NNA, Sonderh. 1: 12-13.
- SCHÄFER, B. & A. PSCHORN (2011): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Saalemündung und Magedeburg im Jahr 2010. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 37-52.
- SCHÄFER, B. & K.-J. SEELIG (2015): Die Vögel (Aves) der Colbitz-Letzlinger Heide. Entomol. Mitt. Sachs.-Anhalt 23, Sonderh.: 355-399.
- SCHÄFER, B., W. LIPPERT & K.-J. SEELIG (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Colbitz-Letzlinger Heide im Jahr 2004/2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 33-45.
- SCHALOW, H. (1919): Beiträge zur Vogelfauna der Mark Brandenburg. Berlin.
- SCHELPER, W. (1983): Der Rauhfußkauz in Altkreis Münden – ein Beispiel für angewandten Artenschutz. DBV-Gruppe Münden 1923-1983, Festschrift: 22-27.
- SCHERZINGER, W. (2006): Die Wiederbegründung des Habichtskauz-Vorkommens *Strix uralensis* im Böhmerwald. Ornithol. Anz. 45: 97-156.
- SCHIEMANN, H. (1972): Über Winterquartiere nordeuropäischer Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*). Vogelwarte 26: 330-336.
- SCHILDMACHER, H. (1930): Beobachtungen an ziehenden Weindrosseln im Frühjahr 1930 bei Magdeburg. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 4: 22-24.
- SCHILDMACHER, H. & H. PÖRNER (1967): Jahresbericht der Vogelwarte Hiddensee über die Jahre 1964 und 1965.
- SCHLEICHER, W. (2002): Beitrag zur Wald- und Forstgeschichte des Harzes in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wald in Sachsen-Anhalt 10: 114 S.
- SCHLÜTER, W. (1902): Schlangenadler bei Diemitz erlegt. Ornithol. Monatsber. 10: 11.
- SCHLÜTER, W. (1910): *Anser albifrons* und *Ibis falcinellus*. Zwei seltene Gäste in Deutschland. Falco 6: 25-26.
- SCHMID, H., M. KESTENHOLZ, P. KNAUS, L. REY & T. SATTLER (2018): Zustand der Vogelwelt in der Schweiz: Sonderausgabe zum Brutvogelatlas 2013-2016. Schweizerische Vogelwarte Sempach.
- SCHMIDT, C. (1993): Die Unterscheidung des Spornpiepers *Anthus richardi* von unausgefärbten Brachpiepern *A. campestris*. Limicola 7: 178-190.
- SCHMIDT, F. & D. WEIS (1986): Der Brutvogelbestand des Peißnitz-Auwaldes in Halle. Apus 6: 177-182.
- SCHMIDT, J., J. SCHMIDT & T. KRÜGER (1998): Zum möglichen Vorkommen des Haseluhnes (*Bonasia bonasia*) in der Dübener Heide. Actitis 33: 93-95.
- SCHMIDT, W. (1987): Erstbeobachtung von Vogelarten. 10. Nachtrag 1986: Rauhfußkauz (*Aegolius funereus* L. 1758). Biol. Studien Luckau 16: 83-84.
- SCHMIEDEL, J. (1966): Ohrenlerchen, Schneeammern und Spornammer im Winter 1964/65 bei Halle/S. Apus 1: 43-45.
- SCHMIEDEL, J. (1968): Der Wasserpieper im Stadtkreis Halle/S. Apus 1: 247-249.
- SCHMIEDEL, J. (1985): Felsbrüter im Saalkreis. Apus 6: 1-3.
- SCHNEIDER, R. (1963a): Eissturmvogel (*Fulmarus glacialis*) und Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*) am Barleber See bei Magdeburg. Beitr. Vogelkd. 8: 315-316.
- SCHNEIDER, R. (1963b): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) und Purpurreiher (*Ardea purpurea*) im Nordharzvorland. Beitr. Vogelkd. 8: 468.
- SCHNEIDER, R. (1969): Die Siedlungsdichte der Vögel einer Bruchlandschaft im nördlichen Harzvorland im Jahr 1962. Mitt. IG Avifauna DDR 2: 3-12.
- SCHNEIDER, R. (1972): Schmutzgeier (*Neophron percnopterus* (L.)) über Oschersleben (Bode). Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 7: 121.



- SCHNEIDER, R. (1981): Steppenkiebitz (*Chettusia gregaria*) 1981 bei Oschersleben (Bezirk Magdeburg). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 5-6: 94.
- SCHNEIDER, R. (2005): Die Siedlungsdichte der Vögel in einem Auwaldrest im Großen Bruch bei Oschersleben. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 23: 73-87.
- SCHÖNAU, O. (1967): Samtenten im Elsnigker Teichgebiet (Kreis Köthen). Apus 1: 144.
- SCHÖNBERG, R. & J. MÜLLER (1965): Zwergohreule (*Otus scops* [L.]) in der Börde. Beitr. Vogelkd. 11: 199-200.
- SCHÖNBRODT, M. & M. SCHULZE (2017): Rote Liste der Brutvögel des Landes Sachsen-Anhalt (3. Fassung, Stand November 2017 – Vorabdruck). Apus 22, Sonderheft: 3-80.
- SCHÖNBRODT, R. & T. SPRETKE (1989): Brutvogelatlas von Halle und Umgebung. Ergebnisse einer Feinrasterkartierung 1983-1986. Halle.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (1987): Ergebnisse 10-jähriger Planberingung von jungen Greifvögeln in den Kreisen Halle, Halle-Neustadt und Saalkreis. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 67-84.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (1991): Greifvogelhorstkontrollen der Jahre 1986 bis 1990 bei Halle. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 61-74.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (2000): Greifvogelhorstkontrollen von 1991 bis 1998 im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 4: 153-166.
- SCHÖNBRODT, R. & H. TAUCHNITZ (2006): 2005 und 2006 – zwei außergewöhnliche Jahre für Greifvögel. Apus 13: 62-65.
- SCHÖNE, S. (2010): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten in den FFH-Gebieten Buchenwald östlich Klötze, Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde, Süppling westlich Weißewarte sowie Tangelnscher Bach und Bruchwälder im Jahre 2009. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 57-66.
- SCHÖNEKERL, H. (1927): Überwinterungsversuche von *Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* u. *Motacilla a. alba* bei Dessau. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 1: 25-26.
- SCHÖNEKERL, H. (1929): Der Stelzvogelzug im Herbst 1928 bei Magdeburg. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 3: 29-34.
- SCHÖNFELD, M. (1966): Bodenbruten des Gartenrotschwanzes, *Phoenicurus phoenicurus* (L.). Beitr. Vogelkd. 12: 206-208.
- SCHÖNFELD, M. (1972): Abnorme Gelegestärke beim Gartenrotschwanz, *Phoenicurus phoenicurus*. Beitr. Vogelkd. 18: 436.
- SCHÖNFELD, M. (1975): Bachstelze, *Motacilla alba* (L.), als Gebüschbrüter. Beitr. Vogelkd. 21: 359-360.
- SCHÖNFELD, M. (1977): Brutvorkommen des Schlagschwirls im Kreis Wittenberg. Apus 4: 14-15.
- SCHÖNFELD, M. (1983): Beiträge zur Ökologie und zum interspezifischen Verhalten der Baumläufer *Certhia familiaris* und *C. brachydactyla* in Eichen-Hainbuchen-Lindenwäldern unter dem Aspekt der erhöhten Siedlungsdichte durch eingebrachte Nisthöhlen. Hercynia N.F. 20: 290-311.
- SCHÖNFELD, M. (1984): Migration, Sterblichkeit, Lebenserwartung und Geschlechtsreife mitteleuropäischer Rotmilane, *Milvus milvus* (L.), im Vergleich zum Schwarzmilan, *Milvus migrans* (Boddaert). Hercynia N.F. 21: 241-257.
- SCHÖNFELD, M. (1992): Untersuchung zur Vogelwelt eines Industriestandortes bei Wittenberg-Piesteritz. Apus 8: 120-126.
- SCHÖNFELD, M. (1995): Die Vogelwelt des Stadtfriedhofes Weißenfels/Saale in den Jahren 1973 bis 1975. Apus 9(1): 27--37.
- SCHÖNFELD, M. (1998): Zum Vorkommen, Neststand und Nestern des Neuntöters *Lanius collurio* und zum syntopen Vorkommen der Sperbergrasmücke *Sylvia nisoria* im Mittelbegebiet bei Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Ornithol. Mitt. 50: 221-226.
- SCHÖNFELD, M. (2000): Die Erfolge der Wörlitzer Schwarzwäne. Ornithol. Mitt. 52: 273-274.
- SCHÖNFELD, M. (2002): Die Vogelwelt des Apollensberges – Landkreis Wittenberg. Apus 11: 255-260.
- SCHÖNFELD, M. (2004a): Hohes Alter eines Gartenbaumläufers. Apus 12: 196-197.
- SCHÖNFELD, M. (2004b): Zu Vorkommen, Bestandsentwicklung und Biometrie der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* C.L. Brehm 1831 in Gehölzresten des Elbetales um Wittenberg im Vergleich mit anderen Gebieten. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 16: 5-27.
- SCHÖNFELD, M. (2004c): Die Arealdynamik des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* auch im Elbetal bei Wittenberg nachgewiesen. Ornithol. Mitt. 56: 324-325.
- SCHÖNFELD, M. (2005a): Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VII/2): Die Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C.L. Brehm, 1820) des Mittelbegebietes/Sachsen-Anhalt (Aves, Passeriformes, Certhiidae). Zool. Abh. (Dresden) 55: 139-175.
- SCHÖNFELD, M. (2005b): Klimaerwärmung und Ankunft der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Elbtal um Wittenberg. Ornithol. Mitt. 57: 266.
- SCHÖNFELD, M. (2006a): Beiträge zur Biometrie und Mauser deutscher Vögel (Teil VII/3): Die Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C.L. Brehm, 1831) des Mittelbegebietes/Sachsen-Anhalt (Aves, Passeriformes, Certhiidae). Zool. Abh. (Dresden) 56: 113-150.
- SCHÖNFELD, M. (2006b): Medianwerte der Erst- und Letztfeststellungen ausgewählter Zugvögel in Vergleich von 1975 bis 2005 sowie von Zehnjahreszeiträumen für den Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. 1. Teil: Jahresvögel, Teilzieher, Überwinterer Südeuropa/Nordafrika. Ornithol. Mitt. 58: 131-140.
- SCHÖNFELD, M. (2006c): Medianwerte der Erst- und Letztfeststellungen ausgewählter Zugvögel im Vergleich von 1975 bis 2005 sowie von Zehnjahreszeiträumen für den Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. 2. Teil. Ornithol. Mitt. 58: 158-172.
- SCHÖNFELD, M. (2007): Vorkommen und Verbreitung von Waldbaumläufer (*Certhia familiaris macrodactyla* C.L. Brehm, 1831) und Gartenbaumläufer (*Certhia b. brachydactyla* C.L. Brehm, 1820) im Mittelbegebiet, Altkreis Wittenberg, vom Südrand des Fläming bis zum Nordrand der Dübener Heide. Vertebrate Zool. 51: 83-102.
- SCHÖNFELD, M. (2010): Abriss zur wissenschaftlichen Vogelberingung im Altkreis Wittenberg. Apus 15: 51-64.
- SCHÖNFELD, M. (2014): Frühjahrsankunft und Sangesbeginn von 50 Brutvogelarten in den Jahren 1975 bis 2012 im Altkreis Wittenberg (Sachsen-Anhalt). Ornithol. Mitt. 66: 187-218.
- SCHÖNFELD, M. & K. PATZSCHKE (2012): Erfolgreiche Brut der Nilgans *Alopochen aegyptiacus* in Wohnsiedlung in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus. Ornithol. Mitt. 64: 81-82.
- SCHÖNFELD, M. & U. ZUPPKE (2008): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg. Apus 13: 373-415.
- SCHÖNFELD, M., U. ZUPPKE & H. BECHER (1985): Die Vögel des Kreises Wittenberg – eine kommentierte Artenliste. Apus 6: 49-65.

- SCHÖNFELD, M., U. ZUPPKE & H. REHN (1997): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg/Sachsen-Anhalt. Apus 9: 301-344.
- SCHÖNN, S. (1980): Der Sperlingskauz. Neue Brehm-Bücherei 513. Wittenberg-Lutherstadt.
- SCHÖPWINKEL, A. (1892): Die Vogelwelt der Grafschaft Wernigerode. Schr. Naturwiss. Ver. Harzes Wernigerode 7: 1-62.
- SCHONERT, A. & B. SIMON (2014): Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle von Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensraumtypen im NATURA 2000-Gebiet Mittlere Oranienbaumer Heide - Brutvögel. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 39-48.
- SCHRÖDER, H. (1956): Purpurreiher in Sachsen-Anhalt. Falke 3: 68.
- SCHUBERT, M. (1962): Zum Vorkommen der Kolbenente bei Schwerin. Falke 9: 75-79.
- SCHUBERT, P. (1978): Schwarzstirnwürger bei Roßlau Elbe. Apus 4: 96.
- SCHUBERT, P. (1982): Ein Baßtöpel im Kreis Roßlau. Apus 4: 279.
- SCHUBERT, P. (1985a): Eine späte Brut des Neuntötters im Kreis Zerbst. Apus 6: 44-45.
- SCHUBERT, P. (1985b): Ein Nachtrag zum Vorkommen des Kolkrahen im Fläming. Apus 6: 81-88.
- SCHUBERT, P. (1987): Vom Grau- und Mittelspecht im Fläming. Apus 6: 233-236.
- SCHUBERT, P., P. BIRKE & E. SCHWARZE (1983): Zwei neue Wassertreter-Feststellungen im mittleren Mittelbegebiet. Apus 5: 95-96.
- VON DER SCHULENBURG, I. (1914): Von der Gebirgsbachstelze. Ornithol. Monatsschr. 39: 269-270.
- SCHULZ, F. (2008): Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*) mit auffälliger Prägung auf Weißstörche (*Ciconia ciconia*) in Norddeutschland im Jahr 2001. In: KAATZ, C. & M. KAATZ, 3. Jubiläumsband Weißstorch: 432-434.
- SCHULZ, H. & J.-U. HEINS (2013): Die größte Vogelfanganlage der Welt. Falke 60: 200-202.
- SCHULZE, M. (2004): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 69-75.
- SCHULZE, M. (2005a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Saale-Elster-Aue südlich Halle im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 106-117.
- SCHULZE, M. (2005b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2004/05. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 126-132.
- SCHULZE, M. (2006): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2005/2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 63-72.
- SCHULZE, M. (2007a): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Helmestausee Berga-Kelbra im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 37-47.
- SCHULZE, M. (2007b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2006/2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 109-119.
- SCHULZE, M. (2008): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2007/2008. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 79-90.
- SCHULZE, M. (2009): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2008/09. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 67-78.
- SCHULZE, M. (2010): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2009/10. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 73-84.
- SCHULZE, M. (2011): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2010/11. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 95-107.
- SCHULZE, M. (2012b): Der Brutbestand von Rohr- und Zwergdommel *Botaurus stellaris* und *Ixobrychus minutus* in Sachsen-Anhalt im Jahr 2010. Apus 17: 43-59.
- SCHULZE, M. (2012c): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2011/12. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 95-106.
- SCHULZE, M. (2014a): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2012/13. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 61-74.
- SCHULZE, M. (2014b): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2013/14. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 6: 49-62.
- SCHULZE, M. (2015): Die Wasservogelzählung in Sachsen-Anhalt 2014/15. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 55-70.
- SCHULZE, M. & F. MEYER (2004): Brutvorkommen ausgewählter Brutvogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Glücksburger Heide. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 40-46.
- SCHULZE, M. & A. PSCHORN (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Mittlere Oranienbaumer Heide im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 47-56.
- SCHULZE, M. & B. SCHÄFER (2012): Landesweite Brutbestandserschaffung des Brachpiepers (*Anthus campestris*) in Sachsen-Anhalt im Jahr 2011. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 47-60.
- SCHULZE, M., D. LÄMMEL & A. PSCHORN (2008): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Vogelschutzgebiet Hochharz im Jahr 2007. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 4: 53-64.
- SCHULZE, M., F. MEYER & S. FISCHER (2015): Bedeutung der von *Calluna*-Heiden dominierten Europäischen Vogelschutzgebiete Sachsen-Anhalts für den Schutz der Leitarten von Sandheiden und deren Management. Ber. Vogelsch. 52: 79-97.
- SCHULZE, M., A. RYSEL & A. PSCHORN (2007): Brutvorkommen wertgebender Brutvogelarten im EU SPA Buchenwälder um Stolberg im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 101-108.
- SCHULZE, W. (1957): Ein Steinadler im Harz. Falke 4: 215.
- SCHULZE, W. (1962a): Nachtigall als Brutvogel in künstlichen Nistbüschen aus Kiefernreisig. Falke 9: 68.
- SCHULZE, W. (1962b): Küstenseeschwalbe im Binnenland. Falke 9: 247.
- SCHULZE, W. (1971): Die Vogelwelt des Kreises Sangerhausen. Beitr. Heimatforschung 2: 35-60.
- SCHULZE, W. (1985): Rotkopfwürger brütet von 1975-1980 bei Sangerhausen. Apus 6: 43-44.
- SCHULTZ, H. (1990): Brut des Rotmilans auf Hochspannungsmast. Apus 7: 267.

- SCHWARZ, U. (1992): Erfolgreiche Rotmilanbrut auf Hochspannungsmast. Apus 8: 59-61.
- SCHWARZ, W. (1928): Wiederfund einer beringten Bachstelze. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 2: 11.
- SCHWARZ, W. (1931): Die Vogelwelt der Letzlinger Haide (III. Forts.; IV. Forts.; Schluss). Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 5: 21-35, 38-44, 47-53.
- SCHWARZ, W. & H. TISCHER (1929): Aus der Brutperiode 1928 im Magdeburger Beobachtungsgebiet. Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 3(2): 7-12.
- SCHWARZE, D. (1995): Weißkopf-Ruderente bei Roßlau. Apus 9: 59-60.
- SCHWARZE, E. (1968): Schelladler und Eisente bei Roßlau. Apus 1: 196-197.
- SCHWARZE, E. (1971a): Ornithologische Besonderheiten vom Unterluch bei Roßlau. Apus 2: 189-191.
- SCHWARZE, E. (1972): Nachweis einer Rotkehlrossel, *Turdus ruficollis*, an der Mittelbe. Beitr. Vogelkd. 18: 446-447.
- SCHWARZE, E. (1975): Weitere Zwergammer-Feststellungen in der DDR. Falke 22: 427.
- SCHWARZE, E. (1978a): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kreis Roßlau, Bezirk Halle). 1. Teil. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 1: 43-62.
- SCHWARZE, E. (1978b): Auch Schafstelzen (*Motacilla flava*) setzen sich auf Weidetiere. Ornithol. Mitt. 0: 233.
- SCHWARZE, E. (1980a): Ergebnisse der Wasservogelzählungen der Saison 1978/79 im Bezirk Halle. Apus 4: 162-166.
- SCHWARZE, E. (1980b): Einige Nachweise südlich verbreiteter Vogelarten in den Kreisen Roßlau und Dessau. Apus 4: 171-175.
- SCHWARZE, E. (1982): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1978/79 und 1980/81 im Bezirk Halle. Apus 4: 235-259.
- SCHWARZE, E. (1983): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1981/82 und 1982/83 im Bezirk Halle. Apus 5: 122-127.
- SCHWARZE, E. (1986): Die Vögel der Kliekener Elbaue (Kreis Roßlau, Bezirk Halle). 3. Teil: Charadriiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Coraciiformes, Piciformes. Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 3: 23-33.
- SCHWARZE, E. (1987): Ergebnisse der Wasservogelzählung 1983/84, 1984/85 und 1985/86 im Bezirk Halle. Apus 6: 204-212.
- SCHWARZE, E. (1988): Mornellregenpfeifer an der Mittelbe. Apus 7: 36-37.
- SCHWARZE, E. (1990): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1986/87 und 1987/88 im Bezirk Halle. Apus 7: 256-260.
- SCHWARZE, E. (1995a): Zur Entwicklung des Winterbestandes der Wasservögel an der mittleren Mittelbe in Sachsen-Anhalt. Apus 9: 38-59.
- SCHWARZE, E. (1995b): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1988/89 bis 1992/93 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 9: 83-98.
- SCHWARZE, E. (2000a): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1993/94 bis 1997/98 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 10: 311-323.
- SCHWARZE, E. (2000b): Eine neue Feststellung des Graubruststrandläufers in Sachsen-Anhalt. Apus 10: 341-343.
- SCHWARZE, E. (2008): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1998/99 bis 2002/03 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 13: 313-322.
- SCHWARZE, E. (2010): Spornpieper *Anthus richardii* erstmals in Sachsen-Anhalt. Apus 15: 72-73.
- SCHWARZE, E. & P. BIRKE (2006): Gelbschnabeltaucher – *Gavia adamsii* - Zweiter Nachweis in Sachsen-Anhalt. Apus 13: 133-135.
- SCHWARZE, E., & W. HERRMANN (2001): Bemerkenswert große Trupps nordischer Ammern im Mittelbegebiet bei Dessau. Apus 11: 107-110.
- SCHWARZE, E. & H. KOLBE (2006): Die Vogelwelt der zentralen Mittelbe-Region. Halle.
- SCHWARZE, E. & G. PUHLMANN (2012): Ergänzungen zum Vorkommen einiger Watvogelarten (Aves: Chardriiformes) im zentralen Mittelbegebiet und am Stausee Ladeburg (Landkreis Jerichower Land). Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau 24: 123-128.
- SCHWARZENBERG, T. (2001): Das Auerhuhn in den Nationalparken Harz und Hochharz. Bestandsentwicklung und Verbreitung. Jahresbericht 2001. Unveröff. Gutachten i. Auftr. d. Nationalparkverw. Harz u. Hochharz.
- SCHWEMLER, R. (1988): Zur Brutbiologie und Brutdichte des Mittelspechtes im Auegebiet des Kreises Merseburg. Apus 7: 17-20.
- SCHWERDTFEGER, O. (2008): Ist der Raufußkauz *Aegolius funereus* ein echter Harzer? – Über die Bedeutung einer lokalen Population. Vogelkundl. Ber. Niedersachs. 40: 247-253.
- SEELIG, K. (1979): Brutvögel und bemerkenswerte Durchzügler im Mittelbe-Börde-Gebiet in den Jahren 1973-1975. Abh. Ber. Naturkd. Vorgesch. (Magdeburg) 12: 52-77.
- SEELIG, K.-J. & P. CLAUSING (1971): Thorswassertreter im Herbst 1970 bei Magdeburg. Apus 2: 192.
- SEELIG, K.-J. & D. HEIDECHE (1981): Bericht über bestandsgefährdete und seltene Vogelarten im Bezirk Magdeburg. Mitt. Bezirksarbeitsgr. Artenschutz Magdeburg 4(5): 1-8.
- SEELIG, K. & U. PATZAK (2005): Brutvorkommen ausgewählter Vogelarten im EU SPA Mittlere Elbe einschließlich Steckby-Lödderitzer Forst 2003/2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 31-37.
- SEELIG, K.-J., H.-G. BENECKE, F. BRAUMANN & B. NICOLAI (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. Abh. Ber. Mus. Heineanum 3, Sonderh.: 1-243.
- SEIFERT, E. & E. SCHWARZE (1998): Zur Bestandsentwicklung der Nachtigall bei Roßlau. Apus 10: 22-24.
- SEITZ, E. & U. VON WICHT (1980): Der Einflug von Raubmöwen ins mitteleuropäische Binnenland im Spätsommer/Herbst 1976. Ornithol. Beob. 77: 2-20.
- SELLIN, D. (1965): Spereburele (*Surnia ulula*) in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 86: 61-62.
- SELLIN, D. (1967): Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) als Freibrüter. Beitr. Vogelkd. 12: 429-436.
- SELLIN, D. (1968a): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Coswig im Jahre 1967. Apus 1: 239-242.
- SELLIN, D. (1968b): Zur Verbreitung der Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) in der nordwestlichen Umgebung Magdeburgs. Vogelwelt 88: 79-83.
- SELLIN, D. (1973): Avifaunistische Notizen aus der Umgebung von Coswig/Anhalt. Apus 3: 34-36.
- SELLIN, D. (1993): Spornammern im Landkreis Bitterfeld. Apus 8: 170-172.



- SELLIN, D. (1994): Notizen zum Vorkommen der Wachtel im Raum Wolfen-Zörbig. *Apus* 8: 265-271.
- SIANO, R. & S. KLAUS (2013): Auerhuhn *Tetrao urogallus* – Wiederansiedlungs- und Bestandsstützungsprojekte in Deutschland nach 1950 – eine Übersicht. *Vogelwelt* 134: 3-18.
- SIANO, R., F. BAIRLEIN, K.-M. EXO & S. A. HERZOG (2006): Überlebensdauer, Todesursachen und Raumnutzung gezüchteter Auerhühner (*Tetrao urogallus* L.), ausgewildert im Nationalpark Harz. *Vogelwarte* 44: 145-158.
- SIANO, R., S. A. HERZOG, K.-M. EXO & F. BAIRLEIN (2011): Nahrungswahl ausgewildelter Auerhühner (*Tetrao urogallus* L.) im Harz. *Vogelwarte* 49: 137-148.
- SIEBIGK, F. (1867): Das Herzogthum Anhalt-Dessau: Historisch, geographisch und statistisch dargestellt. Dessau.
- SIMON, B. (1986): Ökologische Untersuchungen an Landschaftselementen und Brutvögeln im NSG „Riß“ (Kr. Jessen/E.) Teil 1. *Hercynia N.F.* 23: 325-345.
- SIMON, B. (1987): Untersuchung zum Bestand der Taggreifvögel (Falconiformes) im Elbniederungsgebiet südlich der unteren Schwarzen Elster. *Populationsökol. Greifvogel- u. Eularten*, Bd. 1: 85-98.
- SIMON, B. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Annaburger Heide in den Jahren 2003/2004. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1*: 118-125.
- SIMON, B. & U. SIMON (1996): Schutzwürdigkeitsstudie für das auszuweisende Naturschutzgebiet „Mittlere Glücksburger Heide“. unveröff. Gutachten.
- SIMON, B. & U. SIMON (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mündungsgebiet der Schwarzen Elster im Jahr 2005. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2*: 59-65.
- SITTLER, B., A. AEBISCHER & O. GILG (2011): Post-breeding migration of four Long-tailed Skuas (*Stercorarius longicaudus*) from North and East Greenland to West Africa. *J. Ornithol.* 152: 375-381.
- SKAKUJ, M. & T. STAWARCZYK (1994): Die Bestimmung des Blutspechts *Dendrocopos syriacus* und seine Ausbreitung in Mitteleuropa. *Limicola* 8: 217-241.
- SLACK, R. (2009): Rare birds where and when. An analysis of status and distribution in Britain and Ireland. Vol. 1: sandgrouse to New World orioles. York.
- SNOW, D.W. & C.M. PERRINS (1998): The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition. Vol. 1. Oxford, New York.
- SODEIKAT, G. & G. KNÜPPEL (1997): Zur Birkhuhnssituation im Bundesforst Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt. In: Das Birkhuhn. Die Entwicklung von Birkhuhnpopulationen im Flachland und in Mittelgebirgen - Wie können wir diese Tierart erhalten? - Sächsische Akademie für Natur und Umwelt: 30-32.
- SORGE, C. (1923): *Oceanodroma leucorhoa* (Vieill.), der gabelschwänzige Schwalbensturmvogel, in Nordthüringen. *Ornithol. Monatsber.* 31: 16-17.
- SOMMER, G. (1957): Baßtölpel bei Merseburg. *Falke* 4: 105.
- SOMMER, G. (1959): Ein Flamingo in Merseburg. *Merseburger Land* 1959: 160-162.
- SOMMER (1893a): *Falco cenchris* in Anhalt. *Ornithol. Monatsber.* 1: 42.
- SOMMER (1893b): Notizen aus Bernburg. *Ornithol. Monatsber.* 1: 85.
- SOVON (2002): Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Leiden.
- SPELRLING, D. (1970): Das Vorkommen der Möwen (Laridae) im Bitterfelder Braunkohlenrevier. *Hercynia N. F.* 7: 273-298.
- SPELRLING, E. (1933): *Podiceps n. nigricollis* bei Schollene als Brutvogel verschwunden? *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 7: 17-19.
- SPELRLING, E. (1934a): *Locustella luscinioides* Savi für die Provinz Sachsen nachgewiesen. *Ornithol. Monatsber.* 42: 112.
- SPELRLING, E. (1934b): *Motacilla c. cinerea* auf dem Zug in Magdeburg. *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 8: 31.
- SPELRLING, E. (1934c): *Locustella n. naevia* (Bodd.) auf Waldlichtungen. *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 8: 31-32.
- SPELRLING, E. (1935): Die Vogelfauna des Schollener Sees. *Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg* 9: 11-16.
- SPELRLING, E. (1939): Zum Brutvorkommen von *Lyrurus t. tetrix* (L.). *Beitr. Avifauna Mitteltdt.* 3: 50.
- SPELRLING, E. (1940): Der Rohrschwirl in der Provinz Sachsen. *Ornithol. Monatsber.* 48: 121.
- SPELRLING, E. (1949): Zum Vorkommen von *Locustella fluviatilis* (Wolf) und *Luscinia luscinioides* (Savi) in Sachsen-Anhalt. *Ornithol. Ber.* 2: 48-49.
- SPRETKE, T. (1982a): Avifaunistischer Jahresbericht 1977 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 1-13.
- SPRETKE, T. (1982b): Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle. *Apus* 5: 13-25.
- SPRETKE, T. (1986): Avifaunistischer Jahresbericht 1981 für den Bezirk Halle. *Apus* 6: 98-110.
- SPRETKE, T. (1987): Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle. *Apus* 6: 193-204.
- STAAR, A., G. DORNBUSCH, S. FISCHER & A. HOCHBAUM (2015): Entwicklung und Bestand von Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) im Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst/Untersuchungsgebiet Steckby von 1991 bis 2015. *Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H.* 5: 43-53.
- STACHOWIAK, G. (1959): Der Rote Milan und seine Siedlungsdichte im Hohen Holz. Abschlussarb., Forstfachschr. Schwarzb. (unveröff.).
- STAHL, E. (1996): Die Rote Liste der Brutvögel der Stadt Dessau und der unmittelbaren Umgebung. *Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau* 9: 119-133.
- STARKE, W., A. STIEFEL & R. STIEFEL (1974): Erneute Brutnachweise des Rotkopfwürgers im Gebiet des Süßen Sees. *Apus* 3: 115-117.
- ŠTASTNÝ, K., V. BEJČEK & K. HUDEC (2006): Atlas Hnízdniho Rozšíření Ptáku v České republice. Prag.
- STEFFENS, R., W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT (2013): Brutvögel in Sachsen. Dresden.
- STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖSSLER (1998): Die Vogelwelt Sachsens. Jena.
- STEIN, H. (1968): Siedlungsdichteuntersuchung in einem Auwald bei Magdeburg. *Mitt. IG Avifauna DDR* 1: 29-39.
- STEIN, H. (1969): Der Barleber See bei Magdeburg – ein Rast- und Überwinterungsgewässer für Wasservögel. *Naturkd. Jber. Mus. Heineanum* 4: 25-54.
- STEIN, H. (1972): Über Ankunft und Legebeginn des Neuntötters in den Bezirken Magdeburg und Halle. *Apus* 2: 266-272.

- STEIN, H. (1973): Der Vogelbestand eines Torfstiches in der Niederung der Unterhavel. Mitt. IG Avifauna DDR 6: 53-58.
- STEIN, H. (1974): Ein Beitrag zur Brutbiologie von Singdrossel, *Turdus philomelos*, Amsel, *Turdus merula*, und Mönchsgrasmücke, *Sylvia atricapilla*, mit besonderer Berücksichtigung der Brutverluste. Beitr. Vogelkd. 20: 467-477.
- STEIN, H. (1992): Nachweis eines Karmingimpels im Nordharzvorland. Apus 8: 34.
- STEIN, H. (2000a): Populationsökologie und Phänologie von Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris* und Dorngrasmücke *Sylvia communis* im nördlichen Sachsen-Anhalt nach Beringungsergebnissen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 93-128.
- STEIN, H. (2000b): Zum Vorkommen des Karmingimpels *Capodacus erythrinus* am und auf dem Schollener See. Untere Havel: Naturkd. Ber. Altmark Prignitz 10: 56-57.
- STEIN, H. (2008): Nachweis des Goldhähnchen-Laubsängers *Phylloscopus proregulus* in Sachsen-Anhalt. Apus 13: 348-349.
- STEIN, H. (2013): Zur Phänologie von Nachtigall *Luscinia megarhynchos* und Heckenbraunelle *Prunella modularis* im Raum Magdeburg nach Beringungsergebnissen. Apus 18: 99-113.
- STEIN, H. & P. GOTTSCHALK (2004): Die Dorngrasmücke *Sylvia communis* als Hiddensee-Ringvogel – Ergebnisse 25-jähriger Beringungsarbeit in Ostdeutschland. Apus 12, Sonderh.: 52-75.
- STEINKE, G. (1971): Schmarotzerraubmöwen in der Elbaue bei Tangermünde. Apus 2: 196.
- STEINKE, G. (1973): Zur Brutbiologie des Rebhuhns, *Perdix perdix*. Beitr. Vogelkd. 19: 71-72.
- STEINKE, G. (1977): Beobachtungen an einer späten Mittelspechtbrut (*Dendrocopos medius*). Beitr. Vogelkd. 23: 72-78.
- STEINKE, G. (1999): Die Vögel der Altmark. Stendal.
- STEINKE, G. & K. HEINDORFF (1982): Die Vögel des Kreises Tangerhütte. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 7: 1-105.
- STEIOF, K. (2011): Handlungserfordernisse im Umgang mit nichtheimischen und mit invasiven Vogelarten in Deutschland. Ber. Vogelsch. 47/48: 93-118.
- STENGEL, J. (1877): Vogelleben im Kreise Schweinitz sonst und jetzt. Monatsschr. Sächs.-Thüring. Kr. Vogelkd. Vogelsch. 2: 42-45.
- STIŠOV, M. S., V. I. PRIDATKO & V. V. BARANJUK (1991): Pticy ostrova Vrangelja. Novosibirsk.
- STRESEMANN, E. (1953): Zur Vogelwelt des Harzes. Beitr. Naturkd. Niedersachs. 6: 80-81.
- STRESEMANN, E. (1954): Zur Avifauna der Mark Brandenburg. J. Ornithol. 95: 178-181.
- STRESEMANN, E. & P. THOMSEN (1954): J.F. Naumanns Briefwechsel mit H. Lichtenstein. Kopenhagen.
- STUBBE, C. (1961): Die Besiedelungsdichte eines abgeschlossenen Waldgebietes (Hakel) mit Greifvögeln im Jahre 1957. Beitr. Vogelkd. 7: 155-224.
- STUBBE, H. (1987): Buch der Hege. Federwild. 2. Aufl. Berlin.
- STUBBE, M. (1982): Brutdichte und Altersstruktur einer Rotmilan-Population – *Milvus milvus* (L., 1758) – im nördlichen Harzvorland der DDR im Vergleich zum Mäusebussard *Buteo buteo* (L., 1758). Arch. Natursch. Landschaftsforsch. 22: 205-214.
- STUBBE, M. (1987): Die Erforschung der Greifvogel- und Eulenarten in der DDR – Stand und Perspektive. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 1: 9-26.
- STUBBE, M. (1991): Der Hakel als bedeutendes Vogelschutzgebiet in Europa. Ber. Dt. Sekt. Internat. Rates Vogelsch. 30: 93-105.
- STUBBE, M. & A. STUBBE (2000): Zwergohreulen (*Otus scops*) im Hakelgebiet/Sachsen-Anhalt. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten; Bd. 4: 522.
- STUBBE, M. & K. UHLENHAUT (1977): Habichtsadler in der DDR. Falke 24: 192-197.
- STUBBE, M., M. WEBER, T. HOFMANN & S. HERRMANN (1996): Der Zwergadler *Hieraaetus pennatus* als neuer Brutvogel in Deutschland. Limicola 10: 171-177.
- STUBBE, M., H. ZÖRNER, H. MATTHES & W. BÖHM (1991): Reproduktionsrate und gegenwärtiges Nahrungsspektrum einiger Greifvogelarten im Nördlichen Harzvorland. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 2: 39-60.
- STÜBING, S., J. WAHL, T. SACHER (2013): Erfolgreiche Suche im Herbst 2013: Rastende Mornellregenpfeifer. Falke 60: 498-499.
- SUDFELDT, C., R. DRÖSCHMEISTER, W. FREDERKING, K. GEDEON, B. GERLACH, C. GRÜNEBERG, J. KARTHÄUSER, T. LANGGEMACH, B. SCHUSTER, S. TRAUTMANN & J. WAHL (2013): Vögel in Deutschland – 2013. Münster.
- SUDFELDT, C., J. WAHL & M. BOSCHERT (2003): Brütende und überwinterte Wasservögel in Deutschland. Corax 19, Sonderh. 2: 51-81.
- SÜDBECK, P. & M. FLADE (2004): Bestand und Bestandsentwicklung des Mittelspechts *Picoides medius* in Deutschland und seine Bedeutung für den Waldnaturschutz. Vogelwelt 125: 319-326.
- SYNNATZSCHKE, J. (1982): Zur Winternahrung des Sperbers. Apus 5: 32-36.
- TASCHENBERG, O. (1893): Die Avifauna in der Umgebung von Halle I. Ornithol. Monatsschr. 18: 133-142.
- TASCHENBERG, O. (1909): Die Tierwelt. In: ÜLE, W., Heimatkunde des Saalkreises einschließlich des Stadtkreises Halle und des Mansfelder Seekreises. Halle.
- TAUCHNITZ, H. (1966): Schwarzstirnwürger bei Halle/S. Apus 1: 54.
- TAUCHNITZ, H. (1968): Zur Brutbiologie und Brutdichte des Rotrückenwürgers in einem Auegebiet bei Halle. Apus 1: 229-233.
- TAUCHNITZ, H. (1969): Rohrschwirl-Nachweis für Halle. Apus 1: 295.
- TAUCHNITZ, H. (1970): Die Sperbergrasmücke – *Sylvia nisoria* (Bechst.) – im Stadtkreis Halle und im Saalkreis. Apus 2: 32-38.
- TAUCHNITZ, H. (1972): Purpurreiher und Nachtreiher bei Halle. Apus 2: 275-276.
- TAUCHNITZ, H. (1975): Beobachtung einer Maskenstelze bei Halle. Apus 3: 287-289.
- TAUCHNITZ, H. (1977): Beobachtungen an einem Schlafplatz des Bergpiepers bei Halle. Apus 4: 9-14.
- TAUCHNITZ, H. (1981): Die Vögel der Saale-Elster-Aue im Südteil des Stadtkreises Halle. Apus 4: 193-240.
- TAUCHNITZ, H. (1982): Mornellregenpfeifer am Helmestausee. Apus 4: 282.
- TAUCHNITZ, H. (2005): Greifvögel in der Saale-Elster-Aue südlich Halle (Saale). Brutbestand, Bruterfolg und Brutgröße von Rotmilan, Schwarzmilan und Mäusebussard zwischen 1976 und 2003. Apus 12: 303-313.
- TEICHMANN, A. (1975): Adlerbussard (*Buteo rufinus* Cretzschm.) bei Halle. Beitr. Vogelkd. 21: 496-497.

- TEICHMANN, A. (1986): Eiderente rastet in der Feldflur. Apus 6: 141-142.
- TEICHMANN, A. (1987): Seeregenpfeifer im Binnenland. Apus 6: 222-225.
- TEICHMANN, A. & R. TSCHÄPE (1992): Ändert sich die Phänologie des Eiderenten-Zuges im Binnenland? Apus 8: 54-58.
- TEICHMANN, A. & D. WEIS (1986): Sommerfeststellungen von Eiderenten im Raum Halle-Merseburg. Apus 6: 129-130.
- TEIDOFF, E. (1956): Das Haselhuhn – ein in Deutschland aussterbendes Waldhuhn. Falke 3: 124-126.
- THIELE, A. (1857): Auszüge aus meinem Tagebuch. Naumannia 7(2): 43-52.
- THIELCKE, G. (1972): Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*) ahmen artfremdes Signal nach und reagieren darauf. J. Ornithol. 113: 287-296.
- THIENEMANN, G. (1906): Die Vogelwelt Magdeburgs und Umgebung. Abh. Ber. Mus. Nat.-Heimatkd. Magdeburg 1: 196-206.
- THIENEMANN, G. A. (1852): Einige Bemerkungen über Albino's in der ornithologischen Welt. Naumannia 2(2): 40-42.
- THIENEMANN, J. A. (1899): *Lanius excubitor major*. Ornithol. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 24: 354-355.
- THIENEMANN, W. (1881): Ornithologische Reiseskizzen aus der Glücksburger Heide. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 6: 2-13.
- THIOLLAY, J.-M. & V. BRETAGNOLLE (2004): Rapaces nicheurs de France. Paris.
- TIEDE, G. (1981): Am Nest des Rohrschwirls. Falke 28: 314-317.
- TISCHER, H. (1928): Ornithologisch Interessantes für Magdeburg und Umgebung aus den Jahren 1822-1850 (Fortsetzung und Schluss). Mitt. Ornithol. Ver. Magdeburg 2(1): 1-9.
- TISCHLER, P. (2005): Bestandssituation der Kolbenente in Sachsen-Anhalt. Apus 12: 298-302.
- TISCHLER, P. (2015): Zur Phänologie der Kolbenente *Netta rufina* in Sachsen-Anhalt 2012 bis 2014 anhand von Daten des Beobachtungsportals „ornitho.de“. Apus 20: 45-57.
- TISCHLER P. (2017): Die Entwicklung des Wasservogel- und Greifvogel-Brutbestandes im Park Dieskau 1986 bis 2015 unter dem Einfluss der fortschreitenden Ausbreitung des Waschbären. Apus 22: 11-35.
- TISCHLER P. (2018): Bemerkenswerte Avifauna an einem Kleingewässer – Brutvogelbestand am Schachteich Döllnitz 2014 bis 2018. Apus 23: 22-33.
- TODTE, I. (1983): Ungewöhnlich hoher Neststandort des Rotrückenwürgers. Apus 5: 99.
- TODTE, I. (1986a): Polygynie beim Hausrotschwanz, *Phoenicurus ochruros*. Beitr. Vogelkd. 32: 341-342.
- TODTE, I. (1986b): Sommernachweis der Eiderente im Kreis Havelberg. Apus 6: 184-185.
- TODTE, I. (2005): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten und deren Erhaltungszustand im EU SPA Wulfener Bruch und Teichgebiet Osternienburg im Jahr 2004. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 94-99.
- TODTE, I. (2014): Ornithologische Ereignisse nach der Überflutung des Elbe-Saale-Winkels und deren Umgebung der Stadt Aken im Jahr 2013. Apus 19: 3-17.
- TODTE, I. & K.-H. BOUDA (1996): Beobachtungen an der ersten Brut des Purpurreihers *Ardea purpurea* in Sachsen-Anhalt. Limicola 10: 192-196.
- TODTE, I. & B. NICOLAI (2001): Aktueller Nachweis der Wanderdrossel *Turdus migratorius* für Deutschland. Limicola 15: 157-162.
- TÖPFER, T. (2008): Nachweise seltener Vogeltaxa (Aves) in Sachsen aus der ornithologischen Sammlung des Museums für Tierkunde Dresden. Faun. Abh. (Dresden) 26: 63-101.
- TOLKMITT, D., D. BECKER, M. HELLMANN, E. GÜNTHER, F. WEIHE, H. ZANG & B. NICOLAI (2012): Einfluss des Waschbären *Procyon lotor* auf Siedlungsdichte und Bruterfolg von Vogelarten – Fallbeispiele aus dem Harz und seinem nördlichen Vorland. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 17-46.
- TORKLER, A. & H. LANGBEHN (2009): Der Sperlingskauz (*Glaucoedon passerinum*) im Landkreis Lüneburg – von der heimlichen „Geistereule“ zum verbreiteten Brutvogel. Beitr. Avif. Landkr. Lüneburg 2001-2007. Bd. 6: 169-175.
- TRAUE, H. (1970): Zur Ernährung des Rotmilan (*Milvus milvus* L.) während der Brut- und Fütterungsperiode im Verlaufe der Jahre 1962 bis 1967. Natursch. naturkd. Heimatforsch. Bez. Halle Magdeburg 7: 38-57.
- TRAUE, H. (1978): Zur Brutperiode einer Greifvogelpopulation im Mansfeld-Harzgeroder Bergland im Verlauf der Jahre von 1962 bis 1967. Falke 25: 6-11, 50-54.
- TRAUE, H. & K. WUTTKY (1966): Die Entwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus* L.) vom Ei bis zum flüggen Vogel. Beitr. Vogelkd. 11: 253-275.
- TRAUTMANN, S., J. SCHWARZ & S. FISCHER (2012): Das Monitoring häufiger Brutvögel in Sachsen-Anhalt – Zwischenergebnisse nach acht Jahren Laufzeit (2003 bis 2010). Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 1: 71-84.
- TRAUTMANN, S., S. FISCHER & B. GERLACH (2015): Ermittlung der Zielwerte nach der Delphi-Methode für den LIKI-Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ in Sachsen-Anhalt 2015. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, H. 5: 81-87.
- TREEB, J. (2000): Flamingos presumably escaped from captivity find suitable habitat in Western Europe. Waterbirds 23: 32-37.
- TREEB, J. (2011): Flamingo's in het Zwillbrocker Venn. Beilen.
- VON TSCHUSI ZU SCHMIDHOFFEN, V. (1892): Ornithologische Collectaneen. Ornithol. Monatsber. 2: 137-143.
- TUCHSCHERER, K. (1966): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Gohrau/Wörlitzer Winkel 1966 [I]. Apus 1: 74-80.
- TUCHSCHERER, K. (1968): Beiträge zur Vogelwelt des Wörlitzer Winkels II. Apus 1: 243-245.
- TUCHSCHERER, K. (1971): Beiträge zur Vogelwelt des Wörlitzer Winkels IV. Besondere Beobachtungen 1969/70 (Nachträge 1968). Apus 2: 186-189.
- UFER, W. (1973): Quantitative Bestandsaufnahme der Brutvögel der Kiesgrube Rattmannsdorf im Saalkreis 1968. Apus 3: 17-18.
- UHLENHAUT, K. (1998a): Zur Räumung der von Nathusius'schen Vogelsammlung aus dem Schloß Hundisburg Ende November 1945. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 16: 77-79.
- UHLENHAUT, K. (1998b): Seidenreiherr an der Mittelelbe. Apus 10: 87.
- ULRICH, A. (1970): Avifaunistische Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Colbitzer Lindenwald“. Mitt. IG Avifauna DDR 3: 27-50.



- ULRICH, A. (1975): Der Brutvogelbestand einer Kontrollfläche in der Ohreniederung bei Wolmirstedt. Mitt. IG Avifauna DDR 7: 53-57.
- ULRICH, A. (1977): Eistaucher am Jersleber See. Apus 4: 39.
- ULRICH, A. (1984): Beobachtungen zum Durchzug und Geschlechtsverhältnis von Wasservögeln am Jersleber See. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 8-9: 3-16.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1986): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil I. Wolmirstedter Beitr. 11: 3-63.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1988): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil II. Wolmirstedter Beitr. 13: 3-75.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1989): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil III. Wolmirstedter Beitr. 14: 3-66.
- UNDEUTSCH, W. (1998): Der Karmingimpel – ein neuer Brutvogel im Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 16: 55.
- VON VELTHEIM, H. H. (1924): Ein Uralkauz in Mitteldeutschland. Mitt. Vogelwelt 23: 89.
- VIEWEG, A. (1979): Der Waldkauz – eine Gefahr für den Rauhfußkauz. Falke 26: 392-393.
- VIKSNE, J. A. & H. A. MIHELSONS (1985): Migrations of Birds of Eastern Europe and Northern Asia. Moskau.
- VOERKEL, S. H. (1926): Beitrag zur Avifauna des Torgau-Annaburg-Jessener Gebietes. Ornithol. Monatschr. 51: 25-40.
- VOIGT, A. (1893): Ornithologischer Ausflug nach den Mansfelder Seen am 29.-30. April 1893. Ornithol. Monatsber. 1: 141-143.
- VOIGT, H. (1960): Flamingo bei Magdeburg gefangen. Mittbl. BFA Ornithol. Vogelsch. Magdeburg 1: 31.
- VOIGT, W. (1908): Altes und Neues vom Harz. Ornithol. Monatschr. 33: 38-39.
- VOOUS, K. H. (1962) Die Vogelwelt Europas und ihre Verbreitung. Hamburg, Berlin.
- VOSKAMP, P., S. VOLPONI & S. VAN RIJN (2005): Global population development of the Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmeus*. Overview of available data and proposal to set up a network of national specialists. Cormorant Research Gr. Bull. 6: 21-35.
- WADEWITZ, M. (1995): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben – Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 1: Nonpasseriformes. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 13: 53-100.
- WADEWITZ, M. (1996): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben – Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 2: Passeriformes. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 11-47.
- Wadewitz, M. (2000): Avifauna des Landes Sachsen-Anhalt. Apus 10, Sonderh.: 5-54.
- WADEWITZ, M. (2001): Die Vögel im Kerbtal der Bode bei Thale im Harz 1997-1999: Vorkommen und Dichte im Jahresverlauf. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 19: 95-130.
- WADEWITZ, M. (2004): Entwicklung von Vogelbeständen auf den Friedhöfen in der gehölzarmen Ackerlandschaft der Börde 1996 bis 2004. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 22: 59-81.
- WADEWITZ, M. (2005): Die Nilgans – eine Afrikanerin macht sich breit in unserem Land. Apus 12: 337-338.
- WADEWITZ, M. (2008): Bestand von Wasseramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea* im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 26: 117-129.
- WADEWITZ, M. (2009): Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im Nationalpark Harz (Teil Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 27: 61-78.
- WADEWITZ, M. (2010): Bestandsentwicklung und Vertikalvorkommen häufiger Brutvogelarten in den Hochlagen des Harzes: Untersuchungen von 1982 bis 2010 am Hohnekopf. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 28: 37-63.
- WADEWITZ, M. (2012a): Brutvögel auf einem Trockenrasen am Huy 1995-2012: Auf und Ab mit Büschen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 63-80.
- WADEWITZ, M. (2012b): Abhängigkeit des Legebeginns vom Vertikalvorkommen bei der Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla* im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 30: 107-118.
- WADEWITZ, M. (2015): Die Vögel des Kieseesees Wegeleben - Bestandsentwicklung 1979 bis 2015 nach Individuenzahlen. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 33: 97-135.
- WADEWITZ, M. & J. HEUER (1998): Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* im Nördlichen Harzvorland (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt). Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 16: 33-38.
- WADEWITZ, M. & F. WEIHE (1996): Der Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*) als neuer Brutvogel im Harz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 14: 95-110.
- WAGNER, M. & M. JENTZSCH (2000): Zur Verbreitung, Populationsdynamik und Nahrungsökologie des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus* L.) im Südharz. Ornithol. Jber. Mus. Heineanum 18: 51-70.
- WAGNER, M. & J. SCHEUER (2003): Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee. Bürgel.
- WAHN, R. (1930): Der Schwarzhalstaucher Brutvogel der Michelschen Teiche. Beitr. Avifauna Anhalts 1: 14.
- WAHN, R. (1937a): Gedanken und Beobachtungen über den Frühjahrszug 1937. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 1-7.
- WAHN, R. (1937b): Aus dem Leben der Blauracke. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1: 43-47.
- WAHN, R. (1939a): Noch etwas von der Blauracke. Beitr. Avifauna Mitteldt. 3: 27-29.
- WAHN, R. (1939b): Bestandsschwankungen vieler Vogelarten. Beitr. Avifauna Mitteldt. 3: 33-35.
- WAHN, R. (1950): Beobachtungen und Gedanken am Nest der Mönchsgrasmücke. Vogelwelt 71: 33-39.
- WAHN, R. (1951): Bestandsschwankungen unserer Vogelwelt in letzten drei Jahrzehnten. Rundbr. Arbeitsgemeinschaft. Ornithol. 3: 9-23.
- WALLACE, D. & W. BOURNE (1981): Seabird movements along the east coast of England. Brit. Birds 74: 417-426.
- WALTER, S. (1987): Die Vögel des Kreises Bernburg. Bernburger Heimatbl. 1987: 50-61.
- WALTHER, G. (1968): Sommerbeobachtung eines Bergfinken. Apus 1: 203.
- WALTHER, H. (1972): Erster Nachweis einer Brut des Wasserpiepers [*Anthus s. spinoletta* (L.)] im Harz. Beitr. Vogelkd. 18: 455-456.
- VON WANGELIN, G. J. (1897): Zwergtrappen. Ornithol. Monatschr. 22: 363-364.

- WATSON, J. (2010): The Golden Eagle. 2. Aufl., London.
- WEBER, B. (1950): Rotkehlchen-Flavino und Mönchsgrasmücken-Albino. Ornithol. Mitt. 2: 199.
- WEBER, B. (1956): Zur Verstärkung des Kuckucks. Ornithol. Mitt. 8: 74.
- WEBER, B. (1957): Rotkopfwürger, *Lanius senator*, Brutvogel im Drömling (Altmark). Beitr. Vogelkd. 5: 235-237.
- WEBER, B. (1965): Milane als Nahrungsschmarotzer im Stadtgebiet. Falke 12: 317-318.
- WEBER, B. (1966): Weißer Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). Beitr. Vogelkd. 12: 114-115.
- WEBER, B. (1975): Fund einer Dreizehnmöwe, *Rissa tridactyla* (L.). Beitr. Vogelkd. 21: 370.
- WEBER, B. (1976): Bemerkenswerte Vogelfunde im Kreis Haldensleben von 1957 bis 1973. Beitr. Vogelkd. 22: 83-100.
- WEBER, B. (1993): Wilhelm Riesel (1871-1951) aus Haldensleben – Erfahrungen und Erinnerungen eines alten Vogelfreundes Haldensleber Vogelkd.-Inform. 11: 49-69.
- WEBER, M. (2002): Untersuchungen zu Greifvogelbestand, Habitatstruktur und Habitatveränderungen in ausgewählten Gebieten von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Jber. Monitoring Greifvögel Eulen Europas 3. Ergebnisbd.: 1-114.
- WEBER, M., W. FIEBER & M. STUBBE (1998): Persistente chlororganische Verbindungen, Quecksilber und radioaktive Nuklide in Eiern von Rotmilanen (*Milvus milvus*) aus Sachsen-Anhalt. J. Ornithol. 139: 141-147.
- WEBER, M., L. KRATZSCH & M. STUBBE (2007): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Hakel im Jahr 2006. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 2: 49-57.
- WEBER, M., L. KRATZSCH, M. STUBBE, H. ZÖRNER, W. LÜTJENS, H. DOMKE & A. STUBBE (2009): Bestandssituation und Reproduktion ausgewählter Greifvogelarten in verschiedenen Gebieten des Nordharzvorlandes (Sachsen-Anhalt). Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 6: 167-179.
- WEBER, M. & M. STUBBE (1995): Biometrische Untersuchungen zu Eierschalenveränderungen bei Rotmilan (*Milvus milvus*), Schwarzmilan (*Milvus migrans*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) nach 1950. Vogel Umwelt 8, Sonderh.: 133-139.
- WEBER, M. & M. STUBBE (2000): Nahrungsangebot und Nahrungswahl von Rotmilan (*Milvus milvus*) und Mäusebussard (*Buteo buteo*) im nordöstlichen Harzvorland. Populationsökol. Greifvogel- u. Eulenarten, Bd. 4: 203-222.
- WEGENER, U. (1968): Die Siedlungsdichte von Greifvögeln in einem Waldgebiet (Huy) des Nordharz-Vorlandes. Falke 15: 328-335.
- WEGST, C. (2008): Der Krauskopfpelikan *Pelecanus crispus*, eine neue Art für Deutschland. Limicola 22: 161-175.
- WEICHEL, O. (1937a): Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.), bei Klieken/Anhalt. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1(1): 15-16.
- WEICHEL, O. (1937b): Purpurreiher, *Ardea p. purpurea* L., bei Klieken/Anhalt. Beitr. Avifauna Mitteldt. 1(1): 16.
- WEISE, R. (1992): Zum Brutbestand der Kolbenente (*Netta rufina*) in Deutschland. Ornithol. Mitt. 44: 115-119.
- WEISS, J. (2013): Totfund eines Dreizehenspechts *Picoides tridactylus* in Nordrhein-Westfalen. Vogelwarte 51: 154.
- WEIßGERBER, R. (1986): Siedlungsdichteuntersuchung im Zeitzer Tiergartengehölz. Apus 6: 127-129.
- WEIßGERBER, R. (1987a): Bruten der Gebirgsstelze im Südzipfel des Bezirkes Halle. Apus 6: 269-273.
- WEIßGERBER, R. (1988): Die Brutvögel der Zuckerfabrik-Klärteiche in Zeitz. Apus 7: 30-34.
- WEIßGERBER, R. (1990a): Zum Stromtod von Vögeln. Apus 7: 262-263.
- WEIßGERBER, R. (1990b): Zum Legebeginn der Gebirgsstelze. Apus 7: 274.
- WEIßGERBER, R. (1992): Brutvogelbestand in rekultivierten Tagebaurestlöchern. Apus 8: 23-29.
- WEIßGERBER, R. (1993): Zum Vorkommen des Flußregenpfeifers im Landkreis Zeitz. Apus 8: 145-151.
- WEIßGERBER, R. (1995a): Zum Vorkommen des Rotmilans im Zeitzer Gebiet. Apus 9: 69-74.
- WEIßGERBER, R. (1995b): Zum Limikolendurchzug im Zeitzer Gebiet. Apus 9: 105-114.
- WEIßGERBER, R. (1996a): Brutverbreitung und Habitat des Neuntötters im Süden des Burgenlandkreises. Apus 9: 180-183.
- WEIßGERBER, R. (1996b): Zum Habitat der Schafstelze. Apus 9: 190-191.
- WEIßGERBER, R. (1999): Rothals- und Schwarzhalstaucher Brutvögel im südlichen Burgenland-Kreis. Apus 10: 196-198.
- WEIßGERBER, R. (2001a): Zum Vorkommen und Habitat des Schlagschwirls im Zeitzer Gebiet. Apus 11: 61-66.
- WEIßGERBER, R. (2001b): Zum Durchzug und Winterbestand der Wasservögel im Zeitzer Gebiet. Apus 11: 78-94.
- WEIßGERBER, R. (2002): Zum Vorkommen einiger Brutvogelarten in der Aue der Weißen Elster nordöstlich von Zeitz. Apus 11: 187-195.
- WEIßGERBER, R. (2007): Atlas der Brutvögel des Zeitzer Landes. Apus 13, Sonderh.: 1-191.
- WEIßGERBER, R. (2010a): Neue Brutvogelarten im Zeitzer Land. Apus 15: 78-81.
- WEIßGERBER, R. (2010b): Ein Tagebaurestloch – Refugium für seltene Vogelarten. Ornithol. Mitt. 62: 168-177.
- WEIßGERBER, R. (2011): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in der Aue der Weißen Elster bei Zeitz. Apus 16: 41-46.
- WEIßGERBER, R. (2014): Ein Vergleich phänologischer Daten zum Heimzug der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Raum Zeitz und bei Magdeburg. Apus 19: 26-30.
- WEIßGERBER, R. & H. GEHLHAAR (1999): Häufigkeitsverteilung von *Sylvia communis*, *S. curruca*, *S. borin* und *S. atricapilla* während der Zugzeiten in der Zeitzer Tagebaufolgelandschaft. Mauritiana 17: 325-332.
- WEIßGERBER, R. & H. GEHLHAAR (2002): Biometrische Daten bei Luckenau gefangener Girlitze. Apus 11: 199-205.
- WEIßGERBER, R. & K. KRESSE (2002): Die Brutvogelfauna kleiner Bachtäler im Grenzbereich von Zeitzer Hügelland und Leipziger Tieflandsbucht. Apus 11: 235-246.
- WEIßGERBER, R. & G. SMYK (2002): Die Ornithozönose eines Sanddornbestandes bei Lucka im Landkreis Altenburger Land (Ostthüringen). Mauritiana 18: 251-261.
- WELK, D. & F. BRAUMANN (2003): Avifaunistischer Jahresbericht 2001 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 21: 35-59.
- WENZEL, K. (1895): Ornithologisches aus der Umgebung von Halle. I.-III. Ornithol. Monatsschr. Dt. Ver. Schutze Vogelwelt 20: 150-155, 198-203, 218-222.

- WENZEL, K. (1901): Beobachtungen über den Kuckuck bei Halle nebst einigen Bemerkungen zur Naturgeschichte des Kuckucks. Z. Ool. 11: 55-60.
- WENZEL, K. (1908): Zur Naturgeschichte des Kuckucks und seiner Brutpfleger. Ornithol. Monatsschr. 33: 462-475.
- WENZEL, K. (1914): Neues zur Fortpflanzungsgeschichte des Kuckucks. Ornithol. Monatsschr. 39: 457-464.
- WERNER, J. (1961): Eissturmvogel, *Fulmarus glacialis*, im Harz. J. Ornithol. 102: 96.
- WESTPHAL, J. (1979): Rotkopfwürger-Paar 1977 bei Schraplau. Apus 4: 143.
- WEX, H. (1938): Sperbergrasmücke bei Biederitz. Beitr. Avifauna Mitteldt. 2(2): 46.
- WHITE, S. & C. KEHOE (2015): Report on scarce migrant Birds in Britain in 2011-12: Part I: Non-passerines. Brit. Birds 108: 126-157.
- WIESNER, J. (1997): Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Deutschland. Naturschutzreport 13: 82-98.
- WIESNER, J., H. ZANG & H. HECKENROTH (1992): Brut des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) im Harz. Acta ornithocol. 2: 327-329.
- WIKLUND, C. G., A. ANGERBJORN, E. ISAKSON, N. KJELLEN & M. TANNERFELDT (1999): Lemming predators on the Siberian tundra. Ambio 28: 281-286.
- WILEY, R. H. & D. S. LEE (2000): Pomarine Jaeger (*Stercorarius pomarinus*). In: POOLE, A. & F. GILL (ed.). The Birds of North America, Philadelphia.
- AUS DEM WINKEL, G. F. D. (1821): Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber. Zweiter Theil, Zweite vermehrte und ganz umgearbeitete Auflage. Leipzig.
- WINK, M., C. DIETZEN & B. GIESSING (2005): Die Vögel des Rheinlandes. Atlas zur Brut- und Winterverbreitung 1990-2000. Beiträge zur Avifauna Nordrhein-Westfalens, Bd. 36.
- WINKLER, P. (1954): Zur Verstärkung des Eichelhäfers. Vogelwelt 75: 241.
- WINKLER, P. (1955a): Zur Urbanisierung des Eichelhäfers. Beitr. Vogelkd. 4: 161.
- WINKLER, P. (1955b): Zum Vorkommen des Schwarzstirnwürgers, *Lanius minor*, in Mitteldeutschland. Beitr. Vogelkd. 4: 171.
- WITSACK, W. (1968b): Trauerbachstelze (*Motacilla alba yarellii* Gould) an den Runstedter Klärteichen nördlich Halberstadt. Naturkd. Jber. Mus. Heineanum 3: 109.
- WITSACK, W. (1969a): Die Siedlungsdichte der Vögel zweier Grünlandtypen im Nordharz und im Nordharzvorland. Mitt. IG Avifauna DDR 2: 13-20.
- WITT, K. (2003): Mandarinente *Aix galericulata*, ein etabliertes Neozoon in Deutschland. Vogelwelt 124: 17-24.
- WÜRL, R. (2009): Ein Rosapelikan auf Reisen. Haldensleber Vogelkd.-Inform. 27: 132-133.
- WÜST, W. (1981): Avifauna Bavariae – Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. München.
- WUTTKY, K. (1963): Beutetier-Funde in Greifvogelhorsten des Hake. Ein Beitrag zur Ernährungsbio-logie und zum Greifvogelschutz. Beitr. Vogelkd. 9: 140-171.
- WUTTKY, K. (1964): Schnee-Eule, *Nyctea scandiaca* L., in Mitteldeutschland. Beitr. Vogelkd. 9: 382.
- WUTTKY, K. (1967): Blitzschlag als Todesursache beim Rotmilan (*Milvus milvus* L.). Beitr. Vogelkd. 12: 370.
- WUTTKY, K. (1968): Ergebnisse 10jähriger Beobachtungen an der Greifvogelpopulation des Wildforschungsgebietes Hake (Kr. Aschersleben). Beitr. Jagd- u. Wildforsch. 104: 159-173.
- ZAHN, W. (1905): Der Drömling. Ein Beitrag zur Landeskunde und Geschichte der Altmark. Öbisfelde.
- ZANG, H. (1981): Zum Status des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Harz. Ber. Naturhist. Ges. Hannover 124: 279-289.
- ZANG, H. & H. HECKENROTH (1986): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.7.
- ZANG, H. & H. HECKENROTH (2001): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.8.
- ZANG, H., G. GROSSKOPF & H. HECKENROTH (1995): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.5.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & F. KNOLLE (1989): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.3.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & P. SÜDBECK (2005): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.9.
- ZANG, H., H. HECKENROTH & P. SÜDBECK (2009): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen. Bd. 2.11.
- ZAPPE, K. (1975): Erster Brutnachweis für den Raubwürger im Kreis Bernburg. Apus 3: 289.
- ZIEMER, E. (1885): Notizen aus Halle. J. Ornithol. 33: 225-337.
- ZIMMERMANN, P. (1967): Über den Brutvogelbestand einer Kleingartenanlage. Apus 1: 124-126.
- ZINK, G. (1961): Ringfundergebnisse bei der Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*). Vogelwarte 21: 113-118.
- ZINK, G. (1975): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 3. Möggingen.
- ZINK, G. (1981): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 3. Radolfzell.
- ZINK, G. & F. BAIRLEIN (1995): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel. Teil 5. Wiesbaden.
- ZÖRNER, G.-J. (1987a): Zum Vorkommen der Blauracke in der Colbitz-Letzlinger Heide 1950 bis 1986. Apus 6: 232-233.
- ZÖRNER, G.-J. (1987b): Brutzeitfeststellungen in der nordwestlichen Altmark. Apus 6: 241-244.
- ZÖRNER, G.-J. (1988): Brutvogelerfassung in der Colbitz-Letzlinger Heide. Apus 7: 25-30.
- ZÖRNER, G.-J. (1992): Der Brutvogelbestand einer Kontrollfläche in der Purnitzau (Altmark). Apus 8: 30-31.
- ZÖRNER, G.-J. (1993): Brutvogelerfassung in verschiedenen Wald- und Forstflächen der Altmark. Apus 8: 201-220.
- ZSCHERNITZ, E. (1967): Purpurreiher-Beobachtung im Edderitzer Teichgebiet. Apus 1: 137.
- ZUPPKE, U. (1975): Zwergmaus als Raubwürgerbeute. Falke 22: 175.
- ZUPPKE, U. (1976): Raubwürger im Kreis Wittenberg. Falke 23: 426-429.
- ZUPPKE, U. (2002): Rauhfußkauz im Fläming bei Wittenberg. Apus 11: 276-277.
- ZUPPKE, U. (2009): Die Vogelwelt der Region Lutherstadt Wittenberg. Norderstedt.
- ZWARTS, L., R. G. BIJLSMA, J. VAN DER KAMP & E. WYMENGA (2009): Living on the edge – Wetlands and birds in a changing Sahel. KNNV Zeist.